



DEFENDA

**ГЕНЕРУЄМО
НОВИЙ
ЗАХИСТ**



КАТАЛОГ
**засобів захисту
рослин**

2024

ЦІННІСТЬ БРЕНДУ DEFENDA

Близькість

Компанія знаходиться як-найближче до своїх клієнтів



Відкритість

Компанія готова показувати та ділитися з партнерами своїм досвідом

Прогнозованість

Ми будуємо довгострокову стратегію на партнерство та спільний розвиток



Якість

Компанія працює з кращими заводами-виробниками в Китаї за сучасними технологіями з високим контролем якості

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ПАРТНЕРИ ТА ДРУЗІ!

Ваш внесок в забезпечення продовольчої безпеки неоцінений. Ми пишаємося тим, що можемо бути вашими партнерами на цьому шляху та спільно розвивати сільське господарство. Адже місія бренду DEFENDA - надавати ефективні та економічно вигідні рішення для досягнення ваших цілей у вирощуванні с/г культур.

Ми завжди на кроці попереду і раді представити 3 нових продукти, серед яких гербіцид з реєстрацією на кавуни. Загалом, у нашому портфоліо вже 80 продуктів, які задовільняють індивідуальні потреби кожного аграрія.

Ми впевнені, що можемо разом зробити сільське господарство більш продуктивним і економічно стійким. Захищайте свої культури з DEFENDA та разом досягнемо нових висот у вирощуванні!

DEFENDA – ГЕНЕРУЄМО НОВИЙ ЗАХИСТ



Загальний зміст*

	Сучасна лінійка спеціальних добрив DEFENDA	6
	На що потрібно звертати увагу при роботі з ЗЗР	8
	Бакові суміші	10
	■ ГЕРБІЦИДИ	17
	■ ФУНГІЦИДИ	83
	■ ІНСЕКТИЦИДИ	119
	■ ПРОТРУЙНИКИ	155
	■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ	179
	■ ПРИЛИПАЧІ	185
	■ ДЕСИКАНТИ	191
	■ ІНШЕ	199
	Системи захисту	205
	Додаток	214
	Контакти	232

* Зміст клікабельний. Клацнувши по номеру сторінки або назві ви маєте можливість перейти безпосередньо до сторінки з описом продукту



LNZ web – купуй онлайн

Посівний матеріал

Засоби захисту рослин

Добрива

Посівний матеріал

Кукурудза

Lnzweb.com



LNZ web – перший в Україні офіційний аграрний інтернет-магазин з продажу посівного матеріалу, добрив та засобів захисту рослин, створений агрохолдингом LNZ Group.

Це інноваційна онлайн-платформа, де можна придбати посівний матеріал, засоби захисту рослин і добрива.

Ресурс простий у користуванні й дуже зручний, адже до кожної позиції додана детальна характеристика і надані поради щодо використання препаратів. Крім того, вся продукція сертифікована, а посівний матеріал перевірено на полях LNZ Group.


Однією з переваг LNZ WEB є можливість обрати спосіб оплати та доставки: у відділенні «Нової пошти», адресну доставку «Новою Поштою» або самовиїзд зі складів LNZ Group.

На **LNZ web** доступні додаткові функції. Ви можете скористатися детальним агрономічним прогнозом погоди на 7 днів із рекомендаціями щодо часу посіву та обробки рослин. Також є можливість дізнатися актуальні ціни на елеваторах та курс валют.


Місія **LNZ web** – надати можливість середнім і малим фермерам отримати продукцію міжнародно визнаних брендів за такою ж ціною, як і для великих агропідприємств без посередників, а також стати надійним прогресивним помічником сучасних аграріїв.



Можливість швидко замовити необхідний продукт онлайн



Швидка доставка



Перевірена агропродукція найкращих світових брендів

**Товари для фермерів та аграріїв від офіційного дистрибутора
LNZ Market за справедливими цінами без посередників.**

На що потрібно звертати увагу при роботі з ЗЗР

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ

Оптимальні умови для обприскування: від +10 до +25 °C.

Але є виключення: деякі продукти краще працюють при нижчих або навпаки більш високих температурах. Звіряйтесь з інформацією по кожному продукту. Або звертайтесь до офіційного представника

ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО: до кожного продукту та особливо до кожної бакової суміші потрібно підходити індивідуально.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Відхилення від оптимальних умов (для продукту чи бакової суміші) може привести до значного зниження або відсутності ефективності обробки.

ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

Оптимальна відносна вологість повітря має бути 70-80 %

За вологості повітря менше ніж на 30 % рекомендовано проконсультуватися з менеджером

ЯКІСТЬ ВОДИ

ЧИСТОТА - перед змішуванням краще провести попередню очистку води.

ЖОРСТКІСТЬ - насиченість її солями кальцію та магнію. Даний показник можна виміряти в лабораторії або портативними приладами. Проблему надмірної жорсткості води можна вирішити додаванням спеціальних речовин.

РІВЕНЬ pH – різні діючі речовини по-різному реагують на pH розчину і це обов'язково слід враховувати при формуванні бакових сумішей. Детальніше звіряйтесь по кожному продукту в каталогі.

НЕРОЗЧИННІ ЧАСТКИ

Бруд, частинки ґрунту, рослинні рештки, водорості можуть бути причиною засмічення фільтрів, розпилювачів, тощо.

Ефективність продуктів може значно знижуватися при присутності органічних домішок. ТОМУ ВАЖЛИВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛІШЕ ЯКІСНУ, ЧИСТУ ВОДУ!

Перед приготуванням робочого розчину потрібно проводити по-переднє змішування в окремому резервуарі, на предмет сумісності компонентів бакової суміші.

Що таке бакові суміші?

Застосування хімічних засобів захисту рослин дедалі частіше провокує появу стійкості до їх дії. Це призводить до безперервного збільшення хімічних навантажень на природу і породжує нові економічні та екологічні проблеми. Часто агрономи, прагнучи розширити спектр дії, обирають бакові суміші. Існують різні моделі застосування пестицидів, що дозволяють зменшити можливість прояву негативних наслідків, одним з яких є правильне використання бакових сумішей.

Багатокомпонентні продукти мають певну зручність у використанні. Проте фіксоване співвідношення діючих речовин в таких продуктах часто не дозволяє оперативно реагувати на реальну фітосанітарну обстановку на полі. Альтернативою виступають бакові суміші однокомпонентних продуктів.

Групи бакових сумішей

Суміші однофункціональних продуктів, але з різними механізмами дії

гербіцид + гербіцид

Різнофункціональні продукти для одночасного знищення різних шкодочинних об'єктів

гербіциди фунгіциди інсектициди регулятори росту

Суміші гранульованих або порошкоподібних мінеральних добрив і пестицидів при звичайних нормах їх внесення

добрива пестициди

Суміші рідких добрив з пестицидами, регуляторами росту та мікродобривами

добрива пестициди регулятори росту мікродобрива

Суміші добрив і пестицидів для внесення з поливною водою

добрива пестициди

Суміші пестицидів, мікродобрив та регуляторів росту для проструювання насіння

фунгіциди інсектициди мікродобрива регулятори росту



Підбір компонентів для бакових сумішей

Підбір компонентів відіграє дуже важливу роль. При плануванні вмісту бакових сумішей слід враховувати шкодочинні об'єкт, фазу розвитку культури та строки застосування. Також потрібно врахувати, щоб культура, що обробляється не переважала в стресі на момент обробки.

Для приготування бакових сумішей слід використовувати тільки сумісні продукти. Несумісними вважаються ті пестициди, які при змішуванні змінюють фізичні властивості, мають фітотоксичну дію на культуру або знижують ефективність проти шкодочинних об'єктів. Okрім діючої речовини до складу продукту входять розчинники, консерванти, антиокислювачі, стабілізатори, різні поверхнево-активні речовини (ПАР), інгібтори корозії, згущувачі, речовини для зменшення випаровування, регуляції pH, тощо.

Переваги застосування бакових сумішей

Використання бакових сумішей пестицидів має ряд істотних переваг:

- більш ефективне використання техніки і обладнання;
- зниження резистентності шкодочинних організмів;
- зниження витрат на внесення;
- зменшення механічних пошкоджень культури;
- посилення ефекту проти цільових об'єктів;
- зростання рівня рентабельності.

Порядок приготування бакових сумішей

1 ЗГОРТАННЯ ЕМУЛЬСІЇ І СУСПЕНЗІЇ

1

Змішування аніонних і катіонних ПАР може спровокувати згортання емульсії і сусpenзії. Така ж реакція може статися при додаванні невідповідного прилипача або мікродобрива в хелатній формі.

2

СПІЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТАКТНИХ І СИСТЕМНИХ ГЕРБІЦІДІВ

Спільне застосування контактних і системних гербіцидів не бажане, оскільки рослинна тканина під дією контактного продукту знижує фізіологічну активність що в свою чергу перешкоджає надходженню системного гербіциду. До того ж ефективність останнього в суміші менша, ніж в чистому вигляді. Тому спочатку застосовують системні гербіциди, а потім контактні.

3

ВОДОРОЗЧИННІ ПАКЕТИ

Це пакети з пестицидами, які розчиняються разом з вмістом в баку обприскувача. Якщо одним з компонентів бакової суміші є водорозчинні пакети, то приготування бакової суміші починають з них.

4

ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ (водно-сусpenзійні концентрати)

Це концентровані сусpenзії частинок діючої речовини.

5

ВОДОРОЗЧИННІ ПРОДУКТИ І РІДИНИ

6

Водний розчин (ВР), водний концентрат (ВК), водорозчинний концентрат (ВРК) – ці продукти додаються в бакову суміш в останню чергу, тому що вони мають дуже хорошу розчинність.

СУХІ ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ

Водорозчинні гранули (ВДГ), порошки що змочуються (ЗП). Водорозчинні гранули розчиняють першими, оскільки вони містять зв'язувальні водорозчинні речовини, які з'єднують порошкоподібні частинки в гранулах. На цій стадії небажана наявність олії в баку обприскувача, оскільки олія буде обволікати гранули і перешкоджати розчиненню в'яжучих речовин. Може статися розшарування розчину в баку обприскувача. Бажане приготування маточного розчину. Також потребує постійного перемішування.

7

ПРЕПАРАТИВНІ ФОРМИ НА МАСЛЯНІЙ ОСНОВІ (масляно-водна емульсія (МВЕ), рослинні олії)

Олія за своїми властивостями утворює з частинками діючих речовин нерозчинні компоненти. Тому, якщо сухі речовини не повністю розчинилися, додавання речовин з оліями може привести до розшарування рідин і утворення густого осаду в баку обприскувача. Якщо олієвмісні компоненти будуть додані в бак, в якому вже розчинені добрива, відбудеться «згортання» розчину.

8

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (ПАР)

6

Покращують адгезивність препаративних форм продуктів, посилюють здатність робочого розчину утримуватись на поверхні рослини та пришвидшують проникнення діючих речовин пестицидів, зменшують поверхневий натяг робочого розчину. У бакову суміш додаються в останню чергу.

9

РІДКІ ДОБРИВА, МІКРОЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

Необхідно пам'ятати, що не всі добрива і мікроелементи змішуються з засобами захисту рослин. Наприклад, не можна змішувати олійні продукти з добривами, що містять бор (B), кальцієві добрива з добривами, що містять фосфор (P) і сірку (S), залізо (Fe), цинк (Zn), магній (Mg) і марганець (Mn).

10

Змішувати два або більше складних рідких добрив НЕДОЦІЛЬНО — кожне з них окремо вже збалансоване за складом.

11

Застосування регуляторів росту потребує підвищеної уваги. При змішуванні декількох регуляторів росту можна не отримати очікуваного результату, або отримати фітоксичний вплив на рослину.

Рекомендуємо попередньо проконсультуватися з представником компанії.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

При приготуванні бакових сумішей, змішуванні різних продуктів, добрив — кожен випадок унікальний! Вода, яка використовується для приготування робочого розчину, після дощу або зміни температури може негативно вплинути на якість бакової суміші.

Реакція діючих речовин в баковій суміші може бути різною та непередбачуваною!

Правила ефективного застосування бакових сумішей

01 Читаємо етикетку



Перед застосуванням продукту або добрива уважно читаємо етикетку. На етикетках фірми-виробники вказують особливості застосування та іншу інформацію.

02 Тест на сумісність



Перед тим, як залити продукти в бак обприскувача, проведіть тест на сумісність. У скляну ємність з кришкою (банку) налийте воду (вода повинна бути з того ж джерела, що і в обприскувачі), додайте продукти – компоненти бакової суміші в співвідношеннях, відповідних нормам витрат. Ретельно перемішайте. Однорідність суміші оцінюється візуально 2 рази, відразу ж після перемішування і через 30 хвилин, давши суміші відстоїтися.

03 Дивимося на реакцію



Змішування двох хімічних речовин веде до певної фізико-хімічної реакції, або очікуваної і позитивної, або ж несподіваної та непередбачуваної. Результатом реакції при змішуванні двох і більше несумісних продуктів може бути випадання осаду у вигляді сироподібної маси, помутніння розчину, або ж може статися розігрівання чи охолодження рідини, реакція може супроводжуватися виділенням газу, ряснім піноутво-ренням, розшаруванням компонентів в баку. Якщо ж в результаті тестового змішування продуктів утворилася суміш, яка протягом 30 хвилин розшарувалася, але легко змішується при повторному перемішуванні, то такий робочий розчин можна застосовувати в польових умовах за умови постійного перемішування в баку обприскувача. Якщо в результаті тестового змішування продуктів утворилася неоднорідна суміш олії, осаду, пластівців та ін. – то такі суміші не придатні до застосування. Крім того, такі неоднорідні суміші нерівномірно розподіляються по рослинах, викликаючи опіки, фітотоксичність.

04 Маточні розчини



Готуємо маточні розчини, якщо один з компонентів бакової суміші має препаративну форму порошок, що змочується, або водорозчинні гранули. У баку з'єднуємо тільки маточні розчини продуктів!

05 Дотримуємося технології приготування бакової суміші



У разі виникнення питань зверніться до представника компанії.

06 Коригуємо норми витрат



Норми використання встановлюйте залежно від поширення та шкодочинності об'єктів впливу.

07 Продукти змішуюмо в суворій черговості




Робочий розчин готуємо безпосередньо перед застосуванням. Готовий робочий розчин або залишки після застосування не можна залишати в обприскувачі.

08 Уважно стежимо за якістю і температурою води, що використовується



Вода повинна бути чистою, без мулу, сторонніх домішок, температура не нижче 10°C. При використанні холодної води знижується розчинність продуктів і зростає ризик зниження їх ефективності.

Порядок змішування пестицидів за препаративними формами



КВ	Кондиціонери води та мікродобрива (сульфат амонію та мікродобрива)	КЕ МЕ ЕВ ЕМ	Емульгуючі концентрати (КЕ, МЕ, ЕВ, ЕМ)
ВРП	Сухі препаративні форми у ВРП (водорозчинних пакетах)	РГ	Сухі водорозчинні концентрати (РГ)
ЗП	Сухі препаративні форми без ВРП (спочатку ЗП, потім - ВГ, суха текуча суспензія)	РК	Рідкі водорозчинні концентрати (РК)
ВГ		ПАР	Ад'юванти (ПАР) (додаються в останню чергу, їх подають прямо в бак, на через сумішевий бак (змішувач), для запобіганню підвищенному піноутворенню)
КС	Рідкі преперативні форми у вигляді суспензій (КС)4		
СЕ	Суспо-емульсії (СЕ)		

Наведемо приклад:

Навесні на посівах озимої пшениці з'явилися бур'яни, такі як гірчиця польова і лобода біла. Ми застосовуємо гербіцид Шериф (три-бенурон-метил) в.д.г. + ПАР Мачо (етоксілат-ізодецилового спирту 900г/л) в нормі 25 г/га + 200 мл/га при нормі виливу 200 л/га води, і цього буде достатньо. А на іншому полі у нас з'являється така група бур'янів, як підмаренник чіпкий і падалиця соняшнику (IMI). Щоб впоратися з цією проблемою, ми додаємо гербіцид Аксакал (флорасулам 250 г/кг) в.д.г. в нормі 25 г/га при нормі виливу води 200 л/га, як і у попередньому випадку.

Як виглядатиме порядок змішування:





* Зміст клікабельний.
Клацнувши по номеру сторінки або назві ви
маєте можливість перейти безпосередньо до
сторінки з описом продукту



ГЕРБІЦИДИ

ГЕРБІЦИДИ

АЙДАХО 18 (тербутилазин, 500 г/л)	АЙЛАР 20 (аклоніфен, 600 г/л)	АКСАКАЛ 22 (флорасула, 250 г/кг)
БАНТЕН 24 (бентазон, 480 г/л)	БЕТАГАРД 26 (фенмедифам, 91 г/л, десмедифам, 71 г/л, етофумезат, 112 г/л)	БЛЕЙД 28 (клетодим, 120 г/л)
БРОКС 30 (імазамокс, 40 г/л)	ДАБЛ ТРАЙ 32 (метолахлор, 960 г/л антитод)	ДИКАМБА 34 ФОРТЕ (2,4-дихлорфеноксиоцітової кисоти диметиламіна сіль 344 г/л + дикамби диметиламінна сіль 120 г/л)
ЕФІМЕР 36 (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 905 г/л)	ІМПРЕЗА 38 (імазамокс, 33 г/л, імазапір, 15 г/л)	КЕНТАВР 40 (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфонметил, 250 г/кг)
КЛАТТЕР 42 (кломазон, 480 г/л)	КУШОН 44 (метамітрон, 700 г/л)	ЛІТЕРОН 46 (S-метолахлор, 960 г/л)
МАТАР 48 (метрибузин, 600 г/л)	МУССОН 50 (нікосульфурон, 40 г/л)	НАПАЛМ 52 (ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л (360 г/л у кислотному еквіваленті)
НАПАЛМ 54 ФОРТЕ (калійна сіль гліфосату, 550 г/л) (450 г/л у кислотному еквіваленті)	НАПАЛМ 56 СУПЕР калійна сіль гліфосату 663 г/л (540 г/л у кислотному еквіваленті)	НОВАНТЕ 58 (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л)
ПАНГОЛІН 60 (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг)	ПЕРУН 62 (прометрин, 500 г/л)	ПІРАМІДА 64 клопіralід, 300 г/л
ПРИМУС 66 (2-етилгексиловий ефір, 2,4 Д – 452 г/л + флорасула, 6,3 г/л)	РИМ 68 (римсульфурон, 250 г/кг)	САХАРА 70 (ацетохлор, 900 г/л)
СОРА-НЕТ 72 (пропізохлор, 720 г/л)	СТАРЛЕНТ 74 (пропізохлор, 360 г/л + тербутилазин, 190 г/л)	СУМАРО 76 (мезотріон, 480 г/л)
ФОРІТ 78 (флуроксипір, 333 г/л)	ХАРУМА 80 (хізалофоп-П-етил, 125 г/л)	ШЕРИФ 82 (трибенурон-метил, 750 г/кг)

** Айдахо - назва продукту

18 - номер сторінки

(тербутилазин, 500 г/л)- діюча речовина



АЙДАХО



**Системний селективний гербіцид
ґрунтової дії проти широкого спектру
дводольних бур'янів**

Переваги

- Довготривалий захисний ефект.
- Широке вікно застосування.
- Знімає проблему, у тому числі, хрестоцвітних бур'янів

Характеристики

Вміст діючої речовини тербутилазин, 500 г/л

Хімічна група триазини

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Норма витрати продукту корегується в залежності від механічного складу ґрунту та гумусу. На важко-суглинкових ґрунтах та ґрунтах з високим вмістом гумусу – норми витрати максимальні, відповідно супіщані та малогумусні потребують менших норм.

Сумісність

Можливе використання в бакових сумішах.

Вимоги до pH робочого розчину

від 6 до 9

Застереження у застосуванні

Після обприскування потрібно виключити міжрядний обробіток, оскільки це призведе до руйнування захисного екрану.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Тербутилазин руйнує хлоропласти та пригнічує процес фотосинтезу. Як наслідок, призупиняється дихання та порушується енергетичний баланс, що викликає порушення загальної життєдіяльності бур'яну та призводить до його загибелі. При ґрунтовому застосуванні поглинається корінням. Характерні симптоми дії тербутилазину – пожовтіння вегетативної маси з наступним відмиранням (некроз).

ГЕРБІЦИДИ

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	До сходів культури	1,5-2,5
Соняшник			1,5-2,5



Ділянка без внесення ЗЗР



Сора-Нет + Айдахо

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





АЙЛАР



Системний гербіцид для боротьби з дводольними бур'янами

Переваги

- Низький рівень фітотоксичності завдяки високій селективності
- Малочутливий до вологості ґрунту при внесенні, низький ризик промивання у ґрунті
- Контроль проблемних бур'янів, у тому числі стійких до триазинів

Характеристики

Вміст діючої речовини аклоніfen, 600 г/л

Хімічна група дифенілетери

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Обприскування необхідно проводити при температурі повітря від +15 до 22°C та при швидкості віtru не більше, ніж 5 м/с. За досходового внесення можна застосовувати в бакових сумішах з гербіцидами на основі пропіазхлору. При бакових сумішах рекомендоване застосування в мінімальних нормах

Сумісність За післясходового внесення не застосовувати з будь-якими баковими партнерами (засобами захисту рослин, мікродобривами)

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

У разі недотримання регламенту застосування можливе зниження ефективності препарату.

Норма витрати робочого розчину

150-250 л/га.



Механізм дії

Аклоніфен порушує синтез хлорофілу в рослинах бур'янів, поглинається колеоптелем, гіпокотелем та сім'ядолями, але не кореневою системою, і переміщується до меристемних тканин рослини бур'янів. Аклоніфен призводить до накопичення в рослині фітона, який пригнічує синтез хлорофілу та інших фотосинтетично активних пігментів. Дія аклоніфену проявляється в знебарвленні проростаючих молодих бур'янів. Їх ріст припиняється і через 2-3 тижні вони гинуть.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Соняшник		Обприскування ґрунту після посіву до сходів культури.	3,0-6,0	1
Горох	Дводольні бур'яни		3,0-4,0	1
Соняшник		Обприскування посівів у фазу 2-4 справжніх листків культури.	1,0-2,0	1
Горох			0,5	1

Запорукою ефективності продукту є його внесення на дрібногрудкувату поверхню, на якій утворюється захисний екран. Заробки в ґрунт продукт не потребує! Оскільки продукт потрапляє в рослину бур'яну через гіпокотиль і сім'ядолі, але не через кореневу систему, розмішування з ґрунтом або порушення захисного екрана призводить до різкого зниження ефективності Айлару. Айлар можна вносити, поки прямі сонячні промені, світло не впливає на дію аклоніфену. Продукт малочутливий до вологості ґрунту при внесенні, але ефективна робота проявляється за сприятливих умов для проростання бур'янів (вологий верхній шар ґрунту, температура 15-22°C).

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





АКСАКАЛ



Селективний післясходовий гербіцид системної дії для знищення однорічних дводольних бур'янів, в т. ч. стійких до 2,4 Д

Переваги

- Контроль підмаренника чіпкого до 7 кілець, падалиці озимого ріпаку та падалиці соняшника (у т. ч. IMI та Експрес).
- Відсутність фітотоксичності завдяки високій селективності.
- Сумісність з гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами та добривами.
- Придатний до осіннього застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини **флорасулам, 250 г/кг**

Хімічна група **триазолпіримідини**

Препаративна форма **гранули, що диспергуються у воді**

Класифікація ВООЗ **III клас (помірно небезпечний)**

Рекомендації щодо застосування

Сумісність **Можливе використання в бакових сумішах**

Вимоги до pH робочого розчину **від 5 до 7**

Застереження у застосуванні **Малочутливі та перерослі бур'яни можуть не загинути, проте їхній ріст та подальший розвиток значно уповільнюється.**

Норма витрати робочого розчину **200-300 л/га.**



ГЕРБІЦИДИ

Механізм дії

Дія флорасуламу полягає у пригніченні ферменту ацеталактатсинтази, що в свою чергу блокує утворення валіну, ізолейцину і лейцину. У подальшому (протягом 3-х годин після застосування) відбувається зупинка поділу клітин та росту чутливих бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, г/га
Озима пшениця	Однорічні дводольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА бур'яни	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи пропорцевого листка культури включно.	20-30 + ПАР Мачо
Кукурудза		Обприскування посівів у фазі 3-7 листків культури	20 + ПАР Мачо

Контролювати падалицю соняшника найкраще гербіцидами, що мають у своєму складі флорасулам. Аксакал ефективно бореться зі всіма видами падалиці соняшнику.

Гербіцид має широке вікно застосування на озимій пшениці (починаючи з 2-3 листків до появи пропорцевого листка).

Є відмінним партнером у бакових сумішах для розширення спектру дії та підсилення контролю слабочутливих дводольних бур'янів.

Оптимальна температура для застосування: від +5 °C до +25 °C.

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





БАНТЕН



Селективний контактний післясходо-вий гербіцид для контролю однорічних широколистих бур'янів

Переваги

- Продукт не впливає на наступні культури сівозміни.
- Ефективний контроль однорічних дводольних бур'янів.
- Можливе застосування на зернових культурах (пшениця, ячмінь, овес) з підсвітом бобових трав (конюшина, люцерна).

Характеристики

Вміст діючої речовини бентазон, 480 г/л

Хімічна група похідна тіадіазинів

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Для ефективної роботи продукту потрібне сонячне світло та якісне покриття рослини робочим розчином. Рекомендоване застосування в ранковий час за відсутності роси.

Сумісність Можливе використання в бакових сумішах

Вимоги до pH робочого розчину від 5 до 9

Застереження у застосуванні Можливе зниження ефективності за похмурої погоди

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.



Механізм дії

Бентазон має виражену контактну дію і поглинається переважно зеленими частинами рослин. Діюча речовина порушує процес фотосинтезу. Відмирання бур'янів проявляється через 3-5 днів за умови високого рівня сонячного освітлення.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Соя	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 1-3 трійчастих листків культури	1,5-3,0	1
Горох		Обприскування у фазі 1-5 листків культури	2,0-3,0	1

Для розширення спектру дії та підвищення ефективності у посівах сої можливе використання у баковій суміші з гербіцидом Клаттер (кломазон, 480 г/л).

Норми використання згідно фітосанітарного стану вашого поля.

За рекомендаціями щодо норм використання рекомендуємо звернутися до представника компанії у вашому регіоні.



Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





БЕТАГАРД



Системний гербіцид для знищення однорічних дводольних та деяких злакових бур'янів

Переваги

- Ефективно знищує практично всі види однорічних дводольних бур'янів, в тому числі важко контролюваних, та деякі злакові.
- Має комбінований механізм дії на бур'яни – через листковий апарат та ґрунт.
- Перші ознаки дії проявляються через 2-7 днів.
- Притаманна висока селективність.

Характеристики

Вміст діючої речовини

фенмедифам, 91 г/л +десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л

Хімічна група

фенілкарбамати, бензофурани

Препаративна форма

концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробки посівів буряків препаратом проводять при появі першої, другої та третьої хвилі бур'янів з інтервалом 7-14 днів. Ефективність застосування залежить від норми використання продукту до фази розвитку бур'янів.

Сумарна кількість продукту не повинна перевищувати 4 л/га за сезон.

Сумісність

Для розширення спектру гербіцидної активності доцільне застосування продукту в бакових сумішах з гербіцидами на основі діючих речовин метамітрон, трифлусульфуронметил та інші. Однак в кожному конкретному випадку бажано провести додаткову перевірку продуктів на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 6

Застереження у застосуванні

За умови перерослих бур'янів норму використання слід збільшити або підсилити бакову суміш партнерами. Не рекомедується застосовувати у бакових сумішах з фосфорорганічними інсектицидами та грамініцидами.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га, слід враховувати, що концентрація робочого розчину препарату БЕТАГАРД повинна бути не нижче 0,4%, тобто не менше 0,4 л продукту на 100 л води.



Механізм дії

Вдало підібрані діючі речовини: фенмедифам, десмедифам та етофумезат призводять до руйнуючих та незворотних процесів в рослинах бур'янів: по-рушення фотосинтезу, синтезу ліпідів, обміну білків, затримки росту та поділу клітин, перешкоджання утворенню воскового нальоту.

Фенмедифам та десмедифам є рухомими інгібіторами фотосинтезу – вони, після проникнення в листки, концентруються у хлоропластах та викликають блокування фотосинтезуючого апарату. Етофумезат (інгібітор проростків) поглинається різними частинами рослин: дводольні через коріння, а однодольні через колеоптиль під час проростання. Візуальні ознаки дії продукту – по-світління забарвлення листя та, в подальшому, хлороз – проявляються через 2-7 днів після обробки гербіцидом. Повна загиbelь бур'янів настає через 2-3 тижні.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Буряки цукрові	Однорічні дводольні, та деякі злакові бур'яни	Перше обприскування – у фазі сім'ядоль бур'янів, наступні обприскування з інтервалом 7-14 днів	1,0*	3

* норму слід корегувати залежно від фази розвитку бур'янів та наявності партнера у баковій суміші

При застосуванні Бетаграда, пам'ятайте, що за температури нижче +7 та вище 25°C селективна дія гербіциду знижується, і гербіцид стає однаково токсичним як для бур'яну так і для культури! Тож, щоб уникнути негативного впливу дотримуйтесь регламенту внесення!



Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





БЛЕЙД



Системний післясходовий грамініцид

Переваги

- Швидке проникнення в злакові бур'яни.
- Висока стійкість до змивання опадами.
- Швидкий візуальний ефект дії препарату.
- Знищення як наземної, так і підземної частини злакових бур'янів.

Характеристики

Вміст діючої речовини клетодим, 120 г/л

Хімічна група циклогександіони

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Норму використання продукту встановлють залежно від фази розвитку бурянів та ступеня забур'яненості. Обробку доцільно проводити у ранкові години при температурі від 10 до +25°C.

Сумісність

Не рекомендовано змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, гербіцидами проти дволітніх бур'янів та добревами.

Вимоги до pH робочого розчину

від 7 до 9

Застереження у застосуванні

Боротьбу із злаковими бур'янами, рекомендуємо провести до фази 6 листків у соняшнику (BBCN 16), та до появи квіткових бутонів у сої та ріпаку (BBCN 50)

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Клетодим при поглинанні листям і стеблами бур'янів, проникає в рослину, концентрується в точках росту і блокує біосинтез ліпідів. У дводольних рослин клетодим включається в обмін речовин та інактивується. Клетодим знищує як надземну, так і підземну (кореневу) частину злаків, запобігаючи відростанню багаторічних видів. Завдяки своїй селективності продукт не викликає фіто-токсичності у дводольних культурних рослин, на яких рекомендований до застосування. Дія клетодimu на злакові бур'яни проявляється на 3-5 день у вигляді хлорозу листків та побуріння точок росту, відмирання рослин відбувається через 7-21 день після обробки.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Соняшник, соя, ріпак, буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування бур'янів у фазі 2-3 листків	0,4-0,8
Соняшник, соя, ріпак, буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни (у т.ч. падалиця озимої пшениці)	Обприскування за висоти бур'янів 10-15 см (у т.ч. до фази кущення падалиці озимої пшениці)	1,4-1,8



Падалиця озимої пшениці у посіві озимого ріпаку



Контроль падалиці озимої пшениці

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





БРОКС



Селективний контактно-системний гербіцид для контролю широкого спектру однорічних злакових та дводольних бур'янів

Переваги

- Широкий спектр дії проти однорічних злакових і дводольних бур'янів.
- Широке вікно застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини імазамокс, 40 г/л

Хімічна група імідазолінони

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Брокс слід застосовувати на початкових стадіях розвитку бур'янів. Не рекомендується застосовувати продукт, коли рослини соняшнику, гороху та сої перебувають у стресовому стані від впливу факторів навколошнього середовища (низькі або навпаки високі температури, сильна посуха, надмірна вологість тощо). Оптимальна температура для застосування – від +14°C до +25°C.

Сумісність

Не рекомендуємо використовувати в бакових сумішах з інсектицидами фосфорорганічної групи та в бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 9

Застереження у застосуванні

В окремих випадках після застосування препарату спостерігається зменшення висоти та/або зміна кольору рослин. Як правило, рослини набирають відповідного вигляду й висоти протягом 1–2 тижнів. Не рекомендується використовувати препарат при перепадах нічної та денної температури понад 15 градусів С.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Імазамокс має чітко виражену контактну та системну дії, селективний, поглинається переважно листям, потрапляючи в точки росту, інгібує синтез протеїну в бур'янах, що призводить до хлорозу молодого листя, відмирання точок росту, призупинення розвитку, прояву карликовості і, як наслідок, рослинини гинуть. Має часткову ґрунтову дію.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Соняшник IMI	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 4-х справжніх листків культури	1,0-1,2	1
Горох		Обприскування у фазі 2-6 справжніх листків культури	0,75-1,0	1
Соя		Обприскування у фазі 1-3 трійчастих листків культури	0,75-1,0	1

Після внесення на полі Брокса, вносити продукти на основі імідозалінонів потрібно не раніше ніж через 3 роки.

Рекомендуємо звернути увагу на дотримання сівозміни:

- восени після весняного внесення - озима пшениця, жито;
- весна першого року після внесення - яра пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, соняшник, сорго;
- восени другого року - озима пшениця, ячмінь, жито.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ДАБЛ ТРАЙ



Досходовий гербіцид для боротьби з однорічними злаковими та деякими дводольними бур'янами.

Переваги

- Тривала захисна дія
- Ідеальний партнер для бакових сумішей
- Не фітотоксичний до культур
- Відмінний контроль однорічних злакових бур'янів.

Характеристики

Вміст діючої речовини метолахлор, 960 г/л

Хімічна група хлорацетаміди

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

При внесенні продукту ґрунт повинен мати дрібногрудкувату структуру та достатню кількість вологи, з мінімальними залишками рослинних решток.

Сумісність

Можливе використання в бакових сумішах.

Вимоги до pH робочого розчину

від 6 до 8

Застереження у застосуванні

У зонах недостатнього зволоження внесення рекомендується із заробкою до 5 см. Ефективність продукту знижується за умови пониження температури нижче +5 °C.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Метолахлор відзначається високою гербіцидною активністю по відношенню до однорічних злакових та деяких двосім'ядольних бур'янів. Метолахлор діє на проростаючі бур'яни. Діюча речовина продукту проникає переважно у тканини шилець. Активно гальмує розвиток і поділ клітин через порушення ліпідного обміну. У результаті дії метолахлору проростки бур'янів призупиняють ріст та гинуть.

ГЕРБІЦИДИ

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза			1,3
Соняшник, цукровий буряк, ріпак	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	1,3-1,6

Досходове внесення гербіциду Дабл Трай забезпечує ефективний контроль злакових та деяких дводольних бур'янів на посівах соняшнику та кукурудзи.

Для розширення спектру дії проти дводольних бур'янів рекомендуємо використовувати комплексний захист.

Для захисту кукурудзи бакову суміш: Дабл Трай + Айдахо.

Для соняшнику: Дабл Трай + Айдахо або Дабл Трай + Перун.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ДИКАМБА ФОРТЕ



Післясходовий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних дводольних бур'янів

Переваги

- Широкий спектр ефективності
- Відсутність післядії на наступні культури.

Характеристики

Вміст діючої речовини

2,4-дихлорфеноксиоцітової кисоти
диметиламінна сіль 344 г/л
+ дикамби диметиламінна сіль 120 г/л РК

Хімічна група

похідні бензойної кислоти + арілканкарбонової

Препаративна форма

водорозчинний концентрат

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найвищий рівень ефективності гербіцидної дії досягається при обробці посівів в ранні фази розвитку бур'янів. Зокрема, однорічні бур'яни найкраще знищуються у фазі 2-4 листків; багаторічні – у період їх найбільш чутливої стадії розвитку: для берізки польової це 5-10 см довжини паростків, для осоту рожевого – стадія розетки (4-6 листків).

Сумісність

Сумісний з більшістю продуктів. Однак в кожному конкретному випадку необхідно провести додаткову перевірку продуктів на сумісність

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати продукт при пониженні температури нижче +10°C та не у зазначеній фазі розвитку культури.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Повернутись до головного змісту



Механізм дії

2,4-Д і дикамба належать до синтетичних ауксинів, проникають у рослини через тканини органів та коріння, активно гальмують ріст і поділ клітин, порушують в них білковий та ліпідний обмін, що призводить до загибелі листя та кореневої системи бур'янів. Саме загибель кореневої системи є головним важелем у боротьбі з багаторічними бурянами.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Пшениця озима		Обприскування посівів від фази кущення до виходу у трубку	0,8	1
Ярий ячмінь	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни в т.ч. стійкі до 2,4Д та МЦПА		0,5-0,7	1
Кукурудза		Обприскування посівів у фазі 3-5 листків культури	1,0-1,2	1

Дикамба Форте є оптимальним партнером для бакових сумішей з продуктами на основі гліфосатів в осінній період для боротьби з кореневищними та коренепаростковими бур'янами.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ЕФІМЕР



Післясходовий гербіцид системної дії для застосування в боротьбі з однорічними та деякими багаторічними дводольними бур'янами

Переваги

- Швидке проникнення, швидка поява візуальних симптомів.
- Відсутні обмеження в сівозміні для наступних культур.
- Ідеальний партнер для бакових сумішей.
- Попереджує виникнення резистентності до продуктів із групи сульфонілсечовин.

Характеристики

Вміст діючої речовини 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 905 г/л

Хімічна група похідні хлорфеноксицтової кислоти

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Ефімер застосовується у фазі активного росту бур'янів. Оптимальна температура застосування: від +8°C до +25°C. У чутливих рослин вже за декілька годин після обробки зупиняється ріст. Повна загиbelь настає через 7-10 діб в залежності від видових особливостей рослин, фази їх розвитку та погодних умов.

Сумісність

Не рекомендується змішувати з регуляторами росту.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати продукт при пониженні температури нижче +8 та не у зазначеній фазі розвитку культури.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Діюча речовина порушує біосинтез структурних та ферментних білків, що призводить до руйнації метаболізму рослинного організму. Проникає в рослину через надземні органи (в основному через листя) і активно пересувається по рослині, накопичуючись в молодих меристемних тканинах листків, стебла та коренів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Озимі та ярі зернові культури	Однорічні та деякі багаторічні (осот рожевий)	Обприскування посівів від фази кущення до виходу в трубку культури	0,6-0,8	1
Кукурудза	дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 3 - 5 листків культури	0,7-0,8	

Можливе раннє застосування за умов холодної і затяжної весни на посівах озимих та ярих зернових культур для контролю зимуючих дводольних бур'янів.

Відмінний партнер для розширення спектру дії, що дає можливість зменшити норму використання основного гербіциду.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ІМПРЕЗА



Високоефективний продукт широкого спектру дії проти одно- та дводольних видів бур'янів

Переваги

- Контроль вовчка.
- Надійний захист від бур'янів, у тому числі на проблемних площах.
- Широкий спектр дії.
- Контроль наступних хвиль бур'янів (ґрунтовая дія).

Характеристики

Вміст діючої речовини імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л

Хімічна група імідазолінони

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Імпрезу слід застосовувати тільки на IMI-стійких гібридах соняшнику на початкових стадіях розвитку бур'янів. Не рекомендується застосовувати продукт, коли рослини соняшнику перебувають у стресовому стані від впливу факторів навколошнього середовища (низькі або навпаки високі температури, сильна посуха, надмірна вологість тощо). Не рекомендується застосовувати даний гербіцид при температурі нижче +10°C та вище +25°C. Оптимальна температура для застосування – від +14°C до +25°C.

Сумісність

Не рекомендується застосовувати в баковій суміші з іншими пестицидами та мікродобревами

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

В окремих випадках після застосування продукту спостерігається зменшення висоти та/або зміна кольору. Як правило, рослини набирають відповідного вигляду й висоти протягом 1–2 тижнів.

Норма витрати робочого розчину

200-400 л/га. За наявності великої кількості рослинних решток на ґрунті витрата робочого розчину має бути не менше 250 л/га. Найефективніше застосовувати, коли більшість бур'янів перебуває на початкових фазах розвитку.



Механізм дії

Імазамокс та імазапір поглинаються рослиною і поширюється через коріння та листову поверхню, рухаються д.р. по ксилемі та флоемі та накопичуються у точках росту.

В бур'янах діючі речовини інгибуєть синтез ензиму ацетогідроксильної кислоти (ALS), яка відповідає за утворення амінокислот (валин, лейцин та ізолейцин). При цьому порушується синтез протеїну, що веде до порушення синтезу ДНК та уповільненню росту рослинних клітин, що призводить до загибелі бур'янів

Організація сівозміни

Продукти з групи імідазоліонів не можна використовувати на одному полі частіше, ніж один раз на три роки. Після застосування продукту слід дотримуватися наступної сівозміни:

- без обмежень – сорти чи гібриди соняшнику, ріпаку, стійкі до гербіцидів з групи імідазоліонів
- через 4 місяці – озима пшениця, жито
- через 9 місяців** – кукурудза, ячмінь***, овес, рис, соняшник, соя, горох, боби, сорго
- через 18 місяців – овочі, картопля
- через 24 місяці – цукровий і кормовий буряк, ріпак, гречка, просо.

** Якщо pH ґрунту вище 6,2 та сума опадів більша, ніж 200 мм.

*** При сумі опадів менше, ніж 200 мм, та pH 6,2, існує небезпека проявів фітотоксичності.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Соняшник IMI	Однодольні та дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 4 справжніх листків культури	1,0-1,2



Після внесення Імпрези

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





КЕНТАВР



Післясходовий гербіцид для захисту посівів кукурудзи від однорічних та деяких багаторічних злакових і дво-дольних бур'янів

Переваги

- Кентавр контролює широкий спектр бур'янів.
- Ефективний контроль злакових бур'янів.

Характеристики

Вміст діючої речовини

римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг

Хімічна група

сульфонілсечовини

Препаративна форма

водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ

II клас, небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл, птахів, риб

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Максимальна ефективність досягається при обробці посівів у ранні фази розвитку бур'янів.

Сумісність

При використанні у бакових сумішах рекомендовано проводити пробне змішування.

Вимоги до pH робочого розчину

від 6 до 7

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати продукт при пониженні температури нижче +10°C та не у зазначеній фазі розвитку культури.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Повернутись до головного змісту



Механізм дії

Римсульфурон, тифенсульфуронметил поглинаються переважно листям бур'янів, швидко переміщується після застосування до кінчиків кореневої системи й ефективно знищує ті бур'яни, що вже проросли. Кентавр припиняє поділ клітин чутливих до продукту бур'янів шляхом впливу на їхню ензимну систему. Чутливі бур'яни вже через кілька годин припиняють ріст і більше не конкурують із культурними рослинами у споживанні вологи і мінеральних речовин.

ГЕРБІЦИДИ

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, г/га
Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні злакові і дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі від 2 до 5-ти листків культури	20-25 г/га + ПАР Мачо

Для розширення спектру дводольних бур'янів та підсилення дії можливе використання у баковій суміші на кукурудзі: Кентавр + Аксакал + ПАР Мачо



Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





КЛАТТЕР



Селективний системний ґрунтовий гербіцид для контролю однорічних дводольних та деяких злакових бур'янів

Переваги

- Широкий спектр бур'янів.
- Здатність до реактивації.
- Довготривалий захисний екран.

Характеристики

Вміст діючої речовини кломазон, 480 г/л

Хімічна група ізоксазолідинони

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

За нестачі ґрунтової волого після посіву рекомендується провести коткування ґрунту. Продукт характеризуються високою селективністю, при використанні його в рекомендованих нормах не впливає на розвиток культурних рослин.

Сумісність

При використуванні у бакових сумішах рекомендовано проводити пробне змішування.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



ГЕРБІЦИДИ

Механізм дії

Кломазон поглинається листям і пересувається до коріння. Проникаючи в рослини, діюча речовина продукту зупиняє процес вироблення хлорофілу і каротинів і блокує процес фотосинтезу, що призводить до відмирання бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Ріпак	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	0,15-0,20	1
Соя		Обприскування ґрунту до появи сходів культури	0,2	

Для більш ефективного досходового захисту посівів озимого ріпаку рекомендуємо застосувати бакову суміш гербіцидів Клаттер + Сора-Нет.

Таке поєднання забезпечує синергічну дію та ефективний контроль максимально широкого спектру однорічних дводольних і деяких злакових видів бур'янів та пролонговану захисну дію. Найбільшу ефективність від застосування грунтових гербіцидів отримують при забезпеченні дрібно грудочкуватої структури ґрунту, відсутності рослинних решток, та внесення суміші за помірної вологості ґрунту.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





КУШОН



Селективний гербіцид системної дії для боротьби з однорічними злаковими та деякими дводольними бур'янами

Переваги

- Можливість застосування вже при +5°C.
- Застосовується незалежно від фази розвитку культури.
- Довготривала захисна дія.
- Ефективність не зменшується, навіть якщо одразу після обприскування пройде дощ – змита діюча речовина подіє через ґрунт.

Характеристики

Вміст діючої речовини метамітрон, 700 г/л

Хімічна група триазинони

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ II клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

При післясходовому застосуванні, для отримання максимального результату, обробку слід проводити в оптимальному температурному режимі (від +5°C до +25°C).

Сумісність

Продукт сумісний з іншими продуктами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність. Є відмінним партнером у баковій суміші з Бетагардом з метою розширення спектра дії та пролонгації ґрунтового ефекту.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Застереження у застосуванні

Сумарне використання продукту не повинне перевищувати 6 л/га на сезон.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Метамітрон поглинається корінням та листками бур'янів, швидко переміщується до листкового апарату рослини, де блокує процес фотосинтезу, що призводить до загибелі рослин бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Буряки цукрові	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Перше обприскування у фазі сім'ядоль бур'янів, наступні з інтервалом 7-10 днів	1,0-2,0	3

Кушон за відповідним регламентом внесення повноцінно контролює сходи лободи бідої та її види, яка вже з першою парою справжніх листочків утворює потужний восковий наліт, а також рід Лутига родини Щирицеві.

Кушон один із лідерів селективності до цукрових буряків.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41




Повернутись до головного змісту





NEW

ЛІТЕРОН



**Грунтовий досходовий гербіцид
системної дії для контролю одноріч-
них злакових та деяких дводольних
бур'янів.**

Переваги

- Відмінний контроль однорічних злакових бур'янів.
- Тривала захисна дія
- Відсутність фітотоксичної дії на культури
- Ідеальний партнер для бакових сумішей

Характеристики

Вміст діючої речовини S-метолахлор, 960 г/л

Хімічна група хлорацетаміди

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

При внесенні продукту ґрунт повинен мати дрібногрудкувату структуру та достатню кількість вологи, з мінімальними залишками рослинних решток.

Сумісність

Можливе використання в бакових сумішах.

Вимоги до pH робочого розчину

від 6 до 8

Застереження у застосуванні

Ефективність продукту знижується за умови недостатнього зволоження та пониження температури нижче +5 °C.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Повернутись до
головного змісту



Механізм дії

Діюча речовина препарату швидко адсорбується головним чином через кореневу систему проростків бур'янів, що призводить до зупинення поділу клітин і відмирання проростків та молодих рослин бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза, соняшник, соя, цукрові буряки		Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1,0 - 1,6
Горох, ріпак, кавуни	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання або до появі сходів культури (у зонах недостатнього зволоження – із за гортанням)	1,6
Сорго*		Обприскування у фазу 3–5 листків культури.	1,6 - 2,0
Картопля		Обприскування ґрунту до посадки, але до появі сходів культури	1,6

* Обов'язкова обробка насіння сорго антидотом!

Для запобігання скочування крапель та досягнення більш рівномірного покриття поверхні поля, створення ефективного "гербіцидного екрану" рекомендовано використовувати з ПАР СУПЕР МАЧО з нормою 0,1 л/га

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





МАТАР



Селективний системний ґрунтовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур'янів та деяких злакових

Переваги

- Характеризується високоефективною і довготриваюю захисною дією.
- Знищує вегетуючі бур'яни (початкові стадії росту) і їх проростки.
- Відсутність фітотоксичної дії на культуру.

Характеристики

Вміст діючої речовини метрибузин, 600 г/л

Хімічна група триазинони

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Обприскування слід проводити при температурі повітря в межах від +8°C до +25°C.

Сумісність Продукт сумісний з іншими продуктами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 9

Застереження у застосуванні

Перед застосуванням гербіциду Матар слід уточнити чутливість сортів сої до діючої речовини метрибузин.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Метрибузин в рослину потрапляє через листя й коріння, та переміщується акропетально по ксилемі. У рослині порушує транспорт електронів, що беруть участь в процесі фотосинтезу, внаслідок чого рослина гине.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Макси- мальна кількість обробок
Соя	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яні	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	0,50-0,75	1

Соя досить чутлива до наявності бур'янів в посівах. Особливо на початкових етапах вегетації, коли вона починає розвиватися і має низьку конкурентоспроможність.

Тому гербіцидний захист сої слід розпочати з ґрунтових гербіцидів. В залежності від виду ґрунту та його характеристики, видового складу бур'янів, рекомендована бакова суміш: Матар + Сора-Нет.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту



МУССОН



**Післясходовий гербіцид проти одно-
річних та багаторічних злакових бур'я-
нів.**

Переваги

- Високоселективний продукт для знищенння злако-
вих бур'янів в посівах кукурудзи.
- Можливість застосування у широкому діапазоні фаз
розвитку кукурудзи – від 3 до 10 листків.

Характеристики

Вміст діючої речовини нікосульфурон, 40 г/л

Хімічна група сульфонілсечовини

Препаративна форма концентрат сусpenзїї

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку слід проводити в період інтенсивного росту бур'янів та при фазі розвитку кукурудзи 3-10 листків за умови, що культура не екранує бур'яни від робочого розчину. Оптимальна температура для застосування гербіциду: +15 - 25°C.

Сумісність

Для ефективного знищенння дводольних бур'янів продукт можна застосовувати разом з партнером. В кожному конкретному випадку рекомендовано провести додаткову перевірку продуктів на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

Не допускати переростання злакових бур'янів.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Нікосульфурон починає поглинатись листям і стеблами відразу після застосування, завдяки високій системності швидко переміщується до кореневої системи. Припиняє поділ клітин шляхом блокування ферменту ацеталактат-синтази, що відповідає за біосинтез основних амінокислот. Оброблені бур'яни швидко зупиняють ріст, набуваючи через 1 тиждень червонуватого відтінку. Повна загибель настає приблизно через 3 тижні. Знищує лише ті бур'яни, які зійшли до моменту обробки.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Кукурудза	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування у фазі від 3 до 10 листків культури (2-4 листків у бур'янів)	1,0-1,25	1
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування у фазі від 3 до 10 листків культури (за висоти 10-15 см у бур'янів)		



Контроль без внесення ЗЗР

Муссон+Сумаро

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту



НАПАЛМ



**Системний неселективний гербіцид
широкого спектру дії**

Переваги

- Ефективний засіб для знищення злісних кореневищних та коренепаросткових бур'янів, а також небажаної чагарникової рослинності.
- Застосовується також в якості десиканту.
- Швидко розкладається в ґрунті.

Характеристики

Вміст діючої речовини

ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л
(360 г/л у кислотному еквіваленті)

Хімічна група

фосфоміцини

Препаративна форма

водний розчин

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найкращий ефект застосування продукту досягається при обприскуванні гербіцидом активно вегетуючих бур'янів за їх висоти 10-20 см. Швидкість дії продукту залежить від pH води, концентрації робочого розчину та температури повітря та інших погоднокліматичних умов. Оптимальними умовами при внесенні є температура від +12°C до +25°C, достатня зволоженість ґрунту та відсутність опадів протягом 5 годин після внесення.

Сумісність

Сумісний з більшістю гербіцидів. За високої чисельності осоту та берізки доцільні бакові суміші з гербіцидом на основі 2,4-Д та дикамбі. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням бакової суміші, рекомендується провести пробне випробування на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 6

Застереження у застосуванні

Не рекомендується проводити механічний обробіток ґрунту протягом 15 днів.

Норма витрати робочого розчину

100-200 л/га



Механізм дії

Ізопропіламінна сіль гліфосату за способом дії на рослину належить до групи інгібіторів синтезу амінокислот і проникає в рослину через її активно вегетуючі зелені надземні частини. Завдяки системним властивостям за короткий період часу потрапляє в усі життєво важливі надземні органи рослини, порушує синтез необхідних для росту та розвитку амінокислот, що викликає швидке припинення росту, хлороз молодих листків, відмирання надземних та підземних органів. Через 7-10 днів з'являються перші ознаки гербіцидного ефекту: спочатку це пожовтіння, потім починається побуріння та в'янення листя. Повна загиbelь бур'янів настає через 15-20 днів, залежно від погодних умов та виду бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Поля під посіви кукурудзи, картоплі, сої, соя-ніжнику, ріпаку, люцерни, льону, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яні	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні, за два тижні до посіву (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи).	2,0-5,0	
Поля під посіви ярих зернових, цукрових буряків, соя-ніжнику, картоплі, ріпаку, льону, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яні	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	4,0-6,0	1
Пари та землі не сільськогосподарського користування (смуги відчуждення ліній електропередач, газо та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи	Однорічні та багаторічні бур'яні	Обприскування вегетуючих бур'янів	3,0-6,0	

Для обприскування потрібно використовувати тільки чисту не жорстку воду (недопустимим рівнем жорсткості води вважається більше 7.00 ммол/л). Адже гліфосат швидко зв'язується з органічними домішками та іонами кальцію і магнію, які присутні у жорсткій воді, та інактивується, внаслідок чого ефективність продукту зменшується. Робочий розчин необхідно використати одразу після приготування.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





НАПАЛМ СУПЕР



Неселективний системний гербіцид і десикант суцільної дії призначений для боротьби з однорічними та багаторічними бур'янами та підсушування рослин.

Переваги

- Має швидку проникаючу дію
- Не має ґрунтової активності, тому після його застосування можна проводити посів будь-яких сільськогосподарських культур
- Використовується в широкому діапазоні температури та вологості повітря

Характеристики

Вміст діючої речовини

калійна сіль гліфосату 663 г/л
(540 г/л у кислотному еквіваленті)

Хімічна група

фосфороміцини

Препаративна форма

водорозчинний концентрат

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найкращий ефект застосування продукту досягається при обприскуванні гербіцидом активно вегетуючих бур'янів за їх висоти 10-20 см. Швидкість дії продукту залежить від pH води, концентрації робочого розчину та температури повітря та інших погодно-кліматичних умов. Оптимальними умовами при внесенні є температура від +12°C до +25°C, достатня зволоженість ґрунту та відсутність опадів протягом 3 годин після внесення.

Сумісність

Сумісний з більшістю гербіцидів. При високій чисельності осоту та берізки доцільні бакові суміші з гербіцидом на основі 2,4-Д та дикамбі. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням бакової суміші, слід провести пробне випробування на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 6

Застереження у застосуванні

Не рекомендується проводити механічний обробіток ґрунту протягом 15 днів.

Норма витрати робочого розчину

100-200 л/га



Механізм дії

Калійна сіль гліфосату легко проникає через листя та інші органи бур'янів, швидко переноситься судинною системою до точок росту та кореневої системи де гліфосат порушує синтез амінокислот необхідних для життєдіяльності та росту рослин.

Норми витрат та строки застосування

В якості гербіциду:

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Плодові та виноградники	Однорічні та багаторічні бур'яни	Направлене обприскування по вегетуючих бур'янах	2,0 - 3,5
Поля, призначенні під посіви зернових, кукурудзи, буряків цукрових, соняшнику, ріпаку, сої, льону, картоплі, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування по вегетуючих бур'янах весною, за 2 тижні до висівання культури (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи). Обприскування по вегетуючих бур'янах восени після збирання попередника.	2,0 - 3,5
Пари. Землі несільсько-господарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні наспи).	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування по вегетуючих бур'янах	2,0 - 3,5

В якості десиканту:

Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб обробок	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Соя	Десикація посівів наземним штанговим методом	Десикація у фазу початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості не більше 35–40%)	2,4	1	14
Кукурудза	Десикація посівів авіаційним методом	За 2 тижні до збирання та вологості зерна не більше 30%	2,4	1	14

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту



НАПАЛМ ФОРТЕ



Неселективний гербіцид системної дії для знищення одно- та багаторічних, злакових та дводольних бур'янів

Переваги

- Можливість використання до сходів культури без подальшої негативної дії.
- Стійкість до змивання.
- Речовина, що діє, швидко переміщується по рослині і досягає його кореневої системи.

Характеристики

Вміст діючої речовини

калійна сіль гліфосату, 550 г/л (450 г/л у кислотному еквіваленті)

Хімічна група

фосфоміцини

Препаративна форма

водорозчинний концентрат

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найкращий ефект застосування продукту досягається при обприскуванні гербіцидом активно вегетуючих бур'янів за їх висоти 10-20 см. Швидкість дії продукту залежить від pH води, концентрації робочого розчину та температури повітря та інших погодно-кліматичних умов. Оптимальними умовами при внесенні є температура від +12°C до +25°C, достатня зволоженість ґрунту та відсутність опадів протягом 3 годин після внесення.

Сумісність

Сумісний з більшістю гербіцидів. При високій чисельності осоту та берізки доцільні бакові суміші з гербіцидом на основі 2,4-Д та дикамби. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням бакової суміші, слід провести пробне випробування на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 6

Застереження у застосуванні

Не рекомендується проводити механічний обробіток ґрунту протягом 15 днів.

Норма витрати робочого розчину

100-200 л/га



Механізм дії

Робочий розчин проникає в бур'яни через листя та інші зелені органи блокуючи синтез ароматичних амінокислот. Це в свою чергу призводить до пошкодження точок росту та повного відмирання надземних органів та кореневої системи. Калійна сіль гліфосату сприяє швидкому розчиненню воскового покриття на листковій поверхні бур'янів і дає змогу діючій речовині за більш короткий проміжок часу проникнути через кутикулу та безпосередньо в кореневу систему.

Норми витрат та строки застосування

В якості гербіциду:

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Плодові та виноградники	Однорічні та багаторічні бур'яни	Направлене обприскування по вегетуючих бур'янах	2,0-6,0
Поля, призначені під посіви зернових, кукурудзи, буряків цукрових, соняшнику, ріпаку, сої, льону, картоплі, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування по вегетуючих бур'янах весною, за 2 тижні до висівання культури (до обприскування виключити всі механічні обробки ґрунту, крім ранньовесняного закриття вологи). Обприскування по вегетуючих бур'янах восени після збирання попередника.	2,0-6,0
Пари. Землі несільсько-господарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насыпи).	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування по вегетуючих бур'янах	2,0-6,0

В якості десиканту:

Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб обробок	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Кукурудза	Десикація посівів авіаційним методом	За 2 тижні до збирання та вологості зерна не більше 30%	2,4	1	14

Для боротьби з проблемними багаторічними дводольними бур'янами рекомендуємо використання бакової суміші Напалм Форте+Ефімер

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





NEW

НОВАНТЕ



ГЕРБІЦИДИ



Грунтовий гербіцид системної дії для контролю однорічних злакових та дво-дольних бур'янів у посівах основних сільськогосподарських культур.

Переваги

- Синергія двох діючих речовин забезпечує ефективний контроль основних бур'янів.
- Пролонгований період захисної дії
- Відсутність післядії та резистентності

Характеристики

Вміст діючої речовини

S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л

Хімічна група

хлорацетаміди, триазини

Препаративна форма

концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Норма витрати продукту корегується в залежності від механічного складу ґрунту та вмісту гумусу. На важко-суглинкових ґрунтах та ґрунтах з високим вмістом гумусу – норми витрати максимальні, відповідно супіщані та малогумусні потребують менших норм.

Сумісність

Можливе використання в бакових сумішах.

Вимоги до pH робочого розчину

від 6 до 8

Застереження у застосуванні

Після обприскування потрібно виключити міжрядний обробіток, оскільки це призведе до руйнування захисного екрану.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Повернутись до головного змісту



Механізм дії

Тербутилазин руйнує хлоропласти та пригнічує процес фотосинтезу. Як наслідок, призупиняється дихання та порушується енергетичний баланс, що викликає порушення загальної життєдіяльності бур'яну та призводить до його загибелі. При ґрутовому застосуванні поглинається корінням. Характерні симптоми дії тербутилазину – пожовтіння вегетативної маси з наступним відмиранням (некроз).

S-метолахлор відзначається високою гербіцидною активністю по відношенню до однорічних злакових та деяких двосім'ядольних бур'янів. S-метолахлор діє на проростаючі бур'яни. Діюча речовина продукту проникає переважно у тканини шилець. Активно гальмує розвиток і поділ клітин через порушення ліпідного обміну. У результаті дії S-метолахлору проростки бур'янів призупиняють ріст та гинуть.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза, сорго*	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, або по сходах у фазі 3–5 листків культури	3,5-4,5
		Обприскування ґрунту до появи сходів культури	3,5-4,5

* Обов'язкова обробка насіння сорго антидотом!

Для запобігання скочування крапель та досягнення більш рівномірного покриття поверхні поля, створення ефективного "гербіцидного екрану" рекомендовано використовувати з ПАР СУПЕР МАЧО з нормою 0,1 л/га

Якщо після внесення гербіциду випадає значна кількість опадів, можливе відбивання крапель робочого розчину, що може привести до прояву фіtotоксичності молодих рослин.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





ПАНГОЛІН



Системний гербіцид для контролю широкого спектру однорічних дво-дольних бур'янів

Переваги

- Надійний партнер для розширення спектру контролю бур'янів.
- Широке вікно застосування.
- Висока ефективність у посушливих умовах.

Характеристики

Вміст діючої речовини трифлусульфурон-метил, 500 г/кг

Хімічна група сульфонілсечовини

Препаративна форма водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Оптимальна температура для обприскування – +15°C - +25°C під час внесення та декількох годин після нього. Якщо температура вища +25°C або нижча +10°C протягом 3–5 годин після внесення, швидкість метаболізму в культурі зменшується. Це може привести до тимчасового пожовтіння листя буряків. Ці симптоми зникають протягом 10 днів, не впливаючи на подальший розвиток культури, врожай та вміст цукру.

Продукт сумісний з іншими продуктами. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Сумісність

від 7 до 9

Вимоги до pH робочого розчину

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Застереження у застосуванні

200-300 л/га

Норма витрати робочого розчину



Механізм дії

Трифлусульфурон-метил поглинається переважно листям, а також коренями бур'янів. Таким чином, продукт має системну та частково ґрутову активність. Потрапивши в бур'ян, трифлусульфурон-метил переноситься в точки росту, швидко уповільнює поділ клітин та зупиняє ріст.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, г/га	Максимальна кількість обробок
Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів культури від фази появи сім'ядоль з інтервалом 7-10 днів	30 + ПАР Мачо	3

Обов'язковою умовою при використанні Панголіна як одним продуктом чи в баковій суміші є додавання ПАР Мачо.

Після обприскування рослин гербіцидом вже за кілька годин зупиняється ріст чутливих бур'янів. Через 4-7 днів після обробки помітні перші візуальні симптоми – хлороз листя. Через 2-4 тижні настає повна загибель бур'янів.

Час загибелі бур'янів залежить від погодних умов, виду та фази розвитку.



Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





ПЕРУН



Селективний ґрунтовий гербіцид для захисту від однорічних дводольних та злакових бур'янів

Переваги

- Ефективно контролює однорічні дводольні бур'яни. Максимальний контроль гірчиці польової та редьки дикої.
- Довготривала захисна дія – 10-12 тижнів (залежно від погодних умов).
- Ідеальний партнер для бакових сумішей з іншими ґрунтовими гербіцидами.
- Не фітотоксичний

Характеристики

Вміст діючої речовини прометрин, 500 г/л

Хімічна група триазини

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ II клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Норма витрати продукту залежить від механічного складу ґрунту та вмісту гумусу. На легких ґрунтах застосовуються мінімальні норми, на важких (високогумусних) збільшується норма витрати до максимальної.

Сумісність

Ідеальний партнер для бакових сумішей. Сумісний з більшістю продуктів. Застосовується разом з іншими ґрунтовими гербіцидами для розширення спектру дії (ацетохлор, метолахлор, пропізохлор). Однак у приготуванні бакової суміші слід провести пробне випробування на сумісність

Вимоги до pH робочого розчину

6-7

Застереження у застосуванні

Після застосування продукту не рекомендовано проводити міжрядні обробітки, оскільки це може зменшити гербіцидну дію.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Прометрин поглинається як проростками, так і корінням проростаючих бур'янів при застосуванні продукту до їхніх сходів. На бур'яни, що зійшли, прометрин діє через листя. Ефективність досягається завдяки здатності прометрину блокувати процес фотосинтезу бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Соняшник		Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з висіванням або до появи сходів культури	2,0-4,0	1	-
Горох	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або у фазі 2-х справжніх листків культури	3,0-5,0	1	-
Морква			2,0-3,0	1	120

Для покращення синергічної дії проти дводольних бур'янів та однорічних злакових на соняшнику в системі ґрунтового внесення (в залежності від ґрунтово-кліматичних умов) рекомендована наступні бакові суміші : Перун + Сора-Нет, Перун + Дабл Трай



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ПІРАМІДА



Селективний системний гербіцид для контролю однорічних та багаторічних коренепаросткових дводольних бур'янів

Переваги

- Знищує як наземну частину, так і кореневу систему бур'янів
- Широкий спектр застосування
- Знишує проблемні бур'яни: осот, ромашка, гірчак (види), нетреба звичайна, паслін та інші

Характеристики

Вміст діючої речовини клопіralід, 300 г/л

Хімічна група похідні піридінкарбонової кислоти

Препаративна форма водний розчин

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Оптимальний результат та максимально швидка гербіцидна дія продукту досягається при застосуванні продукту на листках молодих бур'янів у активній фазі розвитку. Найсприятливіший період для використання продукту: температура від 10°C до 25°C.

Сумісність

Можливе використання в бакових сумішах

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 8

Застереження у застосуванні

Не змішувати з фунгіцидами та регуляторами росту, які мають ретардантний ефект, а також з фосфорорганічними інсектицидами.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Клопіралід проникає в рослину через надземну частину і частково з вологого ґрунту через кореневу систему. Клопіралід є синтетичною формою натуральних рослинних гормонів, які заміняють натуральні гормони рослин, блокуючи їх функції. Перенасичення синтетичними гормонами призводить до порушення ростових процесів та загибелі рослин.

Клопіралід поглинається листям і корінням, транспортується по рослині та накопичується в меристематичних тканинах, пригнічує дихання і ріст клітин. знищує як наземну, так і кореневу систему бур'янів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Буряки цукрові	Однорічні та багаторічні коренепаросткові дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 1-3 пари справжніх листків культури	0,3-0,5	1
Кукурудза*	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4 Д та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування культури від фази 3-5 листків культури	0,5-1,0	1
Ріпак*	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 6-8 листків у однорічних бур'янів, у фазі розетки - початку формування генеративного пагону 2-8 см (проти осотів)	0,3-0,5	1
Пшениця*	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4 Д та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури	0,3-0,5	1

*Очікуємо на реєстрацію

Для знищення надземної частини та коренової системи осоту (види) рекомендується застосування гербіциду Піраміда у фазі розвитку «розетки» (висота осоту 15-20 см).

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





ПРИМУС

пшениця



ячмінь



кукурудза



Післясходовий гербіцид для захисту від широкого спектру однорічних та багаторічних дводольних бур'янів

Переваги

- Знищує широкий спектр дводольних бур'янів.
- Наявність двох діючих речовин з різними механізмами дії знижує ризик виникнення резистентності.
- Відсутня післядія на наступні культури в сівозміні.

Характеристики

Вміст діючої речовини

2-етилгексиловий ефір, 2,4 Д – 452 г/л
+ флорасулам, 6,3 г/л

Хімічна група

похідні хлорфеноксиоцтової кислоти
+ триазолпіримідини

Препаративна форма

суспензійна емульсія

Класифікація ВООЗ

II клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Застосовувати можна при температурі від +10°C до +25°C. Але найбільш оптимальна температура більше +15°C, коли йде активне нарощання вегетативної маси бур'янів, продукт діє швидше. У разі пізнього внесення, по перерослих бур'янах норма витрати обирається максимальна.

Сумісність

У бакових сумішах поєднується з інсектицидами, фунгіцидами, регуляторами росту і азотними добривами. Перед застосуванням необхідно перевірити суміш на сумісність компонентів.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Застереження у застосуванні

Забороняється обробка посівів при загрозі нічних заморозків та/або після них протягом 3-4 днів.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.





Механізм дії

Завдяки відмінній системній активності, 2-етилгексиловий ефір та фlorасулам легко проникають по тканинах бур'янів і швидко (протягом години) поширюючись по рослині, блокують ростові процеси. Візуальні симптоми уражень у чутливих бур'янів з'являються через 1-3 дні після обробки, а їх загибель настає на 7-14 день.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Зернові злакові культури	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування від початку фази кущення до утворення другого міжвузля (ВВСН 21-32)	0,3-0,5
Кукурудза		Обприскування з фази 3-х до фази 5-ми листків у культури (ВВСН 13-15)	0,4-0,6



Примус + Мачо на 7-й день після внесення

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





РИМ



Селективний післясходовий гербіцид для захисту від злакових та деяких дводольних бур'янів

Переваги

- Не загрожує культурі завдяки швидкому розпаду в рослинах кукурудзи.
- Має широкий спектр дії та низьку норму витрати.
- Відмінний партнер у бакових сумішах.
- Не загрожує забрудненням ґрунтовим водам, що дає змогу застосовувати препарат навіть у водоохоронних зонах.

Характеристики

Вміст діючої речовини римсульфурон, 250 г/кг

Хімічна група сульфонілсечовини

Препаративна форма водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Не має обмежень у сівозміні. Для ефективного контролю багаторічних злакових бур'янів обробіток слід проводити за висоти 10-15 см.

Сумісність При використанні у баковій суміші рекомендовано проводити пробне змішування.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Застереження у застосуванні

Не бажано використовувати продукт при температурі нижче +10°C і вище +25°C. Заборонено використовувати на полях кукурудзи протягом 10 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Римсульфурон пригнічує поділ клітин в точках росту пагонів і коріння в чутливих бур'янів. Поглинання здійснюється головним чином листям. Поглинання через кореневу систему залежить від вологості ґрунту і обмежене за часом.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, г/га
Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові і деякі дводольні бур'яни	Обприскування з фази 3-х до фази 7-ми листків у культури (ВВСН 13-17)	40-50 + ПАР Мачо



Рим на 10-й день після внесення

Для розширення спектру контролюваних бур'янів рекомендовано використовувати у бакових сумішах: Ефімер або Дикамба-Форте або Примус.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





САХАРА



Селективний ґрунтовий гербіцид для захисту від однорічних злакових та деяких дводольних бур'янів

Переваги

- Тривалий період захисної дії.
- Не впливає на наступні культури сівозміни.
- Висока ефективність за умов недостатнього зволоження ґрунту.

Характеристики

Вміст діючої речовини ацетохлор, 900 г/л

Хімічна група хлорацетаміди

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ II клас (високо-токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найбільший ефект досягається, коли ґрунт перед внесенням продукту знаходиться у вологому та дрібногрудочковатому стані з мінімальними залишками рослинних решток.

Сумісність

Сумісний з більшістю продуктів. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням бакової суміші, слід провести пробне випробування на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

Під час прохолодної погоди та високої вологості ґрунту продукт може проявляти фіtotоксичну дію на культуру.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Ацетохлор діє на проростаючі бур'яни, проникає у тканини шилець і коренів, активно гальмує ріст і поділ клітин, порушує в них білковий та ліпідний обмін. Порушення обміну речовин, спричинене ацетохлором, є незворотнім процесом, у результаті чого проростки зупиняють ріст та гинуть, не з'являючись на поверхні ґрунту. При дотриманні технології внесення продукту, Сахара забезпечує відсутність бур'янів протягом 4-8 тижнів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни.	Обприскування ґрунту до свіби, одночасно з сівбою, після сівби, але до сходів культури	1,5-3,0
Соняшник			



Сахара на 30-й день після внесення

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту



СОРА-НЕТ



Досходовий селективний гербіцид для боротьби із однорічними злаковими та деякими дводольними бур'янами

Переваги

- Відсутність фітотоксичної дії на культури.
- Високоефективний захист при зниженні температури повітря та ґрунту.
- Швидко розкладається у ґрунті.
- Відмінний партнер для бакових сумішей.
- Не має обмежень у сівозміні.

Характеристики

Вміст діючої речовини пропізохлор, 720 г/л

Хімічна група хлорацетаміди

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Найбільший ефект досягається, коли ґрунт перед внесенням продукту знаходиться у вологому та дрібногрудочковатому стані з мінімальними залишками рослинних решток.

Сумісність Сумісний з більшістю продуктів. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням бакової суміші, слід провести пробне випробування на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 9

Застереження у застосуванні

Робочий розчин необхідно використати протягом декількох годин після приготування.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Пропіохлор швидко адсорбується головним чином через кореневу систему бур'янів і інгібує синтез протеїнів, що призводить до зупинки поділу клітин і відмирання рослин. Продукт слабо пригнічує бур'яни, які зійшли на момент обробки.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Соняшник, соя			
Кукурудза	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву, після посіву, але до появи сходів культури	2,0-3,0
Ріпак			
Цукровий буряк*	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	2,0-3,0

*Очікуємо на реєстрацію



Ділянка без внесення 33Р



Сора-Нет + Айдахо

Сора-Нет відмінний партнер у бакових сумішах з продуктами: Айдахо або Дабл-Трай або Перун або Клаттер.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





СТАРЛЕНТ



Грунтовий досходовий гербіцид системної дії для контролю однорічних злакових та дводольних бур'янів

Переваги

- Забезпечує широкий спектр та тривалий контроль бур'янів.
- Має м'яку дію на культурні рослини.
- Відсутність обмежень у сівозміні.

Характеристики

Вміст діючої речовини пропізохлор, 360 г/л + тербутилазин, 190 г/л

Хімічна група триазини та хлорацетаміди

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найбільший ефект досягається, коли ґрунт перед внесенням продукту знаходиться у вологому та дрібногрудковому стані з мінімальними залишками рослинних решток.

Сумісність

Сумісний з більшістю продуктів. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням базової суміші, слід провести пробне випробування на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

Від 7 до 9

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Пропізохлор швидко адсорбується головним чином через кореневу систему бур'янів і інгібує синтез протеїнів, що призводить до зупинки поділу клітин і відмирання рослин.

Тербутилазин руйнує хлоропласти та пригнічує процес фотосинтезу. Як наслідок, призупиняється дихання та порушується енергетичний баланс, що викликає порушення загальної життєдіяльності бур'яну та призводить до його загибелі. При ґрунтовому застосуванні поглинається корінням.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Кукурудза, соняшник			3,8-4,5	1
Соя, горох	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сходів культури	3,8-4,5	1
Нут			3,2-4,5	1

Якщо після внесення гербіциду випадає значна кількість опадів, можливе відбивання крапель робочого розчину, що може привести до прояву фіtotоксичності молодих рослин.

ГЕРБІЦИДИ

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту



СУМАРО



**Селективний системний післясходо-
вий гербіцид для контролю одноріч-
них та багаторічних дводольних бур'я-
нів.**

Переваги

- Відмінний контроль падалиці культурних рослин (соняшнику та ріпаку) в т.ч. стійких до імідазоліонів та триbenuron-метилу.
- Відсутність фітотоксичного впливу на культуру.
- Має ґрутову дію, що запобігає появі наступних хвиль бур'янів.

Характеристики

Вміст діючої речовини мезотріон, 480 г/л

Хімічна група трикетони

Препаративна форма концентрат сусpenзїї

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Для ефективної роботи продукту потрібне сонячне світло та якісне покриття рослини робочим розчином. Рекомендоване застосування в ранковий час за відсутності роси. Не слід застосовувати інсектициди на основі фосфорорганічних сполук та тіокарбаматів за 7 днів до або після застосування гербіциду Сумаро

Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів, однак перед цим необхідно провести пробне змішування.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

Наступного року після застосування продукту не рекомендується вирощувати цукровий буряк, горох, нут та овочі. Сою, соняшник та ріпак рекомендовано висівати після оранки; кукурудзу, сорго, пшеницю, ячмінь — без обмежень.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Мезотріон блокує дію важливого рослинного ензиму та запобігає формуванню каротиноїдів у бур'янів. Без каротиноїдів світлова енергія та побічні продукти фотосинтезу руйнують хлорофіл та клітинні мембрани. У результаті відбувається швидке знебарвлення листків, слідом – некроз та загибель бур'янів. Мезотріон швидко проникає у рослину через листя, корені та пагони, і спричинює зупинку росту чутливих бур'янів протягом 1-2 днів після застосування та повне їх знищенння протягом 2-х тижнів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 3-8 листків культури	0,25 + ПАР Мачо	1

Для розширення спектру дії та підвищення ефективності рекомендуємо наступні бакові суміші: Сумаро + Мусон + Мачо; Сумаро + Рим + Мачо



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ФОРІТ



Гербіцид системної дії для боротьби з однорічними та деякими багаторічними дводольними бур'янами, в тому числі стійкими до 2,4-Д

Переваги

- Широке вікно застосування.
- Відсутність фітотоксичної дії.
- Високоектичний проти берізки польової на всіх етапах її розвитку, підмаренника чіпкого та видів гірчаків.

Характеристики

Вміст діючої речовини флуороксипір, 333 г/л

Хімічна група похідні піридину

Препаративна форма концентрат, що емульгується

Класифікація ВООЗ II клас (високо-токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Продукт контролює тільки ті рослини чутливих видів бур'янів, сходи яких були наявні під час обприскування та знаходяться в стадії активної вегетації.

Сумісність Продукт сумісний з іншими пестицидами, рідкими азотними добривами та регуляторами росту рослин. Перед приготуванням робочого розчину в суміші з іншими продуктами, рекомендується перевірити фізичну змішуванність продуктів у малій ємкості.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Флуроксипір блокує дію гормону росту рослин (ауксину) та впливає на ростові процеси рослинних клітин та на загальні ростові процеси рослин чутливих видів бур'янів.

Не застосовувати препарат одразу після заморозків чи при очікуванні заморозків у ніч після обробітку. Не використовувати препарат, коли посіви перебувають у стресовому стані (посуха, перезволоження ґрунту та ін.). Температура в межах від +8 до +25°C є рекомендованою для використання гербіциду. Саме за цих умов рослини бур'янів нормально розвиваються, що сприяє активному проникненню гербіциду через листову поверхню та переміщення до точок росту рослини.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза	Однорічні (в т.ч. підмаренник чіпкий)	Обприскування посівів у фазу 2-5 листків у культури	0,5-0,6
Сорго	та деякі багаторічні (в т.ч. берізка польова) дводольні бур'яни	Обприскування посівів в період вегетації у фазі від 2 до 5 листків	0,3-0,5
Пшениця		Обприскування від фази кущіння до фази прапорцевого листка у культури (після появи березки польової)	0,3-0,5

Для знищенння вегетуючих злісних бур'янів (берізка польова, види гірчаків, осотів) після збирання культури, в баковій суміші з Форитом можна використовувати Напалм або Напалм Форте. Норми витрати залежать від фітосанітарного стану поля після збирання.

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту



ХАРУМА



Селективний післясходовий гербіцид, призначений для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими бур'янами у посівах сільськогосподарських культур

Переваги

- Знищення не тільки надземної частини, а й кореневої системи бур'янів.
- Ефективний у боротьбі з усіма видами однорічних і багаторічних злакових бур'янів, в т.ч. падалицею зернових.
- Широкий спектр використання на дводольних культурах.

Характеристики

Вміст діючої речовини хізалофоп-П-етил, 125 г/л

Хімічна група належить до похідних 2 - (4-арилоксифенокси) пропіонових кислот

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ II клас (високо-токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Перші симптоми пригнічення бур'янів з'являються через 7-10 діб після обприскування у вигляді пожовтіння верхівок паростків. Повна загиbelь бур'янів настає через 2-3 тижні після обробки.

Сумісність

Не рекомендовано змішувати з іншими пестицидами і мікродобривами.

Вимоги до pH робочого розчину

від 7 до 9

Застереження у застосуванні

Не рекомендується обробляти гербіцидом культури в стані стресу внаслідок приморозків, вітру, пошкодження шкідниками, внесених раніше гербіцидів. Після внесення 5-7 днів не використовувати бакові суміші з фосфорорганічними сполуками.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Хізалофоп-П-етил має системну дію. Він дуже швидко поглинається листям та іншими надземними частинами бур'янів і розноситься до точок росту паростків і кореневищ. Продукт порушує синтез ліпідів, що веде до загибелі рослин.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Соняшник, соя, ріпак, буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування бур'янів у фазі 2-4 листків	0,6-0,8	1
Соняшник, соя, ріпак, буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування за висоти бур'янів 10-15 см	1,0-1,2	1



Норму витрати робочого розчину необхідно корегувати залежно від густоти стояння соняшника та ярусності сої, ріпаку.

Високоефективний проти падалиці зернових на посівах сільськогосподарських культур, при цьому селективний по відношенню до культури.

Найбільшеefективним є застосування у фазі розвитку падалиці від 2-3 листочків до початку кущення.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ШЕРИФ



Післясходовий гербіцид системної дії для контролю дводольних бур'янів.

Переваги

- Широкий спектр контролюваних бур'янів.
- Сумісний з більшістю засобів захисту рослин.
- Широке вікно застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини трибенурон-метил, 750 г/кг

Хімічна група сульфонілсечовини

Препаративна форма водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний), безпечний для бджіл, птахів, риб

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найкращий ефект досягається при внесенні продукту в період активного росту бур'янів (фаза 2-4 листків у однорічних, розетки – у багаторічних). У культури фаза розвитку може бути від 2-3 листків до появи прапорцевого листка. Оптимальна температура повітря від +10°C до +25°C. Обробка при низьких температурах від +5°C не впливає на ефективність дії продукту, проте дещо збільшує час настання загибелі бур'янів.

Сумісність

Сумісний з більшістю засобів захисту рослин, що використовуються для захисту зернових культур. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням бакової суміші, слід провести пробне випробування на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 7 до 8

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.



Механізм дії

Трибенурон-метил за способом дії належить до інгібіторів синтезу амінокислот. Проникаючи через листя, стебла та коріння, транспортується до точок росту, блокує виробництво основних амінокислот та поділ клітин. Через 2-3 години після обробітку чутливі рослини бур'янів призупиняються у рості та розвитку, перестають поглинати з ґрунту воду та мінеральні речовини, та конкурувати з культурними рослинами. Візуальні ознаки дії препарату спостерігаються через 5-8 днів і проявляються в побурінні та загибелі бур'янів. Молоді бур'яни гинуть на 2-3 дні раніше ніж більш пізніх стадій розвитку.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, г / га	Максимальна кількість обробок
Озима пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни у т.ч. стейкі до 2,4-Д бур'яни.	Обприскування культури від фази 2 – 3 листків до прaporцевого листка включно	20-25 + ПАР Мачо	1
Ярі пшениця та ячмінь		Обприскування культури від фази 2 – 3 листків до виходу в трубку культури	15 + ПАР Мачо	1

Для розширення спектру дії в боротьбі з падалецею соняшника (види) у посівах зернових рекомендуємо використовувати у баковій суміші з Аксакалом.

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту






ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ БУР'ЯНІВ
У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ

+ **МУССОН**
СУМАРО





Синергія 2-х діючих речовин дозволяє **знищувати однорічні та багаторічні злакові та однорічні та деякі багаторічні дводольні види бур'янів.**

НІКОСУЛЬФУРОН

- Швидко розкладається у ґрунті
- Безпечний для наступних культур в сівозміні
- Знищує як вегетативну частину так і кореневу систему бур'яну

01

МЕЗОТРІОН

- Має пролонговану дію
- Стримує появу наступних хвиль бур'янів за рахунок ґрунтової дії
- Має високу ефективність у боротьбі з падалицею соняшнику та ріпаку.

02



Рекомендована для внесення фаза розвитку культури від ВВСН-13 до ВВСН-17



Фунгіциди



Фунгіциди

АБСОЛЮТ 88 (карбендаузим, 500 г/л)	ДОТ 90 (ципроконазол 80 г/л, пропіконазол 250 г/л)	КАМЗОЛ 92 (метконазол, 60 г/л)
КАМЗОЛ 94 ТУРБО ципроконазол, 80 г/л метконазол, 60 г/л	КІТЧ 96 ципродініл, 375 г/кг флудіоксаніл, 250 г/кг	МЕЦЕНАТ 98 (пропіконазол, 250 г/л)
ПАРАЦЕЛЬС 100 (флутріафол, 250 г/л)	ПЕГАС 102 (прохлораз, 450 г/л)	САЛЬТО 104 (тіофанат-метил, 500 г/л)
СПЛІТ 106 (дифеноконазол 250 г/л)	СПЛІТ ДУО 108 дифеноконазол, 125 г/л + азоксистробін, 125 г/л	СТАРК 110 (азоксистробін, 250 г/л)
ТАЛЕР 112 (тебуконазол, 250 г/л)	ТРИНОЛ 114 (фенгексамід, 500 г/кг)	УЛЬТРАЛІН 116 цимоксаніл, 300 г/кг + азоксистробін, 250 г/кг



* Зміст клікабельний.

Клацнувши по номеру сторінки або назві ви маєте можливість перейти безпосередньо до сторінки з описом продукту

** Абсолют - назва продукту

84 - номер сторінки

(карбендаузим, 500 г/л)- діюча речовина

АБСОЛЮТ



Локально системний фунгіцид для захисту проти грибкових захворювань

Переваги

- Відмінний контроль грибкових захворювань за найрізноманітніших кліматичних умов
- Має потужний «стоп-ефект», особливо на ранніх етапах розвитку патогенів.
- Традиційний компонент комплексних систем захисту рослин.
- Запобігає проникненню інфекції в разі механічних пошкоджень, градобою, розтріскування стебла.

Характеристики

Вміст діючої речовини карбендаузим, 500 г/л

Хімічна група похідні бензимідазолу

Препартивна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших ознаках інфекції для кожної окремо взятої хвороби. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

Сумісність

Сумісний з більшістю продуктів. Однак в кожному конкретному випадку необхідно попередньо перевірити продукти на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

Щоб запобігти виникненню резистентності, рекомендується бакова суміш з фунгіцидами різноманітних механізмів дії. Не рекомендується застосовувати продукт більше ніж двічі за сезон. У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

Повернутись до головного змісту



Механізм дії

Карбендаzin адсорбується листям рослин, швидко транслокується, блокує процеси ділення ядер грибів, затримує проростання їх спор, скорочує ріст міцелію, завдяки чому забезпечує максимальний захист багатьох культур від грибкових захворювань.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця яра та озима	Борошниста роса, септоріоз листя		0,5	2
Ячмінь ярий	Борошниста роса, сітчаста та темно-бура плямистості		0,5	2
Соняшник	Сіра гниль, біла гниль, фомоз	Обприскування в період вегетації	1,5	2
Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса		0,3-0,4	2
Соя	Церкоспороз, біла та сіра гниль		0,5-0,7	2
Ріпак озимий*	Альтернаріоз, септоріоз		0,6	2

*Очікуємо на реєстрацію

Для розширення спектру хвороб та їх контролю на озимій пшениці у фазі «кущення», рекомендуємо застосування бакової суміші фунгіцидів Абсолют + Парацельс.

Таке поєднання двох діючих речовин з контактною лікувальною та системною діями дозволить локалізувати поширення хвороб, захистити посіви у період відновлення вегетації та збереже листову поверхню до наступного фунгіцидного обробітку «на початку виходу у трубку».

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту



ДОТ



Універсальний фунгіцид з відмінною захисною та лікувальною дією

Переваги

- Відмінно проникає в рослину та швидка дія на збудників хвороб.
- Забезпечує тривалий захист.
- Широкий спектр хвороб, що контролюються.

Характеристики

Вміст діючої речовини	ципроконазол 80 г/л + пропіконазол 250 г/л
Хімічна група	триазоли
Препаративна форма	концентрат емульсії
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або прияві перших ознак хвороб. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.
Сумісність	Сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на сільськогосподарських культурах. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти продукти на сумісність.
Вимоги до pH робочого розчину	від 5 до 8
Застереження у застосуванні	У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.
Норма витрати робочого розчину	200-300 л/га.



Механізм дії

Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стиролів у мембронах клітини, рухається акропетально.

Пропіконазол рухається трансламінарно та має швидкий «стоп-ефект».

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Озима пшениця	Бура, стеблова та жовта іржа, борошниста роса, септоріоз листя і колосу, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	0,4 -0,5	2
Ячмінь	Бура іржа, борошниста роса, плямистості листя			2
Цукрові буряки	Церкоспороз, борошниста роса		0,5	2
Соя	Септоріоз, біла гниль, іржа		0,5	2
Соняшник	Іржа, септоріоз		0,5	2

Для розширення спектру дії на хвороби та підвищення захисного, викорінюючого та лікувального ефекту рекомендується використовувати бакову суміш ДОТ + Старк.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





КАМЗОЛ



Системний фунгіцид захисної і лікувальної дії

Переваги

- Висока ефективність контролю фузаріозу колосу.
- Має ріст-регулюючу дію на ріпак.
- Не втрачає свої захисні властивості незалежно від погодних умов.

Характеристики

Вміст діючої речовини метконазол, 60 г/л

Хімічна група триазоли

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Обприскування слід проводити при температурі повітря в межах від +10°C до +25°C, за швидкості вітру не вище 3 м/сек при дрібнокрапельному і 4 м/сек при крупнокрапельному обприскуванні.

Сумісність Препарат можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Однак перед цим необхідно провести пробне змішування.

Вимоги до pH робочого розчину від 4 до 9

Застереження у застосуванні У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.



Механізм дії

Механізм дії метконазолу заснований на інгібуванні біосинтезу ергостерину, порушенні біосинтезу клітинних мембрани гриба. Метконазол швидко проникає в рослину і розподіляється в ній акропетально.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Фузаріоз, септоріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	1,0-1,5	2
Ріпак	Фомоз, альтерніріоз, склеротініоз		0,75-1,25	2

Для досягнення найвищої ефективності у контролі фузаріозу колоса рекомендується використання Камзолу у баковій суміші з Талером у першій половині цвітіння ВВСН 61-65.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





КАМЗОЛ ТУРБО



**Комбінований системний фунгіцид
захисної та лікувальної дії**

Переваги

- Широкий спектр дії: пригнічує основні хвороби культур.
- Швидко проникає в рослину та забезпечує відмінну дію продукту.
- Широке вікно застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини ципроконазол, 80 г/л + метконазол, 60 г/л

Хімічна група триазоли

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Обприскування слід проводити за температури повітря в межах від +10°C до +25°C та швидкості вітру не вище 3 м/сек при дрібнокрапельному і 4 м/сек при крупнокрапельному обприскуванні.

Сумісність Продукт можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Однак перед цим необхідно провести пробне змішування.

Вимоги до pH робочого розчину Від 4 до 9

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.



Механізм дії

Ципроконазол зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стиролів у мембронах клітини, рухається акропетально.

Механізм дії метконазолу заснований на інгібуванні біосинтезу ергостерину, порушенні біосинтезу клітинних мембран гриба. Метконазол швидко проникає в рослину і розподіляється в ній акропетально.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Фузаріоз, септоріоз, іржа, альтернаріоз, борошниста роса		0,5-0,7	2
Ячмінь озимий та ярий	Фузаріоз, септоріоз, іржа, альтернаріоз, борошниста роса, сітчаста плямистість, ринхоспоріоз		0,5-0,7	2
Ріпак	Фомоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	0,5-0,7	2
Соняшник	Іржа, борошниста роса, альтернаріоз		0,5-0,7	2
Соя	Іржа, фузаріоз, септоріоз, борошниста роса, альтернаріоз		0,5-0,7	2

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





КІТЧ



Двокомпонентний фунгіцид, має високу ефективність проти широкого спектру хвороб плодів та ягід

Переваги

- Широкий спектр та ефективний контроль збудників, які спричиняють гнилі плодів та ягід.
- Короткий термін очікування.
- Покращує лежкість плодів під час зберігання.

Характеристики

Вміст діючої речовини ципродініл, 375 г/кг + флудіоксаніл, 250 г/кг

Хімічна група анілінопірімідини

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Рекомендується дотримуватись регламенту приготування робочого розчину для вододисперсних гранул.

Сумісність Сумісний з іншими продуктами. Перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до pH робочого розчину від 5 до 9

Застереження у застосуванні Не застосовувати продукт пізніше зазначеного у таблиці строку останньої обробки до збирання врожаю.

Норма витрати робочого розчину Для польових культур 200-300 л/га, для плодових насаджень 800-1000 л/га, виноградників 600-800 л/га



Механізм дії

Ципродініл діє на чотирьох етапах розвитку патогена, забезпечуючи захист від його проникнення в клітину. Після застосування ципродініл та флудіоксаніл залишаються в кутикулярному шарі плодів, захищаючи від поширення патогена по її тканинах, швидко проникає в тканини рослини і перерозподіляється трансламінарно. Дія продукту починає проявлятися через 2-3 години після застосування.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг / га	Макси- мальна кількість обробок	Строк очікування після обробки, діб
Яблуня, слива, черешня	Хвороби плодів під час іхнього зберігання у сховищах	Обприскування в період вегетації	0,75 - 1,0	2	20
Слива, черешня	Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль			2	20
Виноградники	Сіра гниль			2	10
Томати (відкритого та закритого ґрунту)	Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра та сіра гнилі)			2	10
Суниці	Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса			2	14
Лохина	Антракноз, моніліоз ягід, пеніціліозна та сіра гнилі, фомоз			2	30
Морква	Альтернаріоз, склеропотініоз			2	14
Малина, ожина	Сіра гниль			2	14



Без обробок



Кітч

Найбільш пошиrenoю хворобою є сіра гниль, адже саме вона викликає загнивання ягід.

Збудник - грибок, Botrytis. Хвороба розвивається при вологій погоді, в результаті чого ягоди загнивають.



МЕЦЕНАТ

пшениця



ячмінь



соняшник



щукрові буряки



соя



Системний фунгіцид для захисту від комплексу хвороб листя

Переваги

- Широкий спектр фунгіцидної дії.
- Володіє високою фунгіцидною активністю проти збудників септоріозу листя, іржі та борошнистої роси.
- Має лікувальну та захисну дію.

Характеристики

Вміст діючої речовини пропіконазол, 250 г/л

Хімічна група триазоли

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (малотоксичний)

Рекомендації щодо застосування**Особливості застосування**

Продукт максимально ефективний при проведенні обробок профілактично або при появі перших ознак розвитку хвороб.

Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 6 до 8

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Пропіконазол поступає в рослини і переміщується акропетально. Він вологості та лікувальною дією на збудників хвороб, припиняє їх подальший розвиток і пригнічує у них спороутворення. Дія продукту починає проявлятися через 2-3 години після обробки. Проти борошнистої роси він активний протягом 3-4 тижнів, іржі – 4-5 тижнів, в умовах епіфіtotій – до 2-х тижнів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Борошниста роса, іржа (види), септоріоз листя і колосу, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	0,5	2
Ячмінь			0,5	2
Соняшник	Іржа		0,5	2
Цукрові буряки	Церкоспороз, борошниста роса		0,5	2
Соя*	Церкоспороз, антракноз, альтернаріоз, аскохитоз, фомоз		0,5	2

*Очікуємо на реєстрацію

Для досягнення найвищої ефективності у контролі хвороб рекомендується використання у баковій суміші з Абсолютом або Сальто.




Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту



ПАРАЦЕЛЬС



Фунгіцид контактно-системної дії від комплексу хвороб

Переваги

- Один з наймобільніших продуктів з групи триазолів.
- Тривала захисна дія, що переноситься на новоутворені органи рослин.
- Висока ефективність проти комплексу основних хвороб.

Характеристики

Вміст діючої речовини флутріафол, 250 г/л

Хімічна група триазоли

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших ознаках інфекції. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

Сумісність

Сумісний з більшістю продуктів. Однак у кожному конкретному випадку, перед приготуванням базової суміші, слід провести пробне випробування на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 6 до 8

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Флутріафол швидко поглинається листовою поверхнею культури, переноситься акропетально від основи до вершини і починає діяти одразу після внесення. Діє як інгібітор біосинтезу поживних речовин шкідливих видів грибів, що призводить до руйнування клітинних мембрани збудників хвороб та зупинки їх розвитку. Системна та контактна дія доповнюється фумігаційним ефектом. Розчин, випаровуючись, формує фумігаційну хмару, яка накриває всю рослину.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця, ячмінь	Борошниста роса, септоріоз, іржа (види)	Обприскування в період вегетації	0,5	2
Цукрові буряки	Борошниста роса, церкоспороз, фомоз		0,25	2
Соя	Септоріоз, іржа		0,5	2
Соняшник	Іржа, септоріоз		0,5	2
Ріпак озимий та ярий*	Альтернаріоз, циліндроспороз		0,5	2

*Очікуємо на реєстрацію

Для досягнення найвищої ефективності у контролі хвороб у період відновлення весняної вегетації озимих культур та на початкових етапах розвитку ярих культур рекомендується використання у баковій суміші з Абсолютом або Сальто.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





ПЕГАС



Контактно-системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту рослин від комплексу збудників хвороб

Переваги

- Поєднує як профілактичну, так і викорінюючу та лікувальну дії.
- Має широкий спектр фунгіцидної дії.
- Ефективний контроль хвороб на всіх стадіях розвитку зернових культур.

Характеристики

Вміст діючої речовини прохлораз, 450 г/л

Хімічна група імідазоли

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обприскування слід проводити при температурі повітря від +10°C до +25°C, а тому обробку слід проводити у ранішні та вечірні години за швидкості вітру не вище 3 м/сек.

Сумісність

Продукт сумісний з іншими продуктами. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Прохлораз інгібує біосинтез стерину в клітинах гриба, що призводить до руйнації клітинних стінок патогена, зупинки росту міцелію та його швидкої загибелі.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Макси- мальна кількість обробок
Пшениця озима	Борошниста роса, септоріоз, іржа, церкоспорельоз	Обприскування в період вегетації	1,0	2
Ячмінь ярий	Борошниста роса, рінхоспоріоз			2

Найбільш ефективним є застосування у період відновлення весняної вегетації для контролю спектру хвороб, що виникають у наслідок неблагоприятливих умов під час перезимівлі.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
головного змісту





САЛЬТО



Системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту від комплексу збудників хвороб рослин

Переваги

- Має швидку і водночас подовжену захисну дію.
- Широкий спектр дії.
- Має лікувальну та викорінюючу дії.

Характеристики

Вміст діючої речовини тіофанат-метил, 500 г/л

Хімічна група бензимідазоли

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Продукт застосовують шляхом обприскування культур для попередження появи захворювань або за наявності ознак ураження.

Сумісність Гнучкий у змішуванні з іншими продуктами, окрім лужних. Не змішувати з мідьвмісними продуктами.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

Для польових культур 200-300 л/га, для плодових насаджень 800-1000 л/га, виноградників 600-800 л/га



Механізм дії

Завдяки системній дії тіофанат-метил швидко розподіляється по рослині. Унікально поєднує профілактичну і лікувальну дії, має викорінюючий ефект.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок	Строк очікування після обробки, діб
Пшениця	Борошниста роса, септоріоз, бура іржа, фузаріозна і церкоспорельозна кореневі гнилі	Обприскування в період вегетації	1,2-1,4	2	20
Соняшник	Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиніоз (біла гниль)		1,2-1,4	2	20
Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса		0,8-1,2	3	20
Соя	Церкоспороз, іржа, борошниста роса		1,0-1,4	2	20
Капуста	Фузаріозне в'янення, фомоз, борошниста роса, сіра та біла гнилі		1,5-2,0	2	14
Яблуня	Парша, борошниста роса, моніліоз		1,2-1,6	3	20
Виноградники	Оїдіум, сіра гниль		1,0-1,5	3	30

Для розширення спектру хвороб та їх контролю рекомендуємо застосування бакової суміші фунгіцидів Сальто + Парацельс.

Таке поєднання двох діючих речовин з контактною лікувальною та системною діями дозволить локалізувати поширення хвороб на неуражені частини, захистити посіви у період відновлення вегетації та збереже листову поверхню до наступного фунгіцидного обробітку на початку виходу у трубку.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





СПЛІТ



Системний фунгіцид з профілактичною та лікувальною дієми

Переваги

- Швидке проникнення у тканини рослин та стійкий до змивання опадами.
- Чітко виражена системна дія.
- Має швидкий стоп – ефект.
- Відзначається вираженим позитивним фізологічним впливом на рослину.

Характеристики

Вміст діючої речовини дифеноконазол 250 г/л

Хімічна група триазоли

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

Сумісність Продукт можна використовувати в бакових сумішах із гербіцидами та фунгіцидами, однак перед цим рекомендовано провести пробне змішування.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

У разі недотримання регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії


Дифеноконазол проникає в тканини рослини, повністю інгібує ріст субкутикулярного міцелю, знижує рівень спороношення патогена. Дифеноконазол інгібує біосинтез ергостерину в клітинах гриба, що призводить до руйнації клітинних сіток патогена, зупинці росту міцелю та його швидкій загибелі.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Макси- мальна кількість обробок
Пшениця озима	Септоріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	0,2-0,4	2
Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз		0,2-0,4	2
Цукровий буряк, соя*	Борошниста роса, церкоспороз		0,5	2

*Очікуємо на реєстрацію

Для розширення спектру дії на хвороби та підвищення захисного, викорінюючого та лікувального ефекту рекомендується використовувати у бакових сумішах з фунгіцидами Старк або Меценат.



Спліт + Меценат

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
головного змісту





СПЛІТ ДУО



**Комбінований системний фунгіцид
захисної та лікувальної дії**

Переваги

- Тривалий захисний період
- Висока ефективність проти широкого спектру хвороб
- Діє на всі стадії розвитку хвороби
- Ефективний захист від хвороб під час цвітіння та формування врожаю

Характеристики

Вміст діючої речовини	дифеноконазол, 125 г/л + азоксистробін, 125 г/л
Хімічна група	триазоли + стробілурини
Препаративна форма	концентрат сусpenзїї
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.
Сумісність	Продукт можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Однак перед цим необхідно провести пробне змішування.
Вимоги до pH робочого розчину	від 5 до 8
Застереження у застосуванні	Не рекомендовано використання продукту на рослинах, які перебувають у стані стресу та/або є загроза посухи та впливу високих температур.
Норма витрати робочого розчину	200-300 л/га



Механізм дії

Дифеноконазол діє як інгібітор біосинтезу ергостеролу грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембрани та зупинки розвитку грибних захворювань. Проникаючи крізь листову пластинку, азоксистробін захищає її з обох боків від проникнення збудників. Продукт інгібує проростання спор та апресоріїв, впливає на проростаючі гіфи грибів, володіє вираженою антиспорулентною дією.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Ріпак	Фомоз, альтернаріоз, біла гниль, сіра гниль, переноспороз.	Обприскування в період вегетації	0,5-1,0	2
Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, іржа, фомопсис, біла гниль		0,5-1,0	2
Соя	Септоріоз, альтернаріоз, церкоспороз, переноспороз, борошниста роса		0,5-1,0	2
Цукрові буряки	Церкоспоріоз, рамуляріоз, борошниста роса		0,75-1,0	2

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту



СТАРК

пшениця



соняшник



томати



соя



Локально-системний фунгіцид захисної і лікувальної дії для захисту від комплексу хвороб рослин

Переваги

- Ефективний проти 4 класів грибів: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes.
- Забезпечує відсутність перехресної стійкості патогенів.
- Відзначається вираженим позитивним фізологічним впливом на рослину.

Характеристики

Вміст діючої речовини азоксистробін, 250 г/л

Хімічна група стробілурини

Препаративна форма концентрат сусpenзїї

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Однак перед цим необхідно провести пробне змішування.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

Не рекомендовано використання продукту на рослинах, які перебувають у стані стресу та/або є загроза посухи та впливу високих температур.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Проникаючи крізь листову пластинку, азоксистробін захищає її з обох боків від проникнення збудників. Азоксистробін інгібує проростання спор та апресоріїв, впливає на проростаючі гіфи грибів, володіє вираженою антиспорулентною дією.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок	Строк очікування після обробки, діб
Пшениця	Іржа, борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період вегетації	0,6-0,8	2	30
Соняшник	Несправжня борошниста роса, фомоз, фомопсис		0,8-1,0	2	30
Томати	Фітофтороз, альтернаріоз		0,6-0,8	3	14
Соя	Септоріоз, переноспороз, склеротініоз		0,6-0,8	2	30

Для розширення спектру дії на хвороби та підвищення захисного, викорінюючого та лікувального ефекту рекомендується використовувати у бакових сумішах з фунгіцидами триазольної групи.

Крім фунгіцидної дії Старк має фізіологічний ефект на культурні рослини, що проявляється у підвищенні транспірації та ефективності фотосинтезу, «green-effect».

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





ТАЛЕР



Системний фунгіцид для захисту від комплексу збудників хвороб

Переваги

- Добре виражений «стоп-ефект».
- Володіє захисною, викорінюючою та лікувальною діями.
- Відмінний контроль фузаріозу колосу.
- Проявляє ріст-регулюючу дію на ріпак.

Характеристики

Вміст діючої речовини тебуконазол, 250 г/л

Хімічна група триазоли

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ III клас небезпечності

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити за температури в межах +10°C - +25°C.

Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Тебуконазол інгібує біосинтез ергостерону в клітинах гриба, що призводить до руйнації клітинних стінок патогена, зупинки росту міцелію та його швидкої загибелі.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Бура листова іржа, септоріоз, фузаріоз та борошниста роса		0,5-1,0	2
Ріпак	Альтернаріоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації	0,5-1,0	2
Ріпак	Інгібування росту листя		0,5-0,75	2
Соя	Фузаріоз, альтернаріоз, склеротініоз		0,5-1,0	2

Використання фунгіциду Талер підвищує зимостійкість та забезпечує стійкість проти вилягання, сприяє кращому формуванню бічних пагонів. Талер швидко проникає в рослину, за 1-2 години. При цьому зберігає свою ефективність протягом декількох тижнів.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





ТРИНОЛ



Високоефективний фунгіцид для боротьби зі збудниками хвороб плодово-ягідних культур та винограду

Переваги

- Висока ефективність проти сірої гнилі.
- Покращує лежкість плодів.
- Не викликає резистентності у патогенів.
- Безпечний для споживачів та довкілля.

Характеристики

Вміст діючої речовини фенгексамід, 500 г/кг

Хімічна група похідні піридину

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Оптимальна температура для застосування +15 - +25 °C. Рекомендується дотримуватись регламенту приготування робочого розчину для водо-дисперсних гранул.

Сумісність Продукт сумісний з іншими продуктами. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Вимоги до pH робочого розчину від 5 до 9

Норма витрати робочого розчину Виноград- 600-800 л/га, Персик, Черешня- 800-1000 л/га, Суниця- 200-300 л/га.



Механізм дії

Після того, як фенгексамід потрапляє на поверхню рослини утворюється плівка, яка запобігає проникненню патогенів до тканини рослини. Ця плівка не зникає з поверхні рослини, що забезпечує тривалий період дії фунгіциду. Локалізований системний розподіл фенгексаміду в рослині відрізняє його як від контактних фунгіцидів, так і від типових системних фунгіцидів.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Макси- мальна кількість обробок	Строк очікування після обробки, діб
Виноградни- ки	Сіра гниль	Обприскування в період вегетації	1,0 - 1,5	2	15
Персик	Гнилі плодів		1,0 - 1,5	2	20
Суниці	Сіра гниль		1,0 - 1,5	2	10
Черешня	Гнилі плодів		1,0 - 1,5	2	20

Серед хвороб виноградників слід виділити сіру гниль. Ця хвороба щорічно знищує врожай винограду на 15-20%. Збудник хвороби має здатність паразитувати та рости навіть на відмерлих ділянках рослини.

Для сірої гнилі, характерна поява коричневих плям на листках і пагонах винограду. Сприяє поширенню хвороби волога погода. Хвороба починає вражати нижні листки рослини, і підіймається вгору по стеблу, тим самим заражаючи всю рослину і її плоди.

Для ефективної боротьби із сірою гниллю виноградники необхідно регулярно обробляти з моменту посадки й до збору врожаю. Для боротьби із хворобою рекомендуємо фунгіцид Тринол, який забезпечить надійний захист культури від сірої гнилі.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
головного змісту





УЛЬТРАЛІН



Комбінований локально-системний фунгіцид захисної та лікувальної дії для застосування на соняшнику та сої

Переваги

- Контроль комплексу грибкових хвороб.
- Швидке проникнення в рослину забезпечує відмінну дію препарату.
- Висока розчинність діючих речовин забезпечує швидке поширення фунгіциду по рослині й швидкий «стоп-ефект».

Характеристики

Вміст діючої речовини	цимоксаніл, 300 г/кг + азоксистробін, 250 г/кг
Хімічна група	морфоліни, стробілурини
Препаративна форма	водно-дисперсійні гранули
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.
Сумісність	Сумісний з іншими продуктами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.
Вимоги до pH робочого розчину	Від 5 до 7
Застереження у застосуванні	Не рекомендовано використання продукту на рослинах, які перебувають у стані стресу та/або є загроза посухи та впливу високих температур.
Норма витрати робочого розчину	200-300 л/га.



Механізм дії

Азоксистробін пригнічує проростання спор та конідій гриба, не дозволяючи інфекції проникнути в рослину. Механізм дії азоксистробіну у клітинах патогену полягає в інгібуванні мітохондріального дихання.

Цимоксаніл впливає відразу на кілька біохімічних реакцій у клітинах патогену. Він швидко проникає всередину листя та стебел і надає профілактичну, захисну та лікувальну дію. Цимоксаніл пересувається листям і стеблами знизу вгору. Ця властивість компенсує нерівномірність обробки.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг / га	Максимальна кількість обробок
Соняшник	Сіра та біла гниль, несправжня борошниста роса, фомоз, фомопсис, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	0,3-0,5	2
Соя	Переноспороз, альтернаріоз, септоріоз		0,3-0,5	2

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ФУЗАРІОЗ КОЛОСА

Фузаріоз є найбільш небезпечним захворюванням колоса пшениці. Основними джерелами інфекції є уражені рослинні рештки пшениці, ячменю, кукурудзи, інших культур. Фузаріоз колосу негативно впливає на врожайність, втрати можуть сягати до 40%. Крім того, фузаріозне зерно містить мікотоксини — отруйні речовини, небезпечної для людей та тварин.



Ураження колосків фузаріозом проходить саме під час цвітіння, коли відкриваються колоскові луски і патоген інфікує квітку. Активному розвитку цього процесу сприяють опади або краплинна волога.

В той час як на фузаріоз колосу звертають увагу лише в період цвітіння, контроль інших патогенів слід проводити протягом усього періоду вегетації.

**ЗАХИСТ
ПРОТИ
ФУЗАРІОЗУ**

КАМЗОЛ + ТАЛЕР





1 ділянка*

СИСТЕМА ЗАХИСТУ МІНІМАЛЬНА

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Відновлення вегетації кущіння
(ВВСН 23-25)

АЛЬФА СУПЕР (Альфа-циперметрин 100 г/л) - **0,15 л/га**
+ **ШЕРИФ** (Трибенурон-метил 750 г/кг) - **0,025 кг/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Вихід в трубку (ВВСН 31-32)

ПЕГАС (Прохлораз 450 г/л) - **1,0 л/га**
+ **МЕЦЕНАТ** (Пропіконазол 250 г/л) - **0,5 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Прапорцевий листок (ВВСН 39-40)

ЦИРКУЛЬ (Лямбда-цигалотрин 50 г/л) - **0,15 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ
Колосіння (ВВСН 51-59)

АЛЬФА СУПЕР (Альфа-циперметрин 100 г/л) - **0,15 л/га**
+ **ДОТ** (Ципроконазол 80 г/л + пропіконазол 250 г/л) - **0,5 л/га**

ДОБРИВА
КАС-32 150 кг/га



2 ділянка*

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СЕРЕДНЯ

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Відновлення вегетації кущіння
(ВВСН 23-25)

АЛЬФА СУПЕР (Альфа-циперметрин 100 г/л) - **0,15 л/га**
+ **ПРИМУС** (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д 452 г/л + флорасулам 6,3 г/л) - **0,5 л/га**
+ **САЛЬТО** (Тіофанат-метил 500 г/л) - **1,2 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Прапорцевий листок (ВВСН 39-40)

ЦИРКУЛЬ (Лямбда-цигалотрин 50 г/л) - **0,15 л/га**

+ **ДОТ** (Ципроконазол 80 г/л + пропіконазол 250 г/л) - **0,5 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ
Колосіння (ВВСН 51-59)

АЛЬФА СУПЕР (Альфа-циперметрин 100 г/л) - **0,15 л/га**
+ **ТАЛЕР** (Тебуконазол 250 г/л) - **0,8 л/га**

ДОБРИВА
КАС-32 200 кг/га

Врожайність, 6,31 т/га

Врожайність, 6,58 т/га

*Досліди проводились на **LNZ Hub**, Черкаська область, Звенигородський район



3 ділянка*

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ОПТИМАЛЬНА

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Відновлення вегетації кущіння
(ВВСН 23-25)

АКСАКАЛ (Флорасулам 250 г/кг) - **0,03 кг/га**
 + **МАЧО** (Етоксилат-ізодециловий спирт, 900 г/л) - **0,2 л/га**
 + **АЛЬФА СУПЕР** (Альфа-циперметрин 100 г/л) - **0,15 л/га**
 + **ШЕРИФ** (Трибенурон-метил 750 г/кг) - **0,025 кг/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Вихід в трубку (ВВСН 31-32)

АБСОЛЮТ (Карбендазим 500г/л) - **0,5 л/га**
 + **ПАРАЦЕЛЬС** (Флутріафол 250 г/л) - **0,5 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Пропорцевий листок (ВВСН 39-40)

ПРЕСТО (Клотіанідин 200 г/л + лямбда-цигалотрін 50 г/л) - **0,4 л/га**
 + **СТАРК** (Азоксистобін 250 г/л) - **0,75 л/га**
 + **ДОТ** (Ципроконазол 80 г/л + пропіконазол 250 г/л) - **0,5 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Колосіння (ВВСН 51-59)

АЛЬФА СУПЕР (Альфа-циперметрин 100 г/л) - **0,15 л/га**
 + **ТАЛЕР** (Тебуконазол 250 г/л) - **0,8 л/га**
 + **КАМЗОЛ** (Метконазол 60 г/л) - **0,2 л/га**

ДОБРИВА

КАС-32	250 кг/га
КАС-32	100 кг/га

Врожайність, 6,82 т/га

4 ділянка*

СИСТЕМА ЗАХИСТУ МАКСИМАЛЬНА

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Відновлення вегетації кущіння
(ВВСН 23-25)

АБСОЛЮТ (Карбендазим 500г/л) - **0,5 л/га**
 + **ПАРАЦЕЛЬС** (Флутріафол 250 г/л) - **0,5 л/га**
 + **АЛЬФА СУПЕР** (Альфа-циперметрин 100 г/л) - **0,15 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Кущіння (ВВСН 25-29)

АКСАКАЛ (Флорасулам 250 г/кг) - **0,03 кг/га**
 + **МАЧО** (Етоксилат-ізодециловий спирт, 900 г/л) - **0,2 л/га**
 + **ШЕРИФ** (Трибенурон-метил 750 г/кг) - **0,025 кг/га**
 + **АЛЬФА СУПЕР** (Альфа-циперметрин 100 г/л) - **0,15 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Вихід в трубку (ВВСН 31-32)

СТАРК (Азоксистобін 250 г/л) - **0,75 л/га**
 + **ДОТ** (Ципроконазол 80 г/л + пропіконазол 250 г/л) - **0,5 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Пропорцевий листок (ВВСН 39-40)

ПРЕСТО (Клотіанідин 200 г/л + лямбда-цигалотрін 50 г/л) - **0,4 л/га**
 + **МЕЦЕНАТ** (Пропіконазол 250 г/л) - **0,5 л/га**

ФАЗА ВНЕСЕННЯ

Колосіння (ВВСН 51-59)

ПРЕСТО (Клотіанідин 200 г/л + лямбда-цигалотрін 50 г/л) - **0,4 л/га** + **ТАЛЕР** (Тебуконазол 250 г/л) - **0,8 л/га**
 + **КАМЗОЛ** (Метконазол 60 г/л) - **0,2 л/га**

ДОБРИВА

КАС-32	250 кг/га
КАС-32	150 кг/га

Врожайність, 7,27 т/га

*Досліди проводились на **LNZ Hub**, Черкаська область, Звенигородський район



ІНСЕКТИЦИДИ

АЛЬТРОН 126 (альфа-циперметрин, 200 г/л)	АЛЬФА СУПЕР 128 (альфа-циперметрин, 100 г/л)	АТИК 130 (ацетаміприд, 200 г/кг)
БОМБАРДИР 132 (імідаклоприд, 700 г/кг)	БОМБАРДИР АКВА 134 (імідаклоприд, 200 г/л)	БОМБАРДИР ДУО 136 (імідаклоприд, 300 г/л лямбда-цигалотрин, 100 г/л)
МИРАЛЬД 138 (фенпіроксимат, 50 г/л)	КАЙРОС 140 (флубендіамід, 480 г/л)	ОКТАНТ 142 (тіаметоксам, 250 г/кг)
ОКТАНТ 144 ТУРБО (Тіаметоксам, 141 г/л лямбда-цигалотрин, 106 г/л)	ПРЕСТО 146 (клотіанідин, 200 г/л, лямбда-цигалотрин, 50 г/л)	ПРОСТАФ 148 емамектин бензоат 100 г/кг
СИНЕРИД 150 (тіаклоприд, 240 г/л)	ТВІКС 152 (хлорпірифос, 500 г/л, циперметрин, 50 г/л)	ТЕФУТ 154 (тефлутрин, 15 г/кг)
ЦИРКУЛЬ 156 (лямбда-цигалотрин, 50 г/л)		

NEW



* Зміст клікаєльний.

Клацнувши по номеру сторінки або назві ви маєте можливість перейти безпосередньо до сторінки з описом продукту

** Альтрон - назва продукту
110 - номер сторінки
(альфа-циперметрин, 200 г/л)- діюча речовина





Згідно з Переліком «Пестицидів та агротехніків, дозволених в Україні» та доповненням до нього, в період цвітіння **можна обробляти культури такими продуктами:**

- **АТІК (ацетаміприд, 200 г/кг)**
- **СИНЕРИД (тіаклоприд, 240 г/л)**

Діючі речовини цих ЗЗР є безпечними для бджіл і джмелів (для дорослих комах і личинок), не відлякують запилювачів.



! Працівники господарств, що працюють з пестицидами і агротехнікатами повинні знати техніку безпеки.

Пестициди вносять або зранку або ввечері (вдень лише якщо погода похмура).

НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИ В ПОЛІ невикористані розчини пестицидів або обробляти продуктами ентомофільні культури в період цвітіння навколо оброблюваних полів.

!! ОБРОБКУ ПРОВОДЯТЬ із застосуванням наземного обприскування та авіаметодом (згідно регламенту використання) при швидкості вітру до 5 м/с і витратою робочої рідини відповідно до усталених норм.

!! НЕ МОЖНА ОБРОБЛЯТИ ПОЛЯ та медоносні культури під час цвітіння іншими пестицидами, крім продуктів із діючою речовою, що зазначені в першому блоці.

!! ЗА НЕОБХІДНОСТІ використовують малотоксичні пестициди або біопрепарати без застосування авіатехніки.

Обов'язково дотримуйтесь всіх застережень, зазначених на етикетці продукту або в каталогі.



За Законом України "Про бджільництво" пасіки підлягають обов'язковій реєстрації у місцевих держадміністраціях або сільських, селищних, міських радах за місцем проживання фізичної особи або за місцем перебування юридичної особи, яка займається бджільництвом.

Пасічник обов'язково має попередити аграрія про розміщення пасіки на його ділянках.

!!! ЩО МАЄ РОБИТИ БДЖОЛЯР, ЗНАЮЧИ ПРО ЗАПЛАНОВАНУ ОБРОБКУ ПОСІВІВ?

Вивезти пасіку за 5-7 км від оброблюваних площ ї не допускати вильоту бджіл з вулика. При обробці пестицидами 2-го класу небезпечності обмеження льоту бджіл становить близько 3-4 діб; 3 класу - 1-2 доби. Терміни ізоляції бджолиних сімей можуть збільшуватися на 1-2 дні, якщо температура знижується, а вологість підвищується.



!!! ЩО МАЄ РОБИТИ АГРАРІЙ, ПЕРЕД ОБРОБКОЮ ПОСІВІВ МЕДОНОСНИХ КУЛЬТУР?

Відповідно до статей 30 та 37 Закону України «Про бджільництво», фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації, у тому числі й інтерактивні системи оповіщення, попередити про це пасічників, пасіки яких розташовані на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ.

При цьому повідомляється:

- дата обробки
- назва продукту
- ступінь і строк дії
- токсичність продукту.





АЛЬТРОН



Інсектицид контактно-кишкової дії проти сисних та листогризучих шкідників.

Переваги

- Інсектицид з пролонгованою дією.
- Нова препаративна форма.
- Володіє репелентними властивостями.
- Діюча речовина надійно утримується на поверхні рослин.

Характеристики

Вміст діючої речовини альфа-циперметрин, 200 г/л

Хімічна група піретроїди

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог.

Сумісність

Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію.

При контакті токсичний для бджіл та інших корисних комах.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину

200 – 300 л/га при штанговому обприскуванні, 800-1000 л/га при вентиляторному



Механізм дії

Альфа-циперметрин при малих дозах має швидку контактно-кишкову дію, порушує проникність кліткових мембрани, блокує натрієві канали та викликає параліч центральної та периферійної нервових систем комах. Через 10-15 хвилин після обробки комахи перестають рухатись, протягом 1,5-2 годин настає їх повна загибель.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк очікування після обробки, діб
Пшениця Ячмінь	Клоп шкідлива черепашка, блішки, попелиці	Обприскування в період вегетації	0,05 – 0,1	2	30
Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки		0,05 – 0,1	2	30
Соя	Акацієва вогнівка, клопи, попелиці, трипси		0,05 – 0,1	2	30
Кукурудза	Попелиці		0,05 – 0,1	2	30
Буряки цукрові	Бурякові блішки, довгоносики, щитоноска, цикадки, попелиці		0,05 – 0,1	2	30
Соняшник	Попелиці, чортополохівки 1-3 віку		0,05 – 0,1	2	40
Горох	Зернівка горохова, попелиця		0,05 – 0,1	2	30
Яблуня	Плодожерки, листовійки		0,05 – 0,1	2	25

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





АЛЬФА СУПЕР



Контактно-шлунковий інсектицид для боротьби з широким спектром шкідників

Переваги

- Інсектицид з пролонгованою дією.
- Нова препаративна форма.
- Володіє репелентними властивостями.
- Діюча речовина надійно утримується на поверхні рослин.

Характеристики

Вміст діючої речовини альфа-циперметрин, 100 г/л

Хімічна група піретроїди

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ II клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог.

Сумісність

Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію. При контакті токсичний для бджіл та інших корисних комах.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Альфа-циперметрин має швидку контактно-кишкову дію, порушує проникність кліткових мембрани, блокує натрієві канали та викликає параліч центральної та периферійної нервових систем комах. Через 10-15 хвилин після обробки комахи перестають рухатись, протягом 1,5-2 годин настає їх повна загибель.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Соя	Акацієва вогнівка, клопи, трипси	Обпри- скування в період вегетації	0,1-0,3	2	30
Соняшник	Лучний метелик, люцернова совка, попелиці		0,1-0,3	2	30
Кукурудза	Стеблевий кукурудзяний метелик, лучний метелик, попелиці		0,1-0,3	2	30
Ріпак	Христоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд		0,1-0,15	2	30
Пшениця осіма	Клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, п"явиці, попелиці		0,1-0,15	2	20
Люцерна насінєва, дика рослинність	Нестадні види саранових		0,2-0,3	2	-

Підвищені температури повітря (вище +20°C) знижують ефективність дії продукту. Наявність краплинної вологи на поверхні рослин, що обробляються, а також дощ впродовж 3 годин після внесення продукту можуть суттєво знизити ефективність його дії. Продукт розкладається під впливом інтенсивного сонячного випромінювання та зниженої вологості повітря.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





АТИК



Системний інсектицид контактно-шлункової дії для контролю широкого спектру шкідників, також у період цвітіння

Переваги

- Дозволяє проводити захисні заходи в період цвітіння культур.
- Безпечний для бджіл та корисних ентомофагів.

Характеристики

Вміст діючої речовини ацетаміприд, 200 г/кг

Хімічна група неонікотиноїди

Препаративна форма водорозчинний порошок

Класифікація ВООЗ III клас небезпечності

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог.

Сумісність Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні При застосуванні у період цвітіння слід дотримуватися регламенту застосування та норм чинного законодавства.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Ацетаміприд викликає у комах надмірне збудження нервових клітин і тим самим порушує нормальну провідність нервового імпульсу, що призводить до паралічу та загибелі шкідника. Належить до класу інсектицидів — неонікотиноїдів. Має системну та контактно-кишкову дію.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Пшениця	Трипси, п'явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка		0,1-0,12	2	30
Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники, хрестоцвіті блішки, клопи	Обприскування в період вегетації (в т. ч. період цвітіння)	0,1-0,2	2	30
Соя	Клопи, совки, акацієва вогнівка		0,1-0,12	2	30
Соняшник	Комплекс шкідників	Обприскування в період вегетації (в т. ч. період цвітіння) та авіаметодом	0,2-0,25	2	30



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

 Повернутись до головного змісту



БОМБАРДИР



Системний інсектицид контактно-кишкової дії проти широкого спектру шкідників з тривалим періодом захисту

Переваги

- Швидка загибель шкідників невдовзі після застосування.
- Захист молодих пагонів та листя, які відростають уже після обробки.

Характеристики

Вміст діючої речовини імідацлоприд, 700 г/кг

Хімічна група неонікотиноїди

Препартивна форма водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний), токсичний для бджіл

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 25°C

Сумісність Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні Не рекомендується застосовувати в період цвітіння.

Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

Для польових культур – 200-300 л/га, для садів та виноградників – 800-1000 л/га



Механізм дії

Імідаклоприд завдяки своїм контактно-кишковим властивостям, викликає ураження нервової системи дорослих комах та їх личинок, подразнення їх рецепторів, конвульсії та швидку загибель. Імідаклоприд проникає в усі частини рослини через листя, стебла, коріння та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з подальшим руйнуванням центральної нервової системи комах, внаслідок чого шкідники гинуть. При відносно низьких нормах застосування стримує чисельність комах впродовж тривалого періоду (в більшості випадків достатньо однієї обробки за сезон).

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Картопля	Колорадський жук		0,045-0,050	1	20
Томати, баклажани					15
Озима пшениця	Злакові попелиці, клоп-черепашка, п'явиці, трипси	Обприскування в період вегетації	0,045-0,050	1	30
Яблуня, груша	Плодожерки, листовійки, попелиці		0,07	1	30
Соняшник	Совки, попелиці		0,045-0,060	1	30

[Замовити](#)

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





БОМБАРДИР АКВА



**Високоефективний інсектицид
системної і контактної дії проти широкого спектру шкідників**

Переваги

- Відмінна системна дія.
- Відсутність резистентності.
- Широкий спектр застосування проти сисних і листогризучих шкідників.

Характеристики

Вміст діючої речовини імідаклоприд, 200 г/л

Хімічна група неонікотиноїди

Препаративна форма водорозчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 22°C

Сумісність

Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати в період цвітіння.

Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

Для польових культур – 200-300 л/га, для садів та виноградників – 800-1000 л/га.



Механізм дії

Імідаклоприд, завдяки своїм контактно-кишковим властивостям, викликає ураження нервової системи дорослих комах та їх личинок, подразнення їх рецепторів, конвульсії та швидку загибель. Імідаклоприд проникає в усі частини рослини через листя, стебла, коріння та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з послідувочим руйнуванням центральної нервової системи комах, внаслідок чого шкідники гинуть. При відносно низьких нормах застосування стримує чисельність комах впродовж тривалого періоду (в більшості випадків достатньо однієї обробки за сезон).

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Картопля, томати, баклажани	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	0,2-0,25	1	20
Озима пшениця	Злакові попелиці, клоп-черепашка, п'явиці, трипси		0,2-0,25	1	30
Ячмінь*	П'явиці, злакові попелиці, трипси, клоп-черепашка		0,2-0,3	1	-
Соя*	Акацієва вогнівка, трипси та інші сисні шкідники		0,25-0,3	1	-
Соняшник*	Попелиці, трипси, совки		0,25-0,30	1	-
Кукурудза*	Попелиці, совки		0,25-0,30	1	-
Цукровий буряк*	Попелиці, блішки, клопи		0,3	1	-

*Очікуємо на реєстрацію

Одним із найпоширеніших шкідників на пшениці є трипс пшеничний. Масова поява дорослих особин спостерігається на початку колосіння пшениці. Спочатку вони живляться колосковими лусками, потім проникають у колос і відкладають яйця. На 6-8 добу з'являються личинки, які спочатку висмоктують сік з колоскових лусок та квіткових плівок, а потім пошкоджують не сформоване зерно. В результаті знижується маса зерна та якість, втрати можуть становити до 20 % врожаю.

Для контролю чисельності трипсів на посівах пшениці рекомендовано внесення Бомбардиру Аква на початку колосіння.

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**

 Повернутись до головного змісту



БОМБАРДИР ДУО



Двокомпонентний інсектицид для боротьби з широким спектром гризучих і сисних шкідників.

Переваги

- Відмінна контактна та системна дія
- Широке вікно застосування
- Швидкий «нокаут» ефект

Характеристики

Вміст діючої речовини

імідаклоприд, 300 г/л +
лямбда-цигалотрин, 100 г/л)

Хімічна група

неонікотиноїди, піретроїди

Препаративна форма

концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 25°C

Сумісність

Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати в період цвітіння.

Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

Для польових культур – 200-300 л/га,
для садів та виноградників – 800-1000 л/га.



Механізм дії

Імідаклоприд, завдяки своїм контактно-кишковим властивостям, викликає ураження нервової системи дрослих комах та їх личинок, подразнення їх рецепторів, конвульсії та швидку загибель. Імідаклоприд проникає в усі частини рослини через листя, стебла, коріння та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з послідувочим руйнуванням центральної нервової системи комах, внаслідок чого шкідники гинуть.

Лямбда-цигалотрин діє на нервову систему комах, порушуючи проникність клітинних мембрани і блокуючи натрієві канали, що призводить до порушення енергетичного і дихального метаболізму, і викликає загибель.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси,	Обприскування в період вегетації	0,15 – 0,25	1-2	30
Ріпак	Хрестоцвіті блішки, клопи, совки, прихованохоботник, совки		0,15 – 0,25	1-2	30
Кукурудза	Попелиці, совки, лучний метелик		0,15 – 0,25	1-2	30
Соняшник	Попелиці, совки		0,15 – 0,25	1-2	30
Соя	Клопи, совки, акацієва вогнівка		0,15 – 0,25	1-2	30
Буряки цукрові	Бурякові блішки, довгоносики, щитоносики, попелиці		0,15 – 0,25	1-2	20

Хрестоцвіті блішки: у фазі сходів здатні повністю знищити посіви. Більше шкодять блішки в суху, жарку погоду, сильно пошкоджене листя засихає, при ураженні точки росту рослини гине. Поріг шкодочинності - понад 3 комах/м².

Активність шкідника знижується за температури нижче 6°C. Для ефективного захисту рекомендуємо використовувати інсектицид Бомбардир Дуо.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





МИРАЛЬД



Високоселективний контактний акарицид, який повністю знищує усі рухомі стадії розвитку кліща (личинки, німфи, імаго)

Переваги

- «Нокаут» ефект.
- Висока ефективність проти всіх рухомих стадій кліщів.

Характеристики

Вміст діючої речовини фенпіроксимат, 50 г/л

Хімічна група феніксипіразоли

Препаративна форма концентрат сусpenзїї

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Найбільш оптимальний захист посівів сільськогосподарських культур відбувається за високих температур + 25°C – + 30°C.

Сумісність

Продукт сумісний з іншими продуктами.. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не застосовувати пізніше зазначеного строку останньої обробки до збирання врожаю.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Фенпіроксимат діє контактно й відзначається швидким «нокаут» ефектом. Знищує кліщі, резистентні до інших акарицидів. Механізм дії поєднує два процеси:

- інгібування синтезу АТФ мітохондрій, що спричинює переривання нормального метаболізму та дихання кліщів;
- інгібування моноаміноксидази, що перериває функцію транспортування електронів нервової системи

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Соя	Павутинний кліщ	Обприскування в період вегетації	0,7-1,15	2	30

Інтенсивне розмноження павутинних кліщів на сої, може привести до недобору від 15-20% до 60-80%

Оптимальними умовами для розвитку популяції павутинного кліща є температура +28°C – +33°C і відносна вологість повітря 35-40%. Пік розвитку кліщів припадає орієнтовно на середину липня, коли соя перебуває у критичній фазі розвитку — формування бобів. Погодні умови та метаболічні процеси в рослинах у цю фазу сприяють розвитку і розмноженню шкідників. Для контролю павутинного кліща, рекомендуємо використовувати акарицид Миральд.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





КАЙРОС



Системний інсектицид для боротьби з личинками лускокрилих шкідників

Переваги

- Висока ефективність проти широкого спектру лускокрилих шкідників.
- Відсутність резистентності.
- В рекомендованих нормах безпечний для ентомофагів і запилювачів.
- Швидкий «нокаут» ефект.

Характеристики

Вміст діючої речовини флубендіамід, 480 г/л

Хімічна група бензолдикарбоксиміди

Препаративна форма концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Оптимальна температура для застосування +15 – +25 °C.

Сумісність Продукт сумісний з іншими препаратами. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні Дотримуватись рекомендованих регламентів застосування. Не застосовувати продукт пізніше зазначеного у таблиці строку останньої обробки до збирання врожаю.

Вимоги до pH робочого розчину від 6 до 8

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га



Механізм дії

Флубендіамід перезбуджує ріанодинові рецептори, що унеможливлює нормальне пересування і живлення комах, призводячи до їхньої загибелі. Флубендіамід перешкоджає своєчасному «замиканню» рецептора, внаслідок чого весь доступний кальцій вивільняється без обмежень. Через це личинки втрачають контроль над м'язами, рухливість і припиняють харчування, відбувається повний параліч і загиbelь. Перші симптоми стають помітними через 1–2 години після обробки.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Кукурудза	Кукурудзяний стебловий метелик, лучний метелик, бавовникова совка		0,1-0,15	1	30
Соя	Совка-гама, люцернова совка, акацієва вогнівка, чортополохівка	Обприскування в період вегетації	0,1-0,15	2	30
Ріпак	Білан капустяний, ріпаковий білан, капустяна совка, підгризаючі совки		0,1-0,15	2	30
Соняшник	Лучний метелик, бавовникова совка	Обприскування в період вегетації в т.ч. авіаметодом	0,1-0,15	2	30

Одним з найпоширеніших шкідників на посівах соняшника в останні роки є бавовникова совка. Лялечка совки зимує в ґрунті на глибині 4-8 см. В травні з лялечок вилітають метелики, які відкладають яйця. Через 3-4 дні з них вилуплюються гусениці. Гусениці першого покоління пошкоджують листя соняшника в червні, 2-3 покоління липень-серпень, переходять на живлення генеративними органами. Надалі пошкодження соняшника гусеницями старших віков сприяє зараженню кошика білою та сірою гнильями. Тому в системі інсектицидного захисту рекомендуємо використовувати Кайрос.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ОКТАНТ



Системний інсектицид з контактно-кишковою дією проти широкого комплексу шкідників

Переваги

- Інсектицид широкого спектру дії.
- Висока стійкість до сонячної інсоляції.
- Низька норма витрати.
- Надзвичайно тривалий захисний період – до 20 діб (поверхнева обробка).

Характеристики

Вміст діючої речовини тіаметоксам, 250 г/кг

Хімічна група неонікотиноїди

Препаративна форма водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 25°C

Сумісність

Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати в період цвітіння.

Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Тіаметоксам, взаємодіючи з нікотин-ацетилхоліновими рецепторами комах, порушує у них передачу нервових імпульсів. У результаті в шкідників починається конвульсії та параліч, внаслідок чого вони гинуть.

Легко поглинається рослинами і рівномірно розподіляється по всіх тканинах, захищаючи навіть необроблені ділянки рослини. Ефективний проти більшості сисних шкідників, які ведуть прихований спосіб життя.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації	0,1-0,15	2	30
Соя	Клопи, совки, акацієва вогнівка			2	30

Останніми роками в Україні на посівах сої набула масового поширення акацієва вогнівка. В кінці травня на початку червня з лялечок які перезимували, відроджуються метелики, які відкладають яйця на молоді боби жовтої акації (основні насадження лісозахисних смуг), гороху, сої. Через 12 - 14 діб відроджуються гусениці, період розвитку яких триває від 20 до 40 діб. За сезон дає 2 - 3 покоління. Найбільшої шкоди завдають гусениці всіх поколінь.

Для ефективної боротьби з імаго та гусеницями протягом всього вегетаційного періоду розвитку сої рекомендовано Октант у баковій суміші з Циркулем.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ОКТАНТ ТУРБО



Ефективне поєднання нокаут-ефекту та тривалого періоду захисної дії проти широкого спектру шкідників

Переваги

- Тривалий захисний період.
- Відсутність резистентності.
- Широкий спектр дії.
- Зручний і безпечний у бакових сумішах.

Характеристики

Вміст діючої речовини

Тіаметоксам, 141 г/л
+ лямбда-цигалотрин, 106 г/л

Хімічна група

неонікотиноїди,
піретроїди

Препаративна форма

концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ

II клас (токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 25°C

Сумісність

Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати в період цвітіння.

Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Тіаметоксам, взаємодіючи з нікотин-ацетилхоліновими рецепторами комах, порушує у них передачу нервових імпульсів. У результаті в шкідників починається конвульсії та параліч, внаслідок чого вони гинуть. Легко поглинається рослинами і рівномірно розподіляється по всіх тканинах, захищаючи навіть необроблені ділянки рослини. Лямбда-цигалотрин діє на нервову систему комах, порушуючи проникність клітинних мембран і блокуючи натрієві канали, що призводить до порушення енергетичного і дихального метаболізму, і викликає загибель. Октант Турбо ефективний проти більшості сисних шкідників, які ведуть прихований спосіб життя

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, хлібний турун	Обприскування в період вегетації	0,20 – 0,25	2	30
Ріпак	Хрестоцвіті блішки, клопи, совки, прихованохоботник, ріпаковий пильщик		0,20 – 0,25	2	30
Кукурудза	Попелиці, совки, лучний метелик		0,20 – 0,25	2	30
Соняшник	Попелиці, совки, шипоноска		0,20 – 0,25	2	30
Соя	Клопи, совки, акацієва вогнівка, чортополохівка		0,20 – 0,25	2	30
Горох	Горохова зернівка, горохова плодожерка, попелиці		0,20 – 0,25	2	30
Буряки цукрові	Клопи, совки, акацієва вогнівка		0,20 – 0,25	2	30

Велику шкоду посівам озимої пшениці в степовій зоні України завдає турун хлібний, який останнім часом також набуває поширення в Лісостепу та південному Поліссі. Шкодять жуки і личинки. Личинки в своєму розвитку проходять три покоління, шкодочиняте від фази сходів (навіть під сніговим покровом, де навесні спостерігаються лисини) і весною після відновлення вегетації пшениці аж до заляльковування.

Імаго виходять протягом травня-червня і живляться, в залежності від зони, до липня (Лісостеп, Полісся). За цей період жуки можуть пошкодити до 50-60 зернин, окрім того, під час пересування по колосу витрущують певну кількість зерна.

Одним із найефективніших продуктів для боротьби із туруном хлібним є Октант Турбо.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту



ПРЕСТО



2-компонентний інсектицид контактно-системної дії

Переваги

- Контролює близько 100 розповсюджених видів шкідників.
- Вирізняється тривалим періодом захисту.
- Завдяки двом діючим речовинам у складі, продукт однаково ефективно знищує сисних та листогризучих шкідників.
- Має яскраво виражену «нокаутуючу» дію.

Характеристики

Вміст діючої речовини

клотіанідин, 200 г/л
+ лямбда-цигалотрин, 50 г/л

Хімічна група

неонікотиноїди, піретроїди

Препаративна форма

концентрат суспензії

Класифікація ВООЗ

II клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 25°C

Сумісність

Продукт можна застосовувати в сумішах з іншими засобами захисту рослин. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Не рекомендується застосовувати в період цвітіння.
Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Клотіанідин – діюча речовина з класу неонікотиноїдів, що системно розподіляється по рослині та забезпечує довготривалий захист від шкідників – більше 30-ти днів.

Лямбда-цигалотрин – контактний піретроїд, що має виражений «нокаут» ефект, і забезпечує надзвичайно швидку дію продукту та загибель шкідників вже через півгодини після обробки.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Трипси, клоп шкідлива черепашка, попелиці,	Обприскування в період вегетації	0,3-0,4	2
Картопля	Колорадський жук, совки, лучний метелик		0,3-0,4	2
Соняшник	Попелиці, совки		0,3-0,4	2
Кукурудза	Попелиці, совки, лучний метелик		0,3-0,4	2
Ріпак	Хрестоцвіті блішки, клопи, совки, прихованохоботник		0,3-0,4	2
Цукровий буряк*	Попелиці, блішки, клопи		0,3-0,4	2

*Очікуємо на реєстрацію



Престо



Пошкодження гусінню стеблового метелика, що спровокувало фузаріоз

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





ПРОСТАФ



Трансламінарний інсектицид, спрямований на надійний контроль приховано та відкрито живучих лускокрилих шкідників

Переваги

- Починає свою дію вже на стадії яєць, маючи пряний овіцидний ефект
- Проникаючи в рослину, утворює резервуари з діючою речовиною і залишається стійким до змивання дощем вже через дві години
- Ефективність препарату не залежить від високих температур повітря та кислотності робочого розчину

Характеристики

Вміст діючої речовини емамектин бензоат 100 г/кг

Хімічна група авермектини

Препаративна форма водорозчинні гранули

Класифікація ВООЗ II клас

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Роботи найкраще проводити в ранковий час (до 10 години) та вечірні години (18-22 години), при відсутності вітру або при його низькій швидкості (не більше 3 м/с). Оптимальна температура для застосування становить від +10 до +25°C.

Сумісність Продукт сумісний з іншими препаратами в тому числі з біозахистом. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні Не застосовувати в баковій суміші з хлорталонілом та фунгіцидами на основі фосетилу алюмінію, рідкими мінеральними добривами. Особливо небезпечний для бджіл.

Вимоги до pH робочого розчину від 5 до 8

Норма витрати робочого розчину 250-300 л/га



Механізм дії

Емамектин бензоат має контактну та кишкову активність. При потраплянні на шкідника блокується центральна нервова система, м'язові клітини не скоро чуються, через 1-3 години гусениці перестають харчуватися і через 1-2 доби гинуть. При потраплянні на яйцепладку діюча речовина проникає через оболонку яйця і личинка гине.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Максимальна кількість обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю
Ріпак осімий	Капустяна міль, хрестоцвіті блішки, попелиці, совки		0,2-0,25	2	-
Соняшник	Попелиці, вогнівки, бавовникові совки, соняшникова шипоноска	Обприскування в період вегетації	0,2-0,25	2	-
Кукурудза	Кукурудзяний метелик, бавовникові совки Препарат не контролює личинок, що проникли в качани кукурудзи.		0,2-0,25	2	-

*Очікуємо на реєстрацію

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





СИНЕРИД



Контактно-кишковий інсектицид з частковою системною дією проти широкого комплексу шкідників

Переваги

- Безпечний для бджіл та корисних ентомофагів.
- Швидкий «нокаут-ефект».
- Висока ефективність за високих температур.

Характеристики

Вміст діючої речовини тіаклоприд, 240 г/л

Хімічна група неонікотиноїди

Препаративна форма олійна дисперсія

Класифікація ВООЗ III клас небезпечності

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Препаративна форма з використанням рослинної олії дозволяє обробку культур, листя яких має восковий шар, погано змочується і здатне утримувати невелику кількість робочої рідини. Олійна плівка, яка утворюється під час обробітку, покращує рівномірне розподілення продукту на поверхні листя і в тканинах рослин.

Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

При застосуванні у період цвітіння слід дотримуватися регламенту застосування та норм чинного законодавства.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Повернутись до головного змісту



Механізм дії

Тіаклоприд викликає безперервне збудження нервової системи шкідників і в результаті через деякий час викликає загибель. Тіаклоприд акропетально пересувається по рослині та має трансламінарну дію. Після контакту зі шкідником проявляється так званий «нокаут» ефект: комахи припиняють живитися та через короткий проміжок часу гинуть.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, прихованохоботники	Обприскування в період вегетації (в т. ч. період цвітіння)	0,3-0,4	2
Соняшник	Попелиці, совки		0,4-0,5	2



На всій території України масовим шкідником для овочевих і олійних капустяних культур, особливо для ріпаку, є ріпаковий квіткоїд. Зимують імаго на поверхні ґрунту. На початку квітня-початку травня (в залежності від зони вирощування ріпаку) жуки розселяються на квіти бур'янів (жовтець, кульбаба), а потім перелітають на ріпак, живляться внутрішніми генеративними органами бутонів (піляки, тичинки, маточки та пелюстки). В бутони, які не розпустилися, самка відкладає яйця. Через 7-10 діб відроджуються личинки та живляться піляками, а також молодими не сформованими стручками. Розвиток личинок триває 10-12 діб потім заляльковуються у поверхневому шарі ґрунту. Через 10-12 діб з'являються імаго, які частково живляться окремими квітками і перелітають у місця зимівлі.

Одним із найефективніших інсектицидів для знищенння імаго та личинки ріпакового квіткоїда, навіть в період цвітіння ріпаку, є Синерид.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ТВІКС



Інсектицид широкого спектру застосування, контактно-кишкової, фумігантної, локально-системної та репелентної дії

Переваги

- Має контактну, фумігантну, локально-системну та репелентну дію.
- Діє на дорослих комах та личинок.
- Викликає швидку загибель шкідників невдовзі після застосування.

Характеристики

Вміст діючої речовини	хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л
Хімічна група	фосфорорганічні сполуки, піретроїди
Препаративна форма	концентрат емульсії
Класифікація ВООЗ	II клас (високотоксичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 25°C
Сумісність	Не рекомендується змішувати з гербіцидами та фунгіцидами.
Застереження у застосуванні	Обробки під час цвітіння культури заборонено.
Вимоги до pH робочого розчину	від 5 до 7
Норма витрати робочого розчину	200-300 л/га




Механізм дії

Механізм дії хлорпірифосу пов'язаний з порушенням процесу обміну іонів на трію та калію, деполяризацією мембрани, пригніченням активності ферменту ацетилхолінестерази. І, як наслідок, порушення нормального проходження нервових імпульсів, розвиток судомної активності м'язів, що переходить у параліч. Завдяки синергічному ефекту двох діючих речовин продукт має стабільно високу ефективність та пролонговану дію.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Пшениця яра			0,75-1,0	1
Пшениця озима	Комплекс шкідників	Обприскування в період вегетації	0,75-1,1	1
Ячмінь			0,5-0,75	1
Цукрові буряки	Бурякові довгоносики, щитоносчи		0,8	2
Ріпак озимий	Хрестоцвітні блішки, клопи, совки, ріпаковий квіткоїд		1,0-1,1	2



Озима совка - один із найнебезпечніших шкідників сільськогосподарських культур. Гусениці загрожують озимим культурам, цукровому буряку, кукурудзі, соняшнику, ріпаку, сої, овочевим культурам! У фазу появі сходів гусениці підгризають паростки рослин на рівні ґрунту. Стебло або рослина цілком гине.

Шкодочинність озимої совки досить відчутна – за ніч одна гусениця може знищити 10-15 рослин. Загалом втрати врожаю через цього шкідника можуть сягати більше 50%!

Найбільш ефективна боротьба зі шкідником, коли його застосовують проти гусениць молодшого віку. Не слід забувати про те, що гусениці ведуть прихований спосіб життя і виходять харчуватися переважно вночі. Для боротьби із озимою совкою найбільш ефективним є внесення інсектициду Твікс у вечірні години.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





ТЕФУТ



Гранульований інсектицид з класу піретроїдів з високою активністю газової фази для захисту від комплексу ґрунтових шкідників

Переваги

- Тривала захисна дія.
- Контролює широкий спектр ґрунтових шкідників, в т.ч. дротяніків та несправжніх дротяніків.
- Унікальний механізм дії — викликає загибель шкідників до того, як він встигає пошкодити культуру.

Характеристики

Вміст діючої речовини тефлутрин, 15 г/кг

Хімічна група піретроїди

Препаративна форма гранули 15%, мікроапсульована сусpenзія 20%

Класифікація ВООЗ II клас (високотоксичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Вноситься за допомогою аплікаторів у ґрунт. Не можна використовувати у будь-яких бакових сумішах для обприскування.

Сумісність Спільне застосування інсектициду Тефут допускається із сипучими формами добрив, але в кожному конкретному випадку потрібно перевіряти рівномірність перемішування, розподіл речовини в ґрунті, витримуючи необхідну глибину закладення

Вимоги до pH робочого розчину від 5 до 7



Механізм дії

Пари тефлутрина протягом декількох хвилин проникають через органи дихання (дихальця, трахеї) і покривні тканини комахи. Внаслідок чого у комах виникає пригнічення харчової активності, порушення роботи нервової системи, паралізація. Потім, протягом 10-30 хвилин, шкідник гине.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, кг/га	Максимальна кількість обробок
Буряки цукрові			4,5-6,0	1
Соняшник, соя	Комплекс ґрунтових шкідників	До посіву, під час посіву, після посіву	6,0-8,0	1
Ріпак			5,0-8,0	1



Без обробки



Обробка Тефут

Однією із проблем вирощування с/г культур є збереження густоти. Головним фактором зниження густоти є пошкодження комплексом ґрунтових шкідників. Найбільш ефективним способом контролю їх чисельності є внесення ґрунтового інсектициду Тефут.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ЦИРКУЛЬ



Інсектицид контактної та шлункової дії для боротьби з широким спектром листогризучих та сисних шкідників

Переваги

- Швидка дія та висока ефективність.
- Має репелентні властивості

Характеристики

Вміст діючої речовини лямбда-цигалотрин, 50 г/л

Хімічна група піретроїди

Препаративна форма концентрат емульсії

Класифікація ВООЗ II клас (небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обробку проводять у випадку, коли чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкодочинності. Рівномірне покриття рослин робочим розчином є однією з основних вимог. Оптимальна температура застосування + 15°C - + 25°C

Сумісність

Продукт можна використовувати у бакових сумішах з іншими пестицидами. Не змішувати з продуктами, які мають лужну реакцію. Перед застосуванням слід провести випробування на сумісність продуктів.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Лямбда-цигалотрин діє на нервову систему комах, порушуючи проникність клітинних мембрани і блокуючи натрієві канали, що призводить до порушення енергетичного і дихального метаболізму, і викликає загибель.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Максимальна кількість обробок
Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, блішки, цикадки		0,15-0,20	2
Соняшник	Попелиці, соняшникова шипоноска, лучний та стебловий метелик	Обприскування в період вегетації		2
Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, блішки		0,15	2

П'явиця червоногруда (звичайна) - досить поширений шкідник на пшениці, вівсі, ячмені, просі в зоні Степу, центральному й східному Лісостепу. Шкодять жуки та личинки. Жуки вигризають повздовжні отвори в листках у фазу трубкування та колосіння зернових, особливо пшениці твердої. Личинки пошкоджують та скелетують листя, яке засихає.

Жуки виходять з ґрунту в квітні-початку травня. Самки відкладають яйця у вигляді ланцюжка на нижній бік листка. Ембріональний розвиток триває 13-14 діб. Сама личинка живе і харчується 14-16 діб. В Україні за рік розвивається лише одне покоління п'явиці.

Масове розмноження шкідника спостерігається в посушливі роки.

При економічному порозі шкодочинності, а саме жуків 40-50 шт/м² у фазу виходу в трубку озимої пшениці рекомендовано застосування інсектициду Циркуль.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





ЖОДНИХ ШАНСІВ
ШКІДНИКАМ З ІНСЕКТИЦИДОМ

ПРЕСТО



ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ
НЕ ЛІШЕ ВІД ДОРОСЛИХ КОМАХ,
А Й ВІД ЛІЧИНОК, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
ВСЕРЕДИНІ РОСЛИНИ

ЗАВДЯКИ ДВОМ ДІЮЧИМ РЕЧОВИНАМ, ПРОДУКТ **ЕФЕКТИВНО** **ЗНИЩУЄ** **ШКІДНИКІВ**

01

КЛОТІАНІДИН

системно розподіляється
по рослині, забезпечує
захист до **4 тижнів**.

02

ЛЯМБДА-ЦИГАЛОТРИН

має виражений **«НОКАУТ»**
ЕФЕКТ, забезпечує швидку
загибель шкідників



ПРАЦЮЄ
КОНТАКТНО,
КИШКОВО
І СИСТЕМНО



ПРОЛОНГОВАНА
ДІЯ



МАЄ СТАБІЛЬНО
ВИСОКУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ



ЕФЕКТИВНИЙ
ПРОТИ ШИРОКОГО
СПЕКТРУ
ЛИСТОГРИЗУЧИХ
ТА СИСНИХ
ШКІДНИКІВ



ЕФЕКТИВНИЙ,
КОЛI
ОДНОЧАСНО
Є КОМАХI
РІЗНИХ СТАДІЙ
РОЗВИТКU



ПРОТРУЙНИКИ

АБСОЛЮТ 164 (карбендаzим, 500 г/л)	APEC 166 (металаксил-М, 350 г/л)	БАСТИОН 168 (ципроконазол 6,3 г/л, дифеноконазол 30 г/л)
ЛАТИНА 170 (клотіанідин, 600 г/л)	МЕТАКСА 172 (тіаметоксам, 350 г/л)	ТЕФУТ ГОЛД 174 (тіаметоксам, 200 г/л тефлутрин, 80 г/л)
ТЕФУТ ПРО (тефлутрин, 200 г/л)	ФУКСІЯ 178 (флудіоксоніл, 25 г/л)	ХЛОРИС 180 (тебуконазол, 15 г/л, прохlorаз, 60 г/л)



* Зміст клікабельний.

Клацнувши по номеру сторінки або назві ви маєте можливість перейти безпосередньо до сторінки з описом продукту

** Абсолют - назва продукту
158 - номер сторінки
карбендаzим, 500 г/л - діюча речовина



MaxiPro

Енергія, що дає прибуток

Преміальна технологія протруювання насіння MaxiPro комплексно новий підхід у захисті насіння з потрійною дією, що захищає та розкриває максимальний потенціал майбутнього урожаю кукурудзи.

Високоектичні інсектицидно-фунгіцидні компоненти створюють потужний захист від комплексу шкідників та хвороб в критичні моменти розвитку культури, а інноваційний біостимулятор розкриває максимальну енергію росту на початкових етапах.

Переваги технології захисту MaxiPro:

1

Сприяє підвищенню польової схожості насіння.

2

Забезпечує рівномірність сходів в стресових умовах. Контроль збудників таких хвороб із роду Alternaria Ness., Aspergillus Mich., Botrytis Mich., Cladosporium Link., Fusarium Link., Mucor Mich., Penicillium Link., Pytium Pringsh., Rhizoctonia DC., Trichothecium Link.

3

Розкриває максимальний потенціал енергії початкового росту.

4

Сильний інсектицидний захист проти основних шкідників в період сходів (дротянки, несправжні дротянки, совка, личинка паросткової муhi, блішка, польовий хруш, шведських мух, цикадка)





ПРОТРУЙНИКИ

Новітня препаративна форма дає можливість найбільш повно використовувати властивості діючих речовин.



Енергія початкового росту визначає здатність рослини формувати дружні та вирівняні сходи, що позитивно впливає на майбутній урожай.



Дізнайтеся більше про компоненти нашого протруйника у торгового представника у Вашому регіоні.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту



АБСОЛЮТ



Протруйник для захисту ярої пшениці
від багатьох грибкових захворювань

Переваги

- Широкий спектр контролю хвороб.
- Тривалий захист насіння та сходів завдяки системній активності
- Сприяє проростанню і прискоренню появи ростків.
- Відсутній негативний вплив на проростання за непріятливих погодних умов.
- Забезпечує однорідність стеблостю.

Характеристики

Вміст діючої речовини карбендаузим, 500 г/л

Хімічна група похідні бензимідазолу

Препаративна форма концентрат суспензії, що тече

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Протруєння насіння можна здійснювати як перед сівбою, так і заздалегідь – оброблене насіння не втрачає якості тривалий час. Перед протруюванням насіння повинно бути очищене від домішок та відкаліброване.

Сумісність При протруюванні насіння можливе спільне або послідовне використання з продуктами інсектицидної і стимулюючої дії.

Вимоги до pH робочого розчину від 5 до 9

Норма витрати робочого розчину 8-10 л/т



Механізм дії

Карбендаузим забезпечує захист від широкого спектру хвороб рослин, які передаються через насіння і ґрунт. Карбендаузим поглинається корінням і зеленими тканинами, і рухається по рослині від низу до верху, пригнічуєчи синтез бетабуліна, що викликає порушення обміну патогенних грибів. Продукт довго зберігається в ґрунті, забезпечуючи тривалий захист молодих рослин від хвороб, у тому числі і від ґрунтової інфекції. Продукт забезпечує ефективне пригнічення сажкових хвороб та хвороб, що спричиняються грибами Fusarium (кореневі гнилі).

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Спосіб, час обробок, обмеження	Норми витрати, л/т
Пшениця яра	Тверда сажка, фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнилі	Протруювання насіння сусpenзією препарату (10л води на 1 т насіння), обробка за 1-30 днів до свіби	1,5-2,0



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





APEC



Системний фунгіцидний протруйник захисної та лікувальної дії, призначений для боротьби з комплексом збудників хвороб

Переваги

- Поглинання продукту не залежить від температури та вологості ґрунту.
- Характеризується надійним захистом насіння і молодих рослин від внутрішньої й зовнішньої інфекцій.
- Не фітотоксичний по відношенню до насіння та проростків

Характеристики

Вміст діючої речовини металаксил-М, 350 г/л

Хімічна група феніламіди

Препартивна форма концентрат, що тече

Класифікація ВООЗ III клас (малотоксичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Протруєння насіння можна здійснювати як перед сівбою, так і заздалегідь – оброблене насіння не втрачає якості тривалий час. Перед протруюванням насіння повинно бути очищено від домішок та відкаліброване.

Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах з іншими протруйниками, однак при цьому рекомендується провести тест на сумісність пестицидів.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 9

Норма витрати робочого розчину

8-10 л/т



Механізм дії

Металаксил-М знищує збудників грибкових захворювань, які знаходяться як в середині, так і на поверхні насіння. Металаксил-М поширюється в ґрунті навколо насіння під час проростання, абсорбується корінням і переміщується по всій рослині.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Спосіб, час обробок, обмеження	Норми витрати, л/т
Соняшник	Перенооспороз, вертицильоз	Обробка насіння перед посівом	2,5-3,0
Кукурудза	Кореневі гнилі, пліснявіння насіння		0,5



Пліснявіння насіння

Захворювання проявляється при посіві в холодний ґрунт, коли температура для швидкого проростання насіння ще не достатня, а для розвитку грибів досить комфортна. Основною проблемою є те, що при знижених температурах збільшується виділення грибами мікотоксинів, які впливають на розвиток рослин. Ураженню сприяє глибоке закладення насіння, особливо на важких ґрунтах, і посів насінням низької якості, з пошкодженою оболонкою. Збудниками, в основному, є представники родів *Penicillium*, *Aspergillus*, *Trichothecium*, *Alternaria* та інш. Це захворювання часто викликає загибель або сильне пригнічення проростків, що проявляється у вигляді хлорозного, жовто-зеленого листя. Іноді всихання рослин можна спостерігати в фазі 4-5 листків.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





БАСТИОН



Комбінований фунгіцидний протруйник для захисту від грибкових захворювань

Переваги

- Тривалий посилений захист від сажкових хвороб, в т.ч. карликової, септоріозу та кореневої гнилі.
- Відсутність пилення та осипання при протруєнні та сівбі.
- Не створюється ризик виникнення фітотоксичності.

Характеристики

Вміст діючої речовини

дифеноконазол 30 г/л +
ципроконазол 6,25 г/л ТН

Хімічна група

триазоли

Препаративна форма

концентрат суспензії, що тече (ТН)

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

При протруюванні продуктом насіння має бути неушкодженим, чистим та не містити домішок. Під час нанесення необхідно контролювати якість протруювання (візуальний контроль, рівномірність покриття зерна) за ступенем фарбування та норми витрати продукту.

Сумісність

Сумісний з більшостю протруйників, в т.ч. біолого-гічно-активними. Не сумісний з протруйниками на основі органічних розчинників. Однак у кожному конкретному випадку необхідно провести пробне змішування для перевірки на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

8-10 л/т



Повернутись до головного змісту



Механізм дії

Поєднання дифеноконазолу та ципроконазолу забезпечує високу ефективність у контролі кореневих гнилей, сажкових хвороб, пліснявіння насіння та ранні прояви борошнистої роси і септоріозу.

При дотриманні норм витрат продукту, БАСТИОН стимулює проростання насіння, дозволяє скоротити норму висіву, при цьому збільшує продуктивне кущення.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/т
Пшениця озима	Сажкові хвороби, фузаріозні і гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, пліснявіння насіння	Обробка насіння перед посівом	1,0



Сажкові хвороби.

На посівах зернових культур зустрічаються кілька видів сажок: тверда, летюча, карликова, стеблова та індійська.

Джерело інфекції сажкових хвороб: є насіння, на поверхні якого знаходяться теліоспори, а також ґрунт, в якому знаходяться теліоспори, що зберігають життєздатність до трьох років і більше, падалиця - за умови сильного ураження хворобою попередньої культури, в деяких випадках теліоспори можуть переноситися з заражених ділянок паводковими водами.

Головним методом боротьби з сажковими хворобами і кореневими гнилями є протруювання насіння. Бастіон забезпечує знезараження від патогенів, які зберігаються у насінні та на його поверхні, захищає культуру від ураження хворобами як в осінній період розвитку.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ЛАТИНА



Системний інсектицидний протруйник для боротьби з комплексом ґрунтових та наземних шкідників.

Переваги

- Один з найефективніших інсектицидів-протруйників класу неонікотиноїдів.
- Тривала захисна дія проти ґрунтових і листових шкідників.

Характеристики

Вміст діючої речовини клотіанідин, 600 г/л

Хімічна група неонікотиноїди

Препаративна форма концентрат суспензії, що тече

Класифікація ВООЗ III клас (малотоксичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Ефективність та тривалість дії прямо пропорційна нормі використання.

Сумісність Препарат можна використовувати в бакових сумішах іншими протруйниками та мікродбривами, однак при цьому рекомендується провести тест на сумісність пестицидів.

Вимоги до pH робочого розчину від 4 до 9

Норма витрати робочого розчину 8-10 л/т



Механізм дії

Клотіанідин поглинається кореневою системою рослини, під час її проростання та спрямовується в листя.

Клотіанідин діє на натрієві канали нервової системи шкідників, внаслідок чого блокується передача нервового імпульсу і, як результат, комаха гине.

Діюча речовина завдяки своїй мобільноті рівномірно розподіляється по всій рослині.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/т
Пшениця	Злакові мухи, цикадки, попелиці, совки, хлібна жужелиця, трипси		0,5-1,0
Соняшник	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	Обробка насіння перед посівом	4,5-7,0
Кукурудза	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів		3,5-5,0
Буряки цукрові	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів		75-150 мл/100 тис. насінин

Латіна вдало контролює основних шкідників насіння та сходів навіть за складних умов. Формуляція продукту дозволяє діючій речовині максимально довго знаходитися на поверхні насінини та ефективно діяти. Продукт протягом тривалого часу впевнено контролює дротяніків, мух, совок, личинок хрушів тощо. Завдяки системним властивостям діючої речовини, інсектицид розподіляється рослиною з коренів до наземної частини. Діюча речовина поглинається кореневою системою рослини, під час її проростання клотіанідин спрямовується в листя. При цьому інсектицид розподіляється рослиною дуже рівномірно і забезпечує тривалу захистну дію проти шкідників. Обробка насіння Латіною, дає можливість максимально захистити молоді сходи культури від більшості ґрунтових та листкових шкідників.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





МЕТАКСА



**Системний інсектицидний
протруйник, контактно-кишкової дії**

Переваги

- Системна дія і помірна розчинність забезпечують захист посівів впродовж тривалого періоду.
- Рівномірний розподіл в рослині усуває необхідність обробки молодих сходів.

Характеристики

Вміст діючої речовини тіаметоксам, 350 г/л

Хімічна група неонікотиноїди

Препаративна форма концентрат, що тече

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Для досягнення високої якості захисту рослин від шкідників, рекомендується протруювати насіння, попередньо очищене від пилу та сміття, чим забезпечується якісне утримання препарату

Застереження у застосуванні Можна застосовувати у бакових сумішах із протруйниками фунгіцидної дії, а також додавати комплекс мікродобрив. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність

Вимоги до pH робочого розчину від 4 до 7

Норма витрати робочого розчину 8-10 л/т



Механізм дії

Тіаметоксам діє на нервову систему комах, блокуючи рух нервових сигналів між нервовими закінченнями, внаслідок чого комаха перестає харчуватися і гине. Такий механізм дії виключає розвиток перехресної стійкості до цього препарату.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/т
Кукурудза			6-9
Соняшник			6-10
Озима пшениця	Комплекс ґрутових та наземних шкідників сходів	Обробка насіння перед посівом	0,4-0,7
Соя			1,3-1,7
Бурякі цукрові			5-15



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ТЕФУТ ГОЛД



Двокомпонентний інсектицидний
протруйник для надійного захисту від
грунтових і наземних шкідників

Переваги

- Превентивний контроль грунтових шкідників ще до безпосереднього їхнього контакту з обробленими рослинами
- Контроль шкідників сходів на ранніх етапах розвитку кукурудзи.

Характеристики

Вміст діючої речовини тіаметоксам, 200 г/л + тефлутрин, 80 г/л

Хімічна група неонікотиноїди, піретроїди

Препаративна форма концентрат, що тече

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Застереження у застосуванні

Для забезпечення фумігантної дії потрібна температура від +8 °C – +10 °C. У зв’язку з цим слід уникати висіву насіння кукурудзи в холодний ґрунт або в очікуванні зниження температури ґрунту протягом терміну дії продукту. Крім того, слід дотримуватись агротехнічних умов і строків посіву.

Сумісність

Тефут Голд можна змішувати з іншими загальнозвживаними продуктами для обробки насіння. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти продукти на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7



Повернутись до
головного змісту



Механізм дії

Унікальною особливістю, що відрізняє тефлутрін від всіх інших піретроїдів, є утворення активної газової фракції навколо обробленого насіння. Це газове середовище утворює захисну сферу на відстані 2,0-2,5 см навколо насіння. Таким чином, ґрутові шкідники гинуть до того, як завдати шкоду насінині, проросткам та кореневій системі. Дія тіаметоксаму на листогризучих і сисних комах – наслідок високої системної активності. Він швидко проникає з поверхні насіння, формуючи високу концентрацію активної речовини в сім'ядолях, і одночасно вивільняється з насіння в ґрунт, звідки поглинається корінням і розподіляється по рослині.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/т
Кукурудза	Комплекс ґрутових шкідників	Обробка насіння перед посівом	5,0-12



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





ТЕФУТ ПРО



Контактний інсектицидний протруйник від ґрунтових шкідників

Переваги

- Потужно діє на різні види ґрунтових шкідників, зокрема на підгризаючих совок.
- Висока ефективність у посушливих умовах.
- Повна відсутність негативного впливу на посівні якості насіння.

Характеристики

Вміст діючої речовини тефлутрин, 200 г/л

Хімічна група піретроїди

Препартивна форма мікроапсульована суспензія

Класифікація ВООЗ II клас (небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Для досягнення високої якості захисту рослин від шкідників, рекомендується протруювати насіння, попередньо очищене від пилу та сміття, чим забезпечується якісне утримання продукту.

Сумісність Продукт можна змішувати з іншими загальнозваживаними продуктами для обробки насіння. Проте в кожному конкретному випадку слід перевірити продукти на сумісність.

Застереження у застосуванні Забороняється застосування продукту методом обприскування та авіаційним методом. Заборонено проводити посів протруєним насінням в санітарній зоні навколо рибогосподарських водойм на відстані 500 м від кордону затоплення при максимальному стоянні паводкових вод'.

Вимоги до pH робочого розчину від 5 до 7



Механізм дії

Висока швидкість впливу на шкідливий об'єкт, пари тефлутрину за кілька хвилин проникають через покривні тканини і органи дихання комахи. В результаті цього відбувається пригнічення харчової активності, порушення роботи нервової системи, настає параліч і протягом 10-30 хвилин настає загибель.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/т
Кукурудза		Внесення препарату в ґрунт одночасно з посівом культури	0,5-1,5
Кукурудза	Комплекс ґрутових шкідників		2,5-5,0
Соняшник		Обробка насіння перед посівом	2,0-5,0
Буряки цукрові			14-20



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ФУКСІЯ

пшениця



соняшник



кукурудза



соя



**Контактний фунгіцидний протруйник
для боротьби з комплексом збудників
хвороб**

Переваги

- Знищує збудників грибкових хвороб як на поверхні, так і всередині насінини.
- Висока толерантність до культури – не впливає на проростання та розвиток культур навіть при перевищенні норми витрати.
- Висока ефективність проти кореневих гнилей.
- Тривалий період захисної дії.

Характеристики

Вміст діючої речовини **флудіоксоніл, 25 г/л**

Хімічна група **фенілпіроли**

Препаративна форма **концентрат суспензії, що тече**

Класифікація ВООЗ **III клас (помірно небезпечний)**

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Для досягнення високої якості захисту рослин від хвороб, рекомендується протруювати насіння, попередньо очищене від пилу та сміття, чим забезпечується якісне утримання продукту на насінні.

Сумісність Продукт можна використовувати в бакових сумішах з іншими продуктами, однак при цьому рекомендується провести тест на сумісність пестицидів.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Норма витрати робочого розчину

8-10 л/т



Повернутись до
головного змісту



Механізм дії

Флудіоксоніл діє контактно, локально проникає у тканини насіння, та розподіляється в ґрунті навколо нього. Пригнічує процес синтезу глюкози та ріст міцелю грибів, а також порушує функції клітинних мембран, що викликає загибелю збудників хвороб.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/т
Пшениця	Сажкові хвороби, кореневі гнилі, снігова пліснява	Обробка насіння перед посівом	1,5-2,0
Кукурудза	Червона та пітіозна гнилі, фузаріозна гниль, пліснявіння насіння		1,0-1,5
Соняшник	Кореневі гнилі		5,0-6,0
Соя*	Аскохітоз, фузаріоз, сіра гниль		1,25

*Очікуємо на реєстрацію



Кореневі гнилі частіше проявляються на сходах і рідше на дорослих рослинах. На сходах спостерігають загнивання корінців, стебел та сім'ядолей. Проростки буріють і часто гинуть до виходу на поверхню ґрунту. окремі хворі проростки пробиваються із землі, однак на їхніх сім'ядолях помітні глибокі бурі виразки, які іноді можуть займати понад половину всієї поверхні. На дорослих рослинах захворювання викликає почорніння і відмирання кореневої системи або основи стебла; вони відстають у рості та в'янутуть. Шкодочинність полягає у зрідженні посівів, зменшенні урожаю зерна та погіршенні його якості. Фуксія завдяки своїй формулляції, вигідно відрізняється від порошкових протруйників.

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до головного змісту





ХЛОРИС



Контактно-системний фунгіцид для протруювання насіння від комплексу хвороб

Переваги

- Високоефективний фунгіцидний захист з одночасною дезінфекцією ґрунту та насіння.
- Повний контроль кореневих гнилей.
- Ефективний контроль сажкових хвороб та снігової плісняви.

Характеристики

Вміст діючої речовини тебуконазол, 15 г/л + прохlorаз, 60 г/л

Хімічна група триазоли + імідазоли

Препаративна форма емульсія для обробки насіння

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Для досягнення високої якості захисту рослин від хвороб, рекомендується протруювати насіння, попередньо очищене від пилу та сміття, чим забезпечується якісне утримання продукту.

Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах з іншими продуктами, однак при цьому рекомендується провести тест на сумісність пестицидів.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 8

Норма витрати робочого розчину

8-10 л/т





Механізм дії

Тебуконазол – знищує поверхневу і внутрішню інфекцію, завдяки чому є високоефективним проти сажкових хвороб, фузаріозної та гельмінтоспоріозної кореневих гнілей, септоріозу проростків. Він має добре виражену системну дію, проникає у проросток, що забезпечує надійний захист протягом періоду від проростання насіння до фази кущення.

Прохлораз – належить до групи імідазолів та має контактну і трансламінарну дію, проникає в насіннєві оболонки й знищує поверхневу інфекцію, дезінфікуючи зерно від грибів, що містяться на поверхні насіння і в алейроновому шарі. Також знезаражує ґрунт навколо насінини та кореневої системи проростка, що дуже важливо для отримання здорових рослин з максимальною продуктивністю. Ця діюча речовина має високу ефективність проти фузаріозної, гельмінтоспоріозної та інших видів кореневих і прикореневих гнілей, сітчастої та темно-бурої плямистості листя, активно діє проти снігової плісняви.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/т
Пшениця	Фузаріозна та гельмінтоспоріозна кореневі гнілі, сажкові хвороби, снігова пліснява, плямистості листя	Обробка насіння перед посівом	1,75-2,0

Снігова пліснява

Хвороба розвивається ранньою весною, відразу після розставання снігу. На листках озимих з'являється водянисті плями з білим павутиним нальотом, що призводить до склеювання листків в наслідок чого уражене листя відмирає. При сильному ураженні спостерігається відмирання вузла кущіння, листових піхв, коренів та як наслідок загибель всієї рослини. Збудник хвороби наявний в агроценозах зернових колосових культур протягом усього вегетаційного періоду, зумовлюючи також плямистість листя, ураження колоса й зерна.



Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





ЛАТИНА

ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ перед сівбою – найважливіший крок для забезпечення запланованої густоти рослин, формуванні дружніх та рівномірних сходів.

1

інсектицидний, системний протруйник з пролонгованою дією

2

надійний захист насіння та молодих проростків польових та кормових культур

3

тривалий захист проти комплексу ґрунтових та наземних шкідників





**ЯКІСНИЙ ВРОЖАЙ ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ПРОТРУЄННОГО НАСІННЯ
ЛАТИНА**



РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

ВЕРТЕКС	186	ТАВА	188
(поліетиленгліколь-400, 230 г/л; поліетиленгліколь-1500, 540 г/л; гумат натрію, 3 г/л)			(етефон, 480 г/л)



ПРОТРУЙНИКИ



* Зміст клікаєльний.

Клацнувши по номеру сторінки або назві ви маєте можливість перейти безпосередньо до сторінки з описом продукту

** Вертекс - назва продукту

180 - номер сторінки

поліетиленгліколь-400, 230 г/л; поліетиленгліколь-1500,
540 г/л; гумат натрію, 3 г/л - діюча речовина



ВЕРТЕКС



Комплексний регулятор росту контактно-системної дії для обробки насіння

Переваги

- Активатор ґрунту, який підтримує позитивний баланс гумусонакопичення.
 - Ефективний адаптоген, термопротектор і кріопротектор.
 - Вертекс забезпечує закріплення продуктів на поверхні насіння та листі, що підвищує ефективність пестицидів і мікродобрив.
-
- При тривалому знаходженні обробленого насіння в умовах нестачі вологи в ґрунті, сформована оболонка зберігає їх схожість.
 - Продукт працює як інгібітор хвороб. Вертекс, внесений з фунгіцидами, зневоднює грибки та бактерії. Висушування мікробної клітини, з одного боку, знижує її біологічну активність, а з іншого підвищує її сприйнятливість до дії продукту.
 - Прискорює процеси росту і фотосинтезу, регулює транспірацію та інтенсивність мінерального живлення. Присутність відмітих солей гумінових кислот підсилює коренеутворення і покращує живлення, що сприяє активізації росту надземної частини рослини.

Характеристики

Вміст діючої речовини

поліетиленгліколь-1500, 540 г/л +
поліетиленгліколь-400, 230 г/л + гумат натрію, 3 г/л

Хімічна група

поліетиленгліколь 400 і 1500 –
поліконденсаційні полімери етиленгліколю,
гумат натрію – солі гумінових кислот

Препаративна форма

розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ

IV клас (малонебезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Робочий розчин не підлягає тривалому зберіганню, а тому його необхідно використати протягом доби після приготування.

Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах з іншими продуктами, окрім лужних. Однак при цьому рекомендується провести тест на сумісність пестицидів.

Норма витрати робочого розчину

8-10 л/т (обробка насіння) 200-300 л/га
(обприскування посівів)



Механізм дії

Низькомолекулярні поліетиленоксиди легко проникають в тканини, виконуючи функцію транспортного агента для всіх продуктів, що застосовуються спільно зі стимулятором росту. Вони прискорюють обмінні процеси в тканинах рослин, що проявляється в більш інтенсивному синтезі антистресових речовин. Активізують кореневі виділення рослин і діяльність ґрутових мікроорганізмів, які проявляються в посиленні виділення CO₂ і фіксації азоту.

Властивості продукту

Діючі речовини, які входять до складу регулятору росту рослин Вертекс, підсилюють дію одної і забезпечують продукту багатофункціональність.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Фаза внесення	Норми витрати	Кількість обробок
Пшениця, ячмінь, овес, просо, горох, гречка, кукурудза, цукрові буряки, соняшник	Обробка насіння перед посівом	0,5 л/т	1
	Обприскування рослин в період вегетації	0,4-0,5 л/га	1

Не рекомендовано змішувати декілька регуляторів росту, оскільки результат застосування такої бакової суміші може бути непередбачуваний: можна не тільки не отримати очікуваного ефекту.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до головного змісту





ТАВА



пшениця

ячмінь

**Регулятор росту для застосування
проти вилягання. Надає жорсткості
і стримує ріст стебла у рослини**

Переваги

- Запобігає виляганню культури.
- Сприяє вирівняності посівів та покращує якісні показники врожаю.
- Стимулює ріст кореневої системи.
- Покращує якість збирання врожаю.

Характеристики

Вміст діючої речовини етефон, 480 г/л

Хімічна група етиленпродуценти

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас небезпечності

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

За 6 днів до і після внесення не можна застосовувати гербіциди. Обприскувати в період від виходу в трубку. Оптимальна температура для внесення препарату – +15°C - +25°C. На посівах, що недостатньо забезпечені живленням та вологовою, норму витрати рекомендовано знизити.

Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності препарату.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 7

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Етефон швидко проникає в рослину та розкладається в тканинах з утворенням етилену. На клітинному рівні етилен виступає як інгібітор транспортування ауксинів та біосинтезу гіберелінів, що призводить до штучної регуляції ростових процесів. Крім того, відбувається стимулювання синтезу твердих субстанцій (лігніну, пігментів, целюлози, цукрів), що прискорює дозрівання зерна у культурних рослин. Змінюється динаміка накопичення біомаси рослини в бік зерна.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Призначення	Фаза внесення	Норми витрати, л/га	Кількість обробок
Пшениця	Запобігання виляганню рослин	Від початку виходу прaporцевого листка до початку виходу колоса (BBCN 37-48)	0,75-1,0	1
Ячмінь		Від виходу в трубку до початку виходу колоса (BBCN 32-48)	0,5-0,75	1

Не рекомендуємо використовувати на посівах, що знаходяться в стресових умовах, а також на бідних ґрунтах з низьким вмістом азоту.

Тава застосовується на пшениці та ячмені проти вилягання. Тава сприяє зменшенню росту стебла і посилює його міцність. Водночас він стимулює ріст кореневої системи, а листкові пластинки стають товщими, ширшими, з темно-зеленим забарвленням.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





ПРИЛИПАЧІ

ПРИЛИПАЧІ

МАЧО

192

(етоксилат-ізодециловий спирт, 900 г/л)

СУПЕР-МАЧО

194

(модифікований поліефір трісілоксан 85 % + аллілоксіполіетиленгліколь 15 %)



* Зміст клікабельний.

Клацнувши по номеру сторінки або назві ви маєте можливість перейти безпосередньо до сторінки з описом продукту

** Мачо - назва продукту

186 - номер сторінки

етоксилат-ізодециловий спирт, 900 г/л - діюча речовина





МАЧО



Прилипач, активатор сульфонілсечо-вин, поверхнево-активна речовина

Переваги

- Збільшує ефективність сульфонілсечовин.
- Сприяє прискореному проникненню діючих речовин засобів захисту у рослині.
- Забезпечує високу та стабільну ефективність дії продуктів.
- Покращує змочування надземних частин рослин та посилює прилипання робочого розчину препарату.

Характеристики

Вміст діючої речовини етоксилат-ізодециловий спирт, 900 г/л

Хімічна група прилипач

Препаративна форма водний розчин

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Застосовується в баковій суміші з пестицидами для післясходового обприскування сільськогосподарських культур згідно регламенту використання ЗЗР.

Сумісність

Сумісний з іншими продуктами. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Норма витрати

МАЧО застосовується в концентрації 0,1% (100 мл на 100 л води) при нормі витрати робочого розчину від 200 до 300 літрів на га. При обробці з меншим об'ємом слід використовувати 150 мл МАЧО на га.



Повернутись до головного змісту



Механізм дії

Етоксилат-ізодециловий спирт зменшує поверхневий натяг розчину, що забезпечує утворення однорідної плівки і зменшує стікання робочого розчину з поверхні листків. Це сприяє кращому прилипанню засобів захисту рослин, проникненню продукту крізь кутикулу і їх поглинанню рослиною. Таким чином, продукт підвищує ефективність пестицидної дії, що особливо важливо під час сухої або прохолодної погоди, коли уповільнюється ріст рослин та погіршується їх змочування робочим розчином.

Властивості продукту

Ефективність МАЧО не залежить від жорсткості води. Не загоряється, не спричиняє корозії робочих деталей, не леткий. Помірно безпечний для людини та навколишнього середовища.

Спектр дії

Застосовується в якості прилипача з гербіцидами для післясходового внесення.



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





СУПЕР-МАЧО



Прилипач нового покоління, що належить до органосиліконової групи, відомої як «супер-змочувачі»

Переваги

- Високоефективний кремнійорганічний сурфактант.
- Збільшує ефективність і швидкість дії пестицидів.
- Використовується в якості поверхнево-активної речовини в баковій суміші з пестицидами.

Характеристики

Вміст діючої речовини

модифікований поліефір трісілоксан 85% + аллілоксіполіетиленгліколь 15%

Хімічна група

прилипач

Препаративна форма

водний розчин

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

При приготуванні робочих розчинів в бакову суміш додається в останню чергу.

Сумісність

Продукт сумісний з іншими продуктами. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.

Застереження у застосуванні

Використання у нормі понад 0,15 л/га або надлишкового обсягу води не призводить до поліпшення покриття, а навпаки, може сприяти підвищенню стікання розчину з поверхні листя.



Механізм дії

Модифікований поліефір трісілоксан та аллілоксіполіетиленгліколь зменшують поверхневий натяг розчину, що наноситься, забезпечуючи цим утворення однорідної плівки на поверхні листків. Це сприяє кращому покриттю площин листка, прилипанню пестициду і його поглинанню рослиною. Таким чином ПАР підвищує швидкість дії і ефективність продукту. Особливо велике значення це має під час сухої або холодної погоди, коли уповільнюється ріст бур'янів та погіршується їх змочування робочим розчином. Жорсткість води не впливає на ефективність ПАР.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Пестицид	Норми витрати, л/га	Витрата води, л/га
Польові культури (зернові, зернобобові, ріпак, буряки цукрові тощо)	Інсектициди і фунгіциди	0,10	150-250
Плодові, ягідні, овочеві культури		0,075-0,15	60-70 % від звичайної витрати води
Польові, плодові, ягідні, овочеві культури	Гербіциди	0,075-0,10	200

Замовити

**0-800-300-044
+38(044)364-88-41**



Повернутись до головного змісту





ДЕСИКАНТИ

ДИКВАЛАН 198 (дикват, 150 г/л)	ДИКВАЛАН МАКС 200 (дикват дібромуїд, 374 г/л)	ФОСИНОР 202 (глюфосинатамонію, 200 г/л)
---	--	--

ПАЙОТ 204 (модифікований поліефір трісілоксан 10-20 % + полігліколевий ефір жирного спирту 10-20 % + 2-етилгексан -1-ол 5-10 %)	АЛЮФОС 206 фосфід алюмінію 560 г/кг
--	---

ІНШЕ



* Зміст клікабельний.

Клацнувши по номеру сторінки або назві ви маєте можливість перейти безпосередньо до сторінки з описом продукту

** Диквалан - назва продукту
192 - номер сторінки
(дикват, 150 г/л) - діюча речовина



ДЕСИКАНТИ

ДИКВАЛАН



Контактний десикант, призначений для підсушування перед збиранням сільськогосподарських культур

Переваги

- Прискорює технологічну стиглість рослин та зменшує втрати при збиранні.
- Не впливає на наступні культури у сівозміні.
- Крім культурних рослин, висушує бур'яни.

- Не впливає на якісні показники насіння.
- Обмежує розповсюдження грибкових хвороб, таких як альтернаріоз, пліснявіння, білої та сірої гнилей.
- Забезпечує прискорене та одночасне дозрівання, що дозволяє провести збір врожаю в ранні строки.

Характеристики

Вміст діючої речовини дикват, 150 г/л

Хімічна група похідні біпіridилію

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Рекомендується використовувати тільки чисту, не жорстку воду. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площин і рясне змочування рослин під час проведення внесення продукту. Обробку рекомендується проводити у вечірній час або вдень за умов хмарної погоди.

Сумісність

Бакові суміші з іншими засобами захисту рослин не рекомендуються через неспівпадання строків застосування. За виключенням використання з фунгіцидами під час десикації картоплі. Сумісний у бакових сумішах з карбамідом або аміачною селітрою.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 8

Застереження у застосуванні

Обробку посівів проводити при настанні фізіологічної стиглості насіння і його вологості не вище 30%. Обробка в більш ранні строки може привести до зменшення урожайності та зниження посівних якостей насіння.

Температура внесення не повинна перевищувати +25°C.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га для наземного обприскування та 50-70 л/га – для авіаційного.



Механізм дії

Дикват потрапляє на поверхню рослини, частково переміщується по ксилемі. Дикват порушує у рослинах процес фотосинтезу. У них утворюються сильні оксиди, які пошкоджують клітинні мембрани та цитоплазму, що призводить до зневоднення клітин і висихання рослин. Діє відразу після внесення продукту, що дозволяє приступити до збирання врожаю через 5-7 днів залежно від температури повітря.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробля- ється	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Соя	Обприскування культури у фазі початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусу (за вологості не більше 30%)	2,0-3,0
Соняшник	Обприскування культури у фазі початку побуріння кошиків (в т.ч. авіаметодом)	



Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
головного змісту





ДИКВАЛАН МАКС



**Універсальний десикант контактної дії
для наземного та авіаційного способу
внесення.**

Переваги

- Прискорює технологічну стиглість рослин та зменшує втрати при збиранні.
- Надзвичайно швидка дія
- Низька норма застосування

Характеристики

Вміст діючої речовини дикват дібромід, 374 г/л

Хімічна група похідні біпіridилію

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Рекомендується використовувати тільки чисту, не жорстку воду. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття плоші і рясне змочування рослин під час проведення внесення продукту. Обробку рекомендується проводити у вечірній час або вдень за умов хмарної погоди.

Сумісність

Бакові суміші з іншими засобами захисту рослин не рекомендуються через неспівпадання строків застосування. За виключенням використання з фунгіцидами під час десикації картоплі. Сумісний у бакових сумішах з карбамідом або аміачною селітрою.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 8

Застереження у застосуванні

Обробку посівів проводити при настанні фізіологічної стиглості насіння і його вологості не вище 30%. Обробка в більш ранні строки може привести до зменшення урожайності та зниження посівних якостей насіння. Температура внесення не повинна перевищувати +25°C.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га для наземного обприскування та 50-70 л/га – для авіаційного.

Повернутись до головного змісту



Механізм дії

Дикват дібромід потрапляє на поверхню рослини, частково переміщується по ксилемі. Дикват дібромід порушує у рослинах процес фотосинтезу. У них утворюються сильні оксиди, які пошкоджують клітинні мембрани та цитоплазму, що призводить до зневоднення клітин і висихання рослин. Діє відразу після внесення продукту, що дозволяє приступити до збирання врожаю через 5-7 днів залежно від температури повітря.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробля- ється	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Соняшник	Десикація у фазі початку побуріння кошиків (в т.ч. авіаметодом)	0,8 – 1,2
Ріпак	Десикація при побурінні 70% стручків (в т.ч. авіаметодом)	0,8 – 1,2
Соя	Десикація у фазу побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості не більше 25–30%)	0,8 – 1,2
Горох	Десикація у період пожовтіння стручків, за вологості зерна не більше 35%	0,8 – 1,2



Замовити


0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
головного змісту





ФОСИНОР



Десикант та контактний гербіцид суцільної дії

Переваги

- М'яка дія, яка прискорює надходження поживних речовин, що підвищує його якість.
- Покращення якості та зменшення втрат під час збирання культур.
- Безпечний для застосування на насінневих посівах.

Характеристики

Вміст діючої речовини глюфосинат амонію, 200 г/л

Хімічна група похідні фосфінової кислоти

Препаративна форма розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування Ефект продукту гарантується за умови відсутності опадів протягом 6-8 годин після застосування. Не проводити обробку, якщо є ймовірність випадання опадів.

Сумісність Сумісний з багатьма гербіцидами. Перед приготуванням робочого розчину рекомендовано додатково провести тест на сумісність.

Вимоги до pH робочого розчину

від 5 до 9

Застереження у застосуванні

У разі недотримання регламенту застосування можливе зниження ефективності продукту.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га для наземного обприскування та 50-70 л/га – для авіаційного.



Механізм дії

Глюфосинат амонію блокує ферменти глютамін синтетази, що викликає накопичення вільного аміаку в тканинах рослинини, порушення мембраних функцій, фотосинтезу та блокування синтезу білку. Пожовтіння бур'янів відбувається протягом 2-3 днів, повна загибель - протягом 3 тижнів. Особливий механізм дії глюфосинату амонію дозволяє вирішити проблему стійкості бур'янів до інших гербіцидів, в т.ч. і стійких до гліфосату, які все більше з'являються останнім часом. Глюфосинт амонію не має ґрунтової дії.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробля- ється	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Соняшник Соя Кукурудза	Обприскування вегетуючих бур'янів до сходів культури	1,5-2,0
Соняшник	Десикація у фазі повної стигlosti за вологостi насіння 33-37% (в т.ч. авіаметодом)	1,0-2,0
Соя	Десикація у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів	1,0-2,0
Пшениця	Десикація у фазі початку воскової стигlosti насіння	2,0-3,0
Ріпак	Десикація при побурінні 70% стручків	2,0-3,0

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту



ПАЙОТ



Піногасник

Переваги

- Продукт на основі поверхнево-активних речовин, призначений для запобігання утворення піни та припинення піноутворення
- Використовується в бакових сумішах з пестицидами
- Висока стійкість в кислому та лужному середовищі та жорсткій воді

Характеристики

Вміст діючої речовини

модифікований поліефір трісілоксан 10-20 %
+ полігліколевий ефір жирного спирту 10-20 %
+ 2-етилгексан -1-ол 5-10 %

Хімічна група

органо-силіконова група

Препаративна форма

розчинний концентрат

Класифікація ВООЗ

III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Обприскування необхідно проводити при температурі повітря від +15 до 25°C та при швидкості вітру не більше ніж 5 м/с згідно регламентів використання пестицидів та агротехнік.

Вимоги до pH робочого розчину

від 4 до 10

Механізм дії

Використовується під час приготування робочого розчину ЗЗР, які мають надмірне піноутворення. Спочатку необхідно додати 1/2 кількості води в резервуар для змішування. Запустивши мішалку, додаємо піногасник, а потім ЗЗР. Продовжуємо перемішування і додаємо залишок води. Не можна залишати робочий розчин в оприскувачі на тривалий час.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Норми витрати
Всі сільськогосподарські культури, що обробляються	5-10 мл на 100 л робочого розчину

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту



АЛЮФОС



Фумігант для боротьби зі шкідниками запасів зерна методом фумігації

Переваги

- Не накопичується в сільськогосподарській продукції
- Знищує шкідників запасів у різних стадіях розвитку
- Швидка проникаюча здатність
- Продукт здатний швидко знищити всі різновиди кліщів, шкідливих комах та гризунів

Характеристики

Вміст діючої речовини фосфід алюмінію 560 г/кг

Хімічна група неорганічні металомісткі сполуки.

Препаративна форма таблетки

Класифікація ВООЗ I клас (токсичний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

При проведенні фумігації таблетки розміщують на підлозі, на поверхні зерна або між мішками з продукцією з урахуванням загальної витрати, розрахованої на весь об'єм приміщення.

Фумігація за температури

- до 5°C
- 5...10°C
- 11...15°C
- 16...25°C
- вище 25°C

Експозиція

- | | |
|--------------------------|--------|
| фумігація не проводиться | 10 діб |
| | 5 діб |
| | 4 доби |
| | 3 доби |

Допускати людей та завантажувати складські приміщення дозволяється лише після повного провітрювання протягом від 2 до 7 діб. Реалізувати продукцію дозволяється через 20 діб після фумігації.

Механізм дії

Фосфід алюмінію під час контакту з атмосферним повітрям розкладається на фосфористий водень (PH_3), вуглекислий газ (CO_2) з виділенням аміаку (NH_3). Швидкість проходження реакції залежить від наявності вологи в повітрі і його температури. При вологості повітря 60% і температурі +20°C 50% газу виділяється протягом 24 годин. Максимальний ефект від фумігації досягається через 60-72 години. Газ фосфін порушує процеси метаболізму і блокує надходження кисню до організму, викликаючи параліч нервової системи і повну загибель шкідників.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Шкодочинний об'єкт	Норми витрати, $\text{г}/\text{м}^3, \text{т}$
Зерно затарене в мішки (зерно хлібних злаків та зерно кукурудзи)		6 (2 таблетки)
Зерно злакових насипом	Шкідники запасів	9 (3 таблетки)
Незавантажені склади		3-6 (1-2 таблетки)
Зерно пшениці, ячменю, кукурудзи в трюмах суден насипом, в контейнерах		9 (3 таблетки)

Замовити

0-800-300-044
+38(044)364-88-41



Повернутись до
головного змісту





ДИКВАЛАН МАКС

В ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРОВОДИТИ ДЕСИКАЦІЮ?

- Є висока або середня засміченість посівів багаторічними й однорічними бур'янами
- Нерівномірність дозрівання культури на полі або по ярусах
- При вологій і прохолодній погоді

ПЕРЕВАГИ ДИКВАЛАН МАКС

- ✓ Значно знижує вологість урожаю, тим самим зменшуючи затрати на сушку.
- ✓ Знищує бур'яни.
- ✓ Зупиняє розповсюдження хвороб, наприклад: фітофторозу, білої та сірої гнилі.
- ✓ Не змивається дощем вже через 30 хвилин після обробки.
- ✓ Швидко розкладається в ґрунтах, не впливає на наступні культури сівозміни.
- ✓ Не впливає на якість насіння.
- ✓ Забезпечує прискорене та одночасне дозрівання, що дозволяє провести збір врожаю в ранні строки та при будь-якій погоді.
- ✓ Діє одразу після внесення продукту, що дозволяє приступити до збирання врожаю через 5-7 днів залежно від температури та вологості повітря.



[Повернутись до головного змісту](#)



**ПРИШВИДШУЙТЕ ДОСТИГАННЯ
КУЛЬТУРИ З ДЕСИКАНТОМ
ДИКВАЛАН МАКС**

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Протруйники



Регуляція росту



Гербіциди



Десиканти



Фунгіциди



Прилипачі



Інсектициди



Регулятори росту



СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ

Шкодочинні об'єкти	Діюча речовина	Обробка насіння	Обприскування ґрунту до сібі, після сібі	Сходи (BBCH 00-10)	3-5 листків (BBCH 13-15)	5-7 листків (BBCH 15-17)	7-10 листків (BBCH 17-20)	Витягування стебла (BBCH 21-39)	Викидання волоті (BBCH 51-53)	Цвітіння (BBCH 61-69)	Налив зерна (BBCH 71-79)	Повна стиглість (89-93)	
Регулятор росту	Поліетиленгіколь-400, 230 г/л + Поліетиленгіколь -1500, 540 г/л + Гумат натрію 3	Вертекс 0,5 л/га						Вертекс 0,5 л/га					
Комплекс ґрутових та посходових шкідників	Клотіанідин, 600 г/л Тіаметоксам, 350 г/л Тіаметоксам, 200 г/л Тефлутрин, 80 г/л Тефлутрин, 200 г/л	Латина 3,5-5,0 л/т Метакса 6,0-9,0 л/т Тефут Голд 5,0-12,0 л/т Тефут ПРО 0,5-5,0 л/т											
Широкий спектр бур'янів	Ізопропіламіна сіль гліфосату, 480 г/л Калійна сіль гліфосату, 550 г/л Калійна сіль гліфосату, 663 г/л (540 г/л у кислотному еквіваленті) Глюфосинат амонію, 200 г/л		Напалм 2,0-6,0 л/га Напалм Форте 1,0-6,0 л/га Напалм Супер 2,0-3,5 л/га Фосінор 1,5-2,0 л/га										
Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Тербутилазин, 500 г/л			Айдахо 1,5-2,5 л/га									
Однорічні злакові та деякі дводольні	Ацетохлор, 900 г/л Метолахлор, 960 г/л Пропізохлор, 720 г/л Пропізохлор, 360 г/л + тербутилазин, 190 г/л			Сахара 1,5-3,0 л/га Дабл Трай 1,3 л/г Сора-НЕТ 2,0-3,0 л/га Старплент 3,8-4,5 л/га									
Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні	Флуроксіпір, 333 г/л Нікосульфурон, 40 г/л Римсульфурон, 250 г/кг Римсульфурон, 500 г/кг + тіфенсульфурон-метил, 250 г/кг				Форіт 0,5-0,6 л/га Муссон 1,0-1,25 л/га								
Однорічні та багаторічні дводольні	2-етіленгексановий ефір 2,4-Д, 452 г/л + Флорасулам, 6,3 г/л 2,4-Д у формі диметиламінної солі, 344 г/л + дикамба, 120 г/л + 120 г/л Мезотріон, 480 г/л				Рим 40-50 г/га Кентавр 20-25 г/га								
Однорічні та деякі багаторічні дводольні	Флорасулам, 250 г/кг					Примус 0,4-0,6 л/га Дикамба Форте 1,0-1,2 л/га							
Комплекс шкідників	Альфа-циперметріт, 200 г/л Імідацоприд, 300 г/л + Лямбда-цигалотрин, 100 г/л Флубендіамід, 480 г/л Тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л Клотіанідин, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л						Сумаро 0,25 л/га			Альтрон 0,05 – 0,1 л/га Бомбардир Дуо 0,15 – 0,25 л/га Кайрос 0,1-0,15 л/га Октант Гурбо 0,2 – 0,25 л/га Престо 0,3-0,4 л/га			
Десиканти	Калійна сіль гліфосату, 550 г/л Калійна сіль гліфосату, 663 г/л (540 г/л у кислотному еквіваленті)											Напалм Форте 2,4 л/га Напалм Супер 2,4 л/га	
Прилипачі	Етоксипат ізօօсилового спирту, 900 г/л Модифікований полієфір тріполексан 85%+ Альлокс-поліетиленгіколь 15%						Мачо 0,1 л на 100 л води					Супер-Мачо 0,1 л/га	

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ

Шкодочинні об'єкти	Діюча речовина	Обробка насіння	Обприскування ґрунту до сеяби, після сібі	Сходи (ВСН 00-11)	2-3 листки (ВСН 12-13)	Кущіння (ВСН 21-29)	Вихід в трубку (ВСН 30-39)	Прапорцевий листок (ВСН 40-45)	Колосіння (ВСН 51-59)	Цвітіння (ВСН 61-69)	Налив (ВСН 71-89)	Повна спильсть (ВСН 90-93)	
Регулятор росту	Поліетиленгліколь-400, 230 г/л + Поліетиленгліколь-1500, 540 г/л + Гумат натрію 3	Вертекс 0,5 л/га						Вертекс 0,5 л/га					
Комплекс грибкових хвороб насіння та сходів	Ципроконазол, 6,3 г/л + дифеноконазол, 30 г/л Тебуконазол, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л Флудоксоніл, 25 г/л Карбендазим, 500 г/л	Бастіон 1,0 л/т Хлоріс 1,75-2,0 л/т Фуксія 1,5-2,0 л/т Абсолют 1,5-2,0 л/т											
Комплекс ґрунтових та сходових шкідників	Клотіанідин, 600 г/л Тіаметоксам, 350 г/л	Латина 0,5-1,0 л/т Метакса 0,4-0,7 л/т											
Широкий спектр бур'янів	Ізопропіламінна сіль гілфосату, 480 г/л Калійна сіль гілфосату, 550 г/л Калійна сіль гілфосату, 663 г/л (540 г/л) кислотному еквіваленту		Напалм 2,0-6,0 л/га Напалм Форт 2,0-6,0 л/га Напалм Супер 2,0-3,5 л/га										
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яні	2-титенегексановий ефір 2,4-Д, 452 г/л + Флорасулам, 6,3 г/л 2,4-Д у формі диметиламінної солі, 344 г/л + дикамба, 120 г/л Трибенuron-метил, 750 г/кг						Примус 0,3-0,5 л/га Дикамба Форт 0,3-0,7 л/га						
Однорічні та декі багаторічні дводольні	Флорасулам, 250 г/кг							Шеріф 20-25 л/га					
Однорічні (в т.ч. підмарениник чіпкій) та декі багаторічні (в т.ч. берізка польова) дводольні бур'яні	Флуороксіпір, 333 г/л							Аксакал 20-30 л/га					
Комплекс шкідників	Альфа-циперметрин, 100 г/л Альфа-циперметрин, 200 г/л Лямбда-цигалотрин, 50 г/л Імідоклоприд, 700 г/кг Імідоклоприд, 200 г/л Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л Тіаметоксам, 250 г/кг Тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л Ацетамілприд, 200 г/кг Клотіанідин, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л Хлорпірофос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л						Форіт 0,3-0,5 л/га						
Листо-стеблові хвороби	Карбендазим, 500 г/л Піофнат-метил, 500 г/л Флутріафол, 250 г/л Пропіконазол, 250 г/л Дифеноконазол, 250 г/л Прохлораз, 450 г/л Азоксистробін, 250 г/л Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л							Альфа-Супер 0,1-0,15 л/га Альтрон 0,05 – 0,1 л/га Циркул 0,15-0,2 л/га Бомбардир 0,045-0,050 кг/га Бомбардир Аква 0,20-0,25 л/га Бомбардир Duo 0,15 – 0,25 л/га Октант 0,1-0,15 кг/га Октант Турбо 0,2 – 0,25 л/га Атік 0,1-0,12 кг/га Престо 0,3-0,4 л/га Твікс 0,75-1,1 л/га					
Хвороби листків і колосу	Тебуконазол, 250 г/л Метконазол, 60 г/л Ципроконазол, 80 г/л + метконазол, 60 г/л							Абсолют 0,5 л/га Сальто 1,2-1,4 л/га Парацеель 0,5 л/га Міценал 0,5 л/га Сіон 0,2-0,5 л/га Легас 1,0 л/га Старк 0,6-0,8 л/га Дог 0,4-0,5 л/га					
Регуляція росту	Етафон, 480 г/л							Талер 0,5-1,0 л/га					
Прилипачі	Етоксилат ізоцешилового спирту, 900 г/л Модифікований поліефір трісіпоксан 85% + Алліліпоксіполіетиленгліколь 15%						Мачо 0,1 л на 100 л води					Супер-Мачо 0,1 л/га	
Десиканти	Глюфосинат амонію, 200 г/л											Фосинор 2,0-3,0 л/га	

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИК КЛАСИКА

Шкодочинні об'єкти	Діюча речовина	Обробка насіння	Обприскування групу до сібі, після сібі	Сходи (ВВСН 00-10)	1-2 пари (ВВСН 12-14)	3-4 пари (ВВСН 16-18)	5-6 пар (ВВСН 20-22)	Інтенсивний ріст (ВВСН 30-49)	Зірочка (ВВСН 50-59)	Початок цвітіння (ВВСН 60-63)	Цвітіння (ВВСН 65-69)	Налив (ВВСН 70-79)	Дозрівання (ВВСН 80-83)
Комплекс ґрунтових та сководих шкідників	Клотіанідин, 600 г/л Тіаметоксам, 350 г/л Тефлутгрин, 15 г/кг Тефлутгрин, 200 г/л	Латина 4,5-7,0 л/т Метакса 6,0-10,0 л/т Тефут 6,0-8,0 кг/га Тефут ПРО 2,0-5,0 л/т											
Широкий спектр бур'янів	Калійна сіль гілфосату, 550 г/л Калійна сіль гілфосату, 663 г/л (540 г/л у кислотному еквіваленті) Глюфосинат амонію, 200 г/л		Напалм Форте 1,0-6,0 л/га Напалм Супер 2,0-3,5 л/га Фоснор 1,5-2,0 л/га										
Однорічні дволопні та злакові бур'яні	Прометрин, 500 г/л Тербутазін, 500 г/л S-метолахлор, 312,5 г/л +тербутазін, 187,5 г/л		Перун 2,0-4,0 л/га Айдахо 1,5-2,5 л/га Новант 3,5-4,5 л/га										
Однорічні злакові та деякі дволопні	Ацетохлор, 900 г/л Метолахлор, 960 г/л Пропізохлор, 720 г/л Пропізохлор, 360 г/л + тербутазін, 190 г/л S-метолахлор, 960 г/л		Сахара 1,5-3,0 л/га Даблрай 1,3-1,6 л/га Сора-НЕТ 2,0-3,0 л/га Старлент 3,8-4,5 л/га Лігерон 1,0 - 1,6 л/га										
Однорічні та багаторічні злакові	Клетодим, 120 г/л Хізалофоп-П-етил, 125 г/л			Блейд 0,4-1,8 л/га Харума 0,6 – 1,2 л/га									
Дводольні бур'яні	Аклоніfen, 600 г/л		Аїнап 3,0-6,0 л/га	Аїнап 1,0-2,0 л/га									
Сисні і листогризуучі шкідники	Альфа-ципремтрин, 200 г/л Імідаклоприд, 700 г/кг Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л Імідаклоприд, 200 г/л Емамектин бензоат 100 г/кг Клотіанідин, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л Ацетаміприд, 200 г/кг Тіаклоприд, 240 г/л Флубендіамід, 480 г/л Тіаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л Лямбда-цигалотрин, 50 г/л					Альтрон 0,05 – 0,1 л/га Бомбардир 45-60 л/га Бомбардир Дуо 0,15 – 0,25 л/га Бомбардир Аква 0,25 – 0,3 л/га* Простаф* 0,2 – 0,25 л/га Престо 0,3-0,4 л/га				Атік 0,2-0,25 кг/га Синерид 0,4-0,5 л/га	Кайрос 0,1-0,15 л/га Кайрос 0,1-0,15 л/га		
Хвороби листя, стебла	Флуотрафол, 250 г/л Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л Дифеноконазол, 250 г/л Пропіконазол, 250 г/л Ципроконазол, 80 г/л + метконазол, 60 г/л Цімоксаніл, 300 г/кг + азоксистробін, 250 г/кг						Парацель 0,5 л/га ДОТ 0,5 л/га Спіл 0,2-0,5 л/га Меценат 0,5 л/га				Камзол Турбо 0,5-0,7 л/га Ультрапл 0,3-0,5 кг/га		
Хвороби листя, стебла, кошика	Азоксистробін, 250 г/л Тіофанат-метил, 500 г/л Карбендазим, 500 г/л Дифеноконазол, 125 г/л + азоксистробін, 125 г/л						Старк 0,8-1,0 л/га Сальто 1,2 л/га Абсолют 1,5 л/га Спіл Дуо 0,5-1,0 л/га						
Прилипачі	Модифікований поліефір тріполіскан 85 % + алілок-сполієтиленгліколь 15 %						Супер-Мачо 0,1 л/га						
Десиканти	Дикват дібромуїд, 374 г/л Дикват, 150 г/л Ізопропіламінна сіль гілфосату, 480 г/л Глюфосинат амонію, 200 г/л											Диквалан мак 0,8 – 1,2 л/га Диквалан 2,0-3,0 л/га Напалм 2,0-4,0 л/га Фоснор 1,0-2,0 л/га	

*Очікуємо на реєстрацію

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИК (ГІБРИДІВ, СТІЙКИХ ДО ДІЇ ІМІДАЗОЛІНОНІВ)

Шкодочинні об'єкти	Діюча речовина	Обробка насіння	Обприскування групу до сібби, після сібби	Сходи (BBCH 00-10)	1-2 пари (BBCH 12-14)	3-4 пари (BBCH 16-18)	5-6 пар (BBCH 20-22)	Інтенсивний ріст (BBCH 30-49)	Зріочка (BBCH 50-59)	Початок цвітіння (BBCH 60-63)	Цвітіння (BBCH 65-69)	Налів (BBCH 70-79)	Дозрівання (BBCH 80-83)	
Регулятор росту	Поліптиленгліколь-400, 230 г/л + Поліптиленгліколь -1500, 540 г/л + Гуматнатрію 3	Вертекс 0,5 л/га						Вертекс 0,5 л/га						
1 Комплекс ґрунтових та сходових шкідників	Клотанінд, 600 г/л Тіаметоксам, 350 г/л Тефлутрин, 15 г/кг Тефлутрин, 200 г/л	Патина 4,5-7,0 л/т Метакса 6,0-10,0 л/т Тедут 6,0-8,0 кг/га Тедут ПРО 2,0-5,0 л/т												
2 Широкий спектр бур'янів	Ізопропіламінна сіль гіфосату, 480 г/л Капінна сіль гіфосату, 550 г/л Капінна сіль гіфосату, 663 г/л (540 г/л у високотому еквіваленті) Глюфосинат амонію, 200 г/л		Напалм 2,0-6,0 л/га Напалм Фортез 1,0-6,0 л/га Напалм Супер 2,0-3,5 л/га Фосфор 1,5-2,0 л/га											
3 Однорічні злакові та дводольні	Пропізохлор, 360 г/л + тербутилазин, 190 г/л Пропізохлор, 720 г/л S-метолахлор, 960 г/л		Старпент 3,8-4,5 л/га Сорпа Нет 2,0-2,5 л/га Літерон 1,0-1,6 л/га											
4 Однодольні та дводольні бур'яни	Імазамокс, 40 г/л Імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л				Брокс 1,0-1,2 л/га Імпреза 1,0-1,2 л/га									
5 Однорічні та багаторічні злакові	Клетодим, 120 г/л Хізалофон-П-етил, 125 г/л					Блейд 0,4-1,8 л/га Харума 0,6-1,2 л/га								
6 Сині і листогризуучі шкідники	Альфа-циперметрин, 200 г/л Імідаклоприд, 700 г/кг Імідаклоприд, 300 г/л + лімбода-цигалотрін, 100 г/л Імідаклоприд, 200 г/л Емакетин бензоат 100 г/кг Флубенцидамід, 480 г/л Клотанінд, 200 г/л + лімбода-цигалотрін, 50 г/л Ацетаміприд, 200 г/кг Тіаклоприд, 240 г/л Тіаметоксам, 141 г/л + лімбода-цигалотрін, 106 г/л						Альтрон 0,05 – 0,1 л/га Бомбардир 45-60 г/га Бомбардир Дуо 0,15 – 0,25 л/га Бомбардир Аква 0,25 – 0,5 л/га* Простаф* 0,2 – 0,25 л/га				Кайрос 0,1-0,15 л/га		Кайрос 0,1-0,15 л/га	
7 Хвороби листя, стебла	Флутрафіофол, 250 г/л Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л Дифеноконазол, 250 г/л Пропіконазол, 250 г/л Ципроконазол, 80 г/л + метконазол, 60 г/л Цімоксанін, 300 г/кг + азоксистробін, 250 г/кг						Парацельс 0,5-0,6 л/га ДОІ 0,5 л/га Спліт 0,2-0,3 л/га Меценат 0,5 л/га				Камзоп Турбо 0,5-0,7 л/га			
8 Хвороби листя, стебла, кошика	Азоксистробін, 250 г/л Тіофанат-метил, 500 г/л Карбендазим, 500 г/л Дифеноконазол, 125 г/л + азоксистробін, 125 г/л							Ультраплін 0,3-0,5 кг/га						
9 Прилипачі	Модифікований полієфір тріполекс 85% + Аппілок-кісполіптиленгліколь 15%								Старк 0,8-1,0 л/га					
10 Десиканти	Дикват дібромід, 374 г/л Дикват, 150 г/л Ізопропіламінна сіль гіфосату, 480 г/л Глюфосинат амонію, 200 г/л								Сальто 1,2-1,4 л/га Абсолют 1,5 л/га Спліт Дуо 0,5-1,0 л/га				Диквалан Макс 0,8 – 1,2 л/га Диквалан 2,0-3,0 л/га Напалм 2,4 л/га Фосфор 1,0-2,0 л/га	

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦУКРОВИЙ БУРЯК

Шкодочинні об'єкти	Діюча речовина	Обробка насіння	Обприскування ґрунту до сібі, після сібі	Сходи (ВВСН 00-10)	Вилочка (ВВСН 10-11)	1-а пара листків (ВВСН 12)	2-3-я пара листків (ВВСН 14-16)	7-10 листків (ВВСН 17-20)	Зміцнення листків в ряду (ВВСН 31-39)	Зміцнення листків в мікрояді (ВВСН 41-49) - технічна стиглість	Повна технологічна стиглість (ВВСН 49) - збирання
Регулятор росту	Поліетиленгліколь-400, 1500 г/л + Поліетиленгліколь-1500, 540 г/л + Гумат натрію 3 г/л	Вертекс 0,5 л/га						Вертекс 0,5 л/га			
Комплекс ґрутових шкідників	Клотіандин, 600 г/л Тіаметоксан, 350 г/л Тефпутрін, 15 г/кг Тефпутрін, 200 г/л	Латіна 75-100 мл/тис.насін. Метакса 1,3-1,7 л/т Тефут 4,5-6,0 кг/га Тефут ПРО 14,0-20,0 кг/га									
Широкий спектр бур'янів	Калійна сіль гліфосату, 550 г/л Калійна сіль гліфосату, 663 г/л (540 г/л у кислотному еквіваленті)		Напалм Форте 1,0-6,0 л/га Напалм Супер 2,0-3,5 л/га								
Однорічні злакові та діяки дводольні	Метолахлор, 960 г/л Пропізохлор, 720 г/л S-метолахлор, 960 г/л		Дабл Трай 1,3-1,6 л/га Сора Нет 2,0-5,0 л/га Лігерон 1,0-1,6 л/га								
Однорічні злакові та дводольні бур'яні	Метамітрон, 700 г/л							Кушон 1,0-2,0 л/га			
Однорічні дводольні бур'яні	Тифлусульфурон-метил, 500 г/кг							Панголін 0,03 кг/га			
Однорічні дводольні та діяки злакові	Десмедіфам, 71 г/л + фенемедіфам, 91 г/л + етофумеаз, 112 г/л							Бетагард 1,0 л/га			
Однорічні та багаторічні злакові	Клетодим, 120 г/л Хізапоф-П-етил, 125 г/л							Блейд 0,4-1,8 л/га			
Однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові дводольні бур'яні	Клопірапід, 300 г/л							Харума 0,6-1,2 л/га			
Комплекс шкідників	Альфа-циперметрин, 200 г/л Імідаклоприд, 200 г/л Альфа-циперметрин, 200 г/л Імідаклоприд, 300 г/л + Лямбда-цигалотрин, 100 г/л Тіаметоксан, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л							Альтрон 0,05 – 0,1 л/га Бомбардір Аква 0,3 л/га* Престо 0,3 - 0,4 л/га Бомбардір Дуо 0,15 – 0,25 л/га Октант Турбо 0,2 – 0,25 л/га Твікс 0,8 л/га			
Спектр хвороб	Карбендазим, 500 г/л Тіофанат-метил, 500 г/л Флуотріафол, 250 г/л Пропіконазол, 250 г/л Ципроکоназол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л Діфеноконазол, 125 г/л + азоксистробін, 125 г/л							Абсолют 0,3-0,4 л/га Сальто 0,8-1,2 л/га Парацельс 0,25 л/га Меценат 0,5 л/га Дот 0,5 л/га Слітг Дуо 0,5-1,0 л/га			
Прилипачі	Модифікований поліефір трісілосан 85% + Алілок-споліетиленгліколь 15%							Супер-Мачо 0,1 л/га			

*Очікуємо на реєстрацію

СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАК

Шкодочинні об'єкти	Діюча речовина	Обробка насіння	Обприскування грунту до сібі, після сібі	Сходи (BBCH 00-11)	3-4 листки (BBCH 13-14)	5-7 листків (BBCH 15-17)	7-10 листків (BBCH 17-20)	Відновлення вегетації (Відростання) (BBCH 21-29)	Витягування стеблів (BBCH 31-39)	Вутонізація (BBCH 51-59)	Цвітіння (BBCH 61-69)	Формування стручків (BBCH 71-79)	Налім зерна (BBCH 75-89)	Повна спилість (BBCH 89-92)
Широкий спектр бур'янів	Ізопрополамініна сіль гліфосату, 480 г/л		Напалм 2,0-6,0 л/га Напалм Форте 1,0-6,0 л/га Напалм Супер 2,0-3,5 л/га											
	Капіна сіль гліфосату, 550 г/л													
	Капіна сіль гліфосату, 663 г/л (540 г/л у кислотному еквіваленті)													
Однорічні двводольні та злакові бур'яни	Кломазон, 480 г/л	Клаттер 0,15-0,2 л/га												
Комплекс ґрунтових шкідників	Тефлутрин, 15 г/кг													
Однорічні злакові та деякі двводольні	Метолахлор, 960 г/л	Дабл Трай 1,3-1,6 л/га Сорб-НЕТ 2,0-3,0 л/га Літерон 1,6 л/га												
	Пропізохлор, 720 г/л													
	S-метолахлор, 960 г/л													
	Клопірапід, 300 г/л													
Однорічні та багаторічні злакові	Клетодим, 120 г/л									Блейд 0,4-1,8 л/га				
	Хізалофоп-П-етил, 125 г/л													
Спектр сисних і гризучих шкідників до цвітіння	Альфа-циперметрин, 200 г/л									Альтрон 0,05 – 0,1 л/га				
	Альфа-циперметрин, 100 г/л													
	Імідаզопрід, 300 г/л + Лямбда-цигалотрин, 100 г/л													
	Емамектин бензоат 100 г/кг													
	Тіаметоксан, 141 г/л + лімноф-цигалотрин, 106 г/л													
	Лямбда-цигалотрин, 50 г/л													
Спектр сисних і гризучих шкідників до цвітіння, в тому числі прихованіх	Хлорпіріфос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л									Твікс 1,0 – 1,1 л/га				
	Клотанідин, 200 г/л + лімбда-цигалотрин, 50 г/л													
Спектр гризучих шкідників під час цвітіння	Тіаклопрід, 240 г/л									Престо 0,3-0,4 л/га				
	Ацетаміпрід, 200 г/кг													
	Флубендіамід, 480 г/л													
Ріст, регуляція та спектр хвороб	Карбендазим, 500 г/л								Кайрос 0,1-0,15 л/га	Абсолют* 0,6 л/га				
	Тебуконазол, 250 г/л													
	Метконазол, 60 г/л													
	Ципроконазол, 80 г/л + метконазол, 60 г/л													
	Дифеноконазол, 125 г/л + азоксистробін, 125 г/л													
Десиканти	Дикват дібромуїд, 374 г/л								Талер 0,5-1,0 л/га					
	Глюфосінат амоній, 200 г/л													
Прилипачі	Модифікований поліефір тріполексан 85% + Аллілок-споліметиленгіпоколь 15%								Камзол 0,75-1,25 л/га					
									Супер-Мачо 0,1 л/га					
									Диквалан макс 0,8 – 1,2 л/га					
									Фосинор 2,0-3,0 л/га					

*Очікуємо на реєстрацію

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЯ

Шкодочинні об'єкти	Діюча речовина	Обробка насіння	Обприскування групу до сівб., після сівб.	Сходи (ВВСН 100-10)	1-й трійчастий (ВВСН 13)	3-й трійчастий (ВВСН 15)	Глукования (ВВСН 20-29)	Стеблування (ВВСН 30-49)	Бутонізація (ВВСН 50-59)	Цвітіння (ВВСН 60-65)	Утворення бобів (ВВСН 66-70)	Налив (ВВСН 71-79)	Повна стиглість (ВВСН 85-89)	
Комплекс ґрунтovих шкдників	Тіаметоксам, 350 г/л Тефултрин, 15 г/кг Флудіоксоніл, 25 г/л	Метакса 1,3-1,7 л/т Фебут 6,0-8,0 кг/га Фуксія* 1,25 л/т												
Широкий спектр бур'янів	Ізопропіламінна сіль гілфосату, 480 г/л Капіана сіль гілфосату, 550 г/л Капіана сіль гілфосату, 663 г/л (540 г/л у кислотному еквіваленті) Гліофоснат амонію, 200 г/л		Напалм 2,0-6,0 л/га Напалм Форте 1,0-6,0 л/га Напалм Супер 2,0-3,5 л/га Фоснор 1,0-2,0 л/га											
Однорічні дводольні та злакові бур'яні	Кломазон, 480 г/л			Клаттер 0,2 л/га										
Однорічні дводольні та деякі злакові	Метрибузин, 600 г/л			Магар 0,5-0,75 л/га										
Однорічні злакові та деякі дводольні	Пропізохлор, 720 г/л Пропізохлор, 360 г/л + тербутилазин, 190 г/л S-метолахлор, 960 г/л			Сора-НЕТ 2,0-3,0 л/га Старпінг 3,8-4,5 л/га Літерон 1,0 - 1,6 л/га										
Однорічні дводольні	Бентазон, 480 г/л				Бантен 1,5-3,0 л/га									
Однорічні злакові та дводольні	Імазамокс, 40 г/л S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л		Новант 3,5-4,5 л/г			Брокс 0,75-1,0 л/га								
Однорічні та багаторічні злакові	Клетодим, 120 г/л Хізалофоп-П-етил, 125 г/л					Блейд 0,4-1,8 л/га Харума 0,6 – 1,2 л/га								
Комплекс шкдників	Альфа-ципремтрин, 200 г/л Імідацлоприд, 300 г/л + Іяміда-цигалотрін, 100 г/л Імідацлоприд, 200 г/л Тіаметоксам, 250 г/кг Тіаметоксам, 141 г/л + пляміба-цигалотрін, 106 г/л Ацетаміприд, 200 г/кг Флубендинамід, 480 г/л					Альтрон 0,05 – 0,1 л/га Бомбардир Дуо 0,15 – 0,25 л/га Бомбардир Аква 0,25 – 0,3 л/га* Октант 0,1-0,15 кг/га Октант Турбо 0,2 – 0,25 л/га					Атік 0,1-0,12 кг/га Кайрос 0,1-0,15 л/га		Кайрос 0,1-0,15 л/га	
Павутинний кліщ	Феніркосміт, 50 г/л						Міральд 0,7-1,15 л/га							
Комплекс хвороб	Азоксистробін, 250 г/л Карбендазим, 500 г/л Тіофанат-метил, 500 г/л Флуторіафол, 250 г/л Ципроконазол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л Пропіконазол, 250 г/л Тебуконазол, 250 г/л Ципроконазол, 80 г/л + метоконазол, 60 г/л Дифеконазол, 125 г/л + азоксистробін, 125 г/л Цімоксан, 300 г/кг + азоксистробін, 250 г/кг					Старк 0,6-0,8 л/ра Абсолют 0,5-0,7 л/га Сальто 1,0-1,4 л/ра Парацельс 0,5 л/га Дот 0,5 л/га Меценат 0,5 л/га* Талер 0,5-0,75 л/га Камозіл Турбо 0,5-0,7 л/га Спліт Дуо 0,5-1,0 л/га					Старк 0,6-0,8 л/ра Парацельс 0,5 л/га Дот 0,6 л/га Меценат 0,5 л/га* Талер 0,5-0,75 л/га			
Прилипачі	Модифікований поліїфір тріспіоксан 85% + Аппілок сполустиленінгікілік 15%						Ультрапін 0,3-0,5 кг/га				Супер-Мачо 0,1 л/га			
Десиканти	Капіана сіль гілфосату 663 г/л (540 г/л у кислотному еквіваленті) Дікват, 150 г/л Дікват дібромуїд, 374 г/л Гліофоснат амонію, 200 г/л											Напалм Супер 2,4 л/га Діквалан 2,0-3,0 л/га Діквалан Макс 0,8-1,2 л/га Фоснор 1,0-2,0 л/га		

*Очікуємо на реєстрацію



ВНЕСЕННЯ ЗЗР ДРОНАМИ +380 (67) 613 46 75

Надійним партнером для аграріїв є компанія LNZ Group та її бренд DEFENDA, команда якого вже понад 7 років займається впровадженням сучасних технологій, які застосовуються в сільськогосподарській галузі.

ЗБІЛЬШІТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОБІЗНЕСА З ВИКОРИСТАННЯМ ДРОНІВ

DEFENDA надає професійні послуги з внесення дронами:

- всієї лінійки агропрепаратів
- всіх видів біозахисту

А також повний агроконсалтинг із використанням високотехнологічного обладнання для досягнення максимальної ефективності в агропроцесі.

Застосування дронів у сільському господарстві дає широкі можливості для реалізації складних завдань щодо планування та реалізації більшості сільськогосподарських робіт

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

- Зменшення витрат робочої речовини у 30 разів у порівнянні із класичними методами внесення
- Економія води та зменшення витрат ЗЗР
- Внесення у важкодоступних місцях.
- Зниження впливу фіtotоксичності завдяки точковій обробці проблемних ділянок
- Висока швидкість роботи
- Максимальна точність внесення
- Широкий діапазон погодних умов
- Мінімальне залучення матеріально-технічних та людських ресурсів



ЕКОНОМТЕ ЗЗР ІЗ ВНЕСЕННЯМ ДРОНАМИ

МИ ПРОПОНОУЄМО



Внесення ЗЗР

Вносимо дронами гербіциди, інсектициди та фунгіциди.

Внесення добрив

Вносимо добрива: мінеральні, комплексні, органо-мінеральні, гумати.

Десикація


Проводимо десикацію перед збором врожаю. Висота культури для внесення значення немає

ЕТАПИ РОБОТИ



Ми пропонуємо повний цикл: від розробки технології захисту до внесення ЗЗР дронами на полі.

Наша команда має багаторічний досвід використання усіх видів БПЛА, професійно оперуючи цими інструментами для виконання низки завдань в агробізнесі.



DEFENDA

ГЕНЕРУЄМО НОВИЙ ЗАХИСТ

Сучасна лінійка спеціальних добрив DEFENDA розроблена для забезпечення рослин поживними речовинами (мікро- та макроелементами, в тому числі збагачено органічними компонентами, такими як амінокислоти, екстракти водоростей та інші) для листкового живлення та обробки насіння.



- Добрива DEFENDA створювались для швидкого і ефективного подолання та профілактики дефіциту елементів живлення, а також забезпечення широкої антистресової дії на рослину. Кожен продукт з лінійки виробляється з використанням високоякісних сировинних компонентів для безпечної та ефективного використання в рослинництві.
- Композиції для обробки насіння спеціально розроблено, щоб забезпечити рівномірне покриття насіння поживними та біологічно активними речовинами для стимулювання раннього росту коренів, швидкого та енергійного розвитку рослин. Як результат, коріння та проростки стають здоровішими та менш вразливими до холоду, морозу чи пошкодження внаслідок інших абіотичних стресів.
- Препарати для листового живлення представлено як комплексними марками для збалансованого живлення рослин, так і монопрепаратами для швидкої корекції нестачі окремих мікроелементів (зокрема, бору та цинку), а також добривами-біостимуляторами на основі амінокислот, екстрактів морських водоростей та інших органічних компонентів, що мають антистресову дію.



Застосування добрив DEFENDA є незамінним елементом сучасної технології вирощування с/г культур та дає агрономам надійну опору для досягнення стабільних показників врожаю найвищої якості.

DEFENDA MAKRO
Універсальне добриво

N	P ₂ O ₅
K ₂ O	MgO
SO ₄	B
Fe	Mn
Cu	Zn
Mn	Mo
Ni	

Defenda.com.ua

9 ПРОДУКТІВ

для збалансованого живлення рослин:

від насіння до збору врожаю

1	НАСІННЯ	підвищує енергію проростання та польову схожість рослин.
2	МАКРО	усуває дефіцит фосфору і калію у тканинах рослин, сприяє формуванню природної стійкості до ураження патогенами.
3	МІКРО	універсальне комплексне добриво, що ефективно забезпечує фізіологічні потреби рослин в мікроелементах, стимулює біохімічні процеси та підвищує стресостійкість.
4	АМІНО	комплексне добриво антистресант з високою концентрацією амінокислот рослинного походження.
5	АСКО ГУМАТ	рідкий висококонцентрований біостимулятор широкого спектру дії на основі гумату калію, що підвищує поглинання поживних речовин, стимулює ріст коренів та вегетативної маси.
6	БОР	стимулює запилення, забезпечує міцність клітинних стінок, покращує транспорт цукрів, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів навколошнього середовища.
7	ЦИНК	посилює посухо-, жаро- і холодостійкість.
8	19-19-19 + МЕ	забезпечує потреби молодих рослин у мінеральному живленні і позитивно впливає на ріст та розвиток вегетативної маси.
9	13-40-13 +МЕ	стимулює ріст кореневої системи, сприяє кращому засвоєнню рослинами води і азотних добрив.

За додатковою інформацією щодо мікродобрив DEFENDA звертайтеся до регіонального представника компанії у вашому регіоні.



LNZ
GROUP

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



LNZ Group — український вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг, що спеціалізується на торгівлі посівним матеріалом та засобами захисту рослин, вирощуванні зернових та технічних культур, тваринництві й зернотрейдерській діяльності. Утворений на базі Лебединського насіннєвого заводу.

Компанія розвиває агровиробництво, насінництво та дистрибуцію. Обробляє понад 90 тис. га землі та має більш як 3 тис. працівників у сезон. До складу LNZ Group входять 85 агрофірм, а також спеціалізований завод по виробництву кукурудзи, багатофункціональний завод по виробництву насіння пшениці, ячменю, гороху, сої, соняшнику, льону, спельти, 2 елеватори в Черкаській та Сумській областях, 5 логістичних центрів та власний митний склад.



Lnz.com.ua



LNZ-AGRO — один із найефективніших національних агрохолдингів, що входить у ТОП-25 найбільших латифундистів України.

Земельний банк LNZ Group налічує понад 90 тис. гектарів оброблюваної землі, що розподілені на 4 виробничо-територіальні кластери.


Диверсифіковане розміщення земельного банку, чітка структура управління, розвинена логістична інфраструктура та високий професіоналізм працівників дозволяють компанії бути серед лідерів аграрного ринку за показниками економічної ефективності EBITDA. Компанія є визнаним лідером аграрного ринку України з виробництва насіння зернових і технічних культур. Компанія має найбільші в Україні площини з вирощування гібридної кукурудзи та соняшнику, включно з площами під поливом. Понад п'ять років співпрацює з провідними мультинаціональними компаніями-виробниками насіння, що є свідченням професійного та відповідального ставлення нашого агрохолдингу до своїх партнерських зобов'язань.



LNZ-MARKET — компанія національного маштабу, що входить у ТОП-5 дистрибуторів насіння та засобів захисту рослин в Україні.

Діяльність компанії поширюється майже на всю територію України із пропозицією комплексної технології (насіння+ЗЗР) та охоплює 10 логістичних центрів, 20 регіональних представництв (офісів) та 150 менеджерів з продажу. Компанія налічує більше, ніж 4 тисячі активних клієнтів з усієї України.

LNZ-MARKET — компанія, що найбільш динамічно зростає за обсягом продажу протягом останніх 5-ти років.



LNZ-PRODUCT — виробничий напрям бізнесу LNZ Group, історично «ядро» всієї компанії LNZ Group. Це два сучасні насіннєві заводи. Наш основний принцип роботи — чітке дотримання технології та стандартів якості замовника. Понад 80 років досвіду виробництва насіння та сучасне технологічне обладнання є запорукою виробництва насіння найвищої якості. Ми входимо в ТОП-10 українських насінніх заводів з виробництва кукурудзи та вважаємо себе лідером з якості виробленого нами насіння.

LNZ-AGRO – оптимальне поєднання потенціалу українських чорноземів та сучасних технологій

понад

90 000 га землі



39,0

тис. га

Сумський кластер

38,3

тис. га

Шполянський кластер

3,1

тис. га

Вінницький кластер

9,6

тис. га

Черкаський
лівобережний кластер

понад

85 агрофірм

у Черкаській, Сумській та Вінницькій областях



3 500

працівників

в сезон



PRODUCT



Оптимальний вибір місця вирощування певного гібриду в залежності від ґрунтово-кліматичних умов



Диверсифікація ділянок гібридизації, що дає можливість мінімізувати ризики



Понад 10-ти річний досвід роботи з провідними міжнародними компаніями-селекціонерами – Pioneer, DEKALB, Syngenta, Limagrain, EURALIS, SAATBAU, Universeed

80
★★★

Понад 80-ти річний досвід заводського виробництва насіння, що передається поколіннями

2 СУЧАСНІ НАСІНЕВІ ЗАВОДИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЗАВОД із виробництва насіння кукурудзи

Продуктивність:

330 тонн/дoba

Обладнання:

PETKUS, A&K Development Company, Tecflam, IPE Steuerungstechnick, KAMAS Westrup, Simotek

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗАВОД

ПЕРША ЛІНІЯ: виробництво насіння пшениці, ячменю, гороху, сої, соняшнику

Продуктивність:

150-200 тонн/дoba

ДРУГА ЛІНІЯ: виробництво насіння льону, коріандру, спельти, інших культур

Продуктивність:

75 тонн/дoba

Виробнича лінія:

первинна очистка, калібрування, проправлення

Обладнання:

KAMAS Westrup, Cimbria, JK Machinery





MARKET

22

області

20


представництв

150+

менеджерів

клієнтів

4000+



10

логістичних
центрів

1

митний
склад

260+

вагонів-
зерновозів



UNIVERSEED

світовий досвід насінництва

LNZ Group представляє власний бренд кукурудзи силосного та зернового напрямків.

UNIVERSEED, який об'єднує найкращий світовий досвід з місцевими знаннями. Ми вибираємо кращу генетику з Північної Америки і досліджуємо її через суворий процес перевірки та відбору на місцях в Україні. Ця унікальна програма дозволяє розповсюджувати всесвітньо відому генетику на українських землях.

Раді представити вам високопродуктивні зернові гібриди та силосні гібриди Leafy та Leafy-Floury типу.

Зернові гібриди створювалися для умов складного фітосанітарного стану з високою шкодочинністю хвороб і шкідників, тож характеризуються стійкістю проти різних видів гельмінтоспорозів, іржі, фузаріозу стебла і качанів тощо

Силосні гібриди пройшли перевірку на відповідність суворим вимогам відносно агротехнологічних характеристик для молочного та м'ясного тваринництва. Основна перевага силосних гібридів – додаткове листя: зверху качана налічується 10-12 листків. А також, на відміну від зернових, вони мають набагато ширшу листову пластинку, різниця складає 2-3 см. Серед інших їхніх переваг – бездоганний баланс між ефективною клітковиною та засвоюваною масою, якісний крохмаль, що краще розщеплюється в рубці, й унікальні агрономічні властивості, що високо цінуються в молочній промисловості, як-от висока загальна врожайність і тривалі періоди жнив.

Ми переконані, що ексклюзивні гібриди **UNIVERSEED** – новий крок в розвитку насіннєвої галузі в Україні.




ГЕНЕТИКА ТА ДОСВІД

Генетика та досвід канадських фермерів від American North Plant Genetic



БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ

Налагоджена логістика та злагоджена взаємодія. Власний насіннєвий завод



СИНЕРГІЯ БІЗНЕСІВ

Синергія бізнесів двох країн стала запорукою створення нового бренду





LEGEND
seeds

LNZ Group під брендом **LEGEND** пропонує **5 найоптимальніших сортів озимої пшениці**, адаптованих під різні ґрунтово-кліматичні умови.

 **ЛНЗ Лайт** — середньоранній сорт з раннім відновленням вегетації, пластичний, підходить для всіх типів ґрунтів.

 **ЛНЗ Протект** — середньостиглий сорт з пізнім відновленням вегетації, вимогливий до ґрунтів, з інтенсивним коефіцієнтом кущення, призначений для інтенсивної технології вирощування.

 **ЛНЗ Голден Філд** — середньоранній сорт з раннім відновленням вегетації, пластичний, підходить для всіх типів ґрунтів.

 **ЛНЗ Кваліті** — середньостиглий сорт з середнім відновленням вегетації, вимогливий до ґрунтів, з інтенсивним коефіцієнтом кущення, призначений для інтенсивної технології вирощування.

 **ЛНЗ Стенд** — середньостиглий сорт озимої пшениці, що характеризується високою продуктивністю. Ідеально адаптований до умов вирощування у зонах степу, лісостепу та полісся.






LEGEND

seeds

LEGEND – це private label (власний бренд) компанії **LNZ Group**, яка бере на себе розробку та контроль над виробництвом і якістю продукту.

Ми пильно контролюємо виробництво всіх гібридів і тестуємо на власних полях. Це є запорукою незмінної якості продукції бренду **LEGEND**. В ексклюзивне використання **LNZ Group** увійшли декілька перевірених часом та досвідом гібридів кукурудзи та соняшнику, які виходять під брендом **LEGEND**.

LNZ Group та компанія **Syngenta** співпрацюють вже не один рік. До портфеля **LEGEND** ексклюзивно входять зерновий гібрид кукурудзи **НК ТЕРМО** (ФАО 330) та середньоранній гібрид соняшнику **СИ ЧРОНОС**. А також зерновий гібрид кукурудзи **ДК 315** (ФАО 310), що є результатом співпраці з компанією Bayer. Він є одним із найпопулярніших у продажі гібридів зернової кукурудзи серед аграріїв.





Оптимальні рішення для посівної: партнерство LNZ Group та компанії Лімагрейн

Сучасний аграрний сектор вимагає найефективніших рішень для забезпечення стабільної врожайності та отримання високоякісної продукції с/г культур. І саме тому ми обрали найкращі варіанти у вирощуванні озимого ріпаку та пропонуємо вам високоякісне насіння цієї культури у партнерстві з визнаним лідером у галузі рослинництва – компанією Лімагрейн.

Обрані гібриди: висока врожайність та стійкість до хвороб

Для вас ми обрали 3 найкращі гібриди озимого ріпаку, що відзначаються найвищою врожайністю та стійкістю до розтріскування, фомозу та кили

капусти. Серед них: «Акапулько», «Аляско» та «Астроном». Ці гібриди вже довели свою ефективність та є стабільним вибором для аграріїв, які прагнуть отримувати стабільні та якісні врожаї.

Спільна Місія

Партнерство між LNZ Group та компанією Лімагрейн - це крок вперед для аграрної сфери. Об'єднуючи знання, досвід та передові технології, ми даємо можливість вам отримати професійну підтримку від компаній з багаторічним досвідом.

Більше якості, більше продуктивності - разом досягаємо найкращих результатів у вирощування озимого ріпаку!



LNZ hub

LNZ Hub – це унікальна технологічна платформа, яка дозволяє наочно продемонструвати технології, продукти та гібриди, які використовуються на полях LNZ Group, а також новітні агротехнічні розробки, які дозволяють розкрити максимальний потенціал врожайності.

Мета технологічної платформи - показати особливості технології захисту польових культур від бренду **DEFENDA**, а також продемонструвати лінійку зернових та силосних гібридів **UNIVERSEED**.


Для того, щоб аграрії не допускали типових помилок та отримували стабільні прибутки - в рамках проекту "Краш тест" ми демонструємо, що може статися з посівами, якщо не дотримуватись рекомендованих норм, термінів та інших технологічних прийомів.



На демонстраційних полях платформи нашими фахівцями проводяться досліди, щоб ще краще і глибше вивчити продукти компанії, різні норми й суміші захисту DEFENDA.




Практичне представ-
лення ексклюзивної
технології LNZ на
полях



Демонстрація влас-
ного досвіду ведення
бізнесу



Індивідуальний підхід
до кожного клієнта з
будь-якого регіону



Надання повного па-
кету послуг: від насін-
ня до врожаю



Результати наших дослідів ви можете подивитися у форматі online на YouTube-каналі 231
(переходьте за допомогою QR-кода на сторінці)



231



ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ **1944**

Шполянський завод продтоварів — підприємство, яке спеціалізується на виробництві різних харчових продуктів і переробленню сільськогосподарської продукції. Виготовляє продукцію під торговельними марками «Жайвір», «Чіпси Золотисті» та «Хрустата Потата».



Виробничі потужності та складські приміщення знаходяться за адресою:
Черкаська область, м. Шпола,
вул. Соборна, буд. 87

Загальна площа



15 000м²





**ЗОЛОТИСТІ
ЧІПСИ**

**ХРУСТАТА
ПОТАТА**

У 2001 році Шполянським заводом продтоварів було засновано торговельну марку «Жайвір» – найсолодшу марку виробника, яка поєднала в собі смачні східні солодощі та корисні смаколики.

*І солодке буває
корисним!*

Чіпси Золотисті розпочинають свою історію з 1991 року - саме в цей час Шполянський завод продтоварів починає виготовляти перші в Україні картопляні чіпси-пластинки.

**ЗОЛОТИСТІ - ТІ САМІ ЧІПСИ З ЛЕВОМ!
СПРАВЖНІ, КАРТОПЛЯНІ!**

У 2010 році Шполянським заводом продтоварів було засновано торгівельну марку Хрустата Потата - під якою виготовляють найхрумкіші картопляні снеки в Україні!

**ХРУСТАТА ПОТАТА—
НЕ СТРИМУЙ СВІЙ ХРУСЬ!**



shpolazpt.com



233

350
тис. тон

можливість
одночасного зберігання
на власних елеваторах

Напрямок **LNZ Trade** на постійній основі проводить закупівлю: зернових та олійних культур, а також рослинних олій. За роки успішної роботи наша компанія зарекомендувала себе як відповідального і сумлінного партнера для сільгоспвиробників та компаній посередників. Наразі ми займаємося експортом зернових в країни Азії, Близького Сходу, Європейського союзу, Туреччини, Китаю. Нашиими клієнтами є найбільші світові аграрні корпорації та кінцеві покупці в країнах-імпортерах, лідери в своїх галузях бізнесу. Річний об'єм торгівлі сягає 2 млн. т.

Ми прагнемо задовольнити запити наших клієнтів високоякісним, високопрофесійним консультативним супроводом та побудувати з кожним взаємовигідні партнерські відносини.

I. КУЛЬТУРА

кукурудза
пшениця
ячмінь
соя
соняшник
ріпак
соняшникова
олія

II. КІЛЬКІСТЬ

EXW - від 300 т
DAP - від 500 т
FCA – від 280 т

III. ВАЛЮТА

UAH
USD
EUR

IV. ТЕРМІН ПОСТАВКИ

договірний,
укладаємо як
спотові, так
і форвардні
контракти.

V. ЗАКУПІВЛЯ НА УМОВАХ

EXW (лінійні елеватори)
DAP (порти Миколаєва,
Одеси)
FCA (завантажено на
вагон або авто)

VI. ОПЛАТА

Протягом 3-х банківських
днів.
Є різноманітні програми
фінансування.

VII. ЦІНОВІ ІНДИКАЦІЇ

на підставі розсилок
Telegram - [https://t.me/
LNZgroupp](https://t.me/LNZgroupp)

Окрім фіксованої ціни ми пропонуємо нашим клієнтам набір торгових інструментів, що забезпечує прив'язку ціни контракту до світових біркових котирувань.



LNZ Energo - напрямок діяльності, який включає повний спектр послуг з продажу мінеральних добрив, природного газу та електроенергії. Завдяки можливостям LNZ пропонувати повний комплекс послуг з постачання електроенергії, природного газу, мінеральних добрив, насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, все більш компаній зацікавлені у довгостроковій співпраці з LNZ по всім цим напрямкам, отримуючи при цьому не тільки необхідний товар, але і додаткові знижки, бонуси, програми лояльності з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей кінцевих споживачів.



МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Команда LNZ Energo зосередилася на постачанні азотної групи добрив (аміачна селітра, вапняково-аміачна селітра, карбамід та КАС) українського виробництва. Також пропонуємо добрива фосфорної група (суперфосфат, аммофос, NPK, тощо).

Завдяки широкому асортименту продукції та індивідуальному підходу до кожного клієнта компанія стабільно щороку продає до 200 000 т мінеральних добрив.



ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

LNZ з 2019 року здійснює оптовий продаж електричної енергії постачальникам енергоресурсів, трейдерам та кінцевим споживачам. За 2 роки роботи на ринку продажу електроенергії компанія змогла наростили обсяг продажів до 12 млн кВт- год на місяць і пропонує ресурс споживачам у всіх регіонах України. Компанія зацікавлена у тому, щоб запропонувати кінцевому споживачу електроенергію за найвигоднішими умовами та найбільш привабливою ціною. Власні методи дозволяють компанії LNZ досягти такого результату за допомогою балансування та прогнозування в режимі 24/7, гнучких умов оплати та комплексу супутніх послуг.



ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Компанія отримала ліцензію на постачання газу споживачам у квітні 2019 року. Основні клієнти компанії LNZ – аграрні підприємства (цукрові заводи, хлібоприймальні підприємства, елеватори), але наша компанія не обмежується виключно аграрним сектором. Ми пропонуємо свої послуги з продажу газу всім споживачам, у тому числі і промисловим.

Завдяки можливостям LNZ пропонувати повний комплекс послуг з постачання електроенергії, природного газу, мінеральних добрив, насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, все більш компаній зацікавлені у довгостроковій співпраці з LNZ по всім цим напрямкам, отримуючи при цьому не тільки необхідний товар, але і додаткові знижки, бонуси, програми лояльності з урахуванням індивідуальних потреб.



ЗАВОД ПО ЗАМОРОЗЦІ ФРУКТІВ, ЯГІД ТА ОВОЧІВ

Завод здатен заморожувати понад 20 видів продукції, серед якої:

Ягоди: полуниця, малина, смородина, порічка, бузина, чорниця, журавлина

Фрукти: абрикос, слива

Овочі: кукурудза, перець, цибуля, гарбуз, морква, томат, броколі, горошок, баклажан, кабачок


Вся продукція на заводі **Tevitta** заморожується за технологією шокової заморозки (IQF).

Завод побудований за останніми тенденціями новітніх технологій в 2021 році, та має змогу переробляти близько 10 тис/т за рік.

Завод має сучасне технологічне обладнання від провідних виробників, таке як: Inshida, FAM, Pollak, GEA, PIGO, MEGA. А також камеру шокової заморозки Unidex та оптичний сортувальник Sortex від компанії Buhler.

Склади підприємства розраховані на більше **10 тис.палетомісць**.

А також надає послуги по виготовленню **Private Label**.



tevitta.com

НОТАТКИ



Контакти DEFENDA

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН

Керівник регіонального структурного підрозділу	Андрій Лимарь	+38(050) 328 50 35 +38(068) 328 50 35
--	---------------	--

Підгрупа збуту м. Вінниця, м. Умань

Керівник підгрупи	Андрій Лимарь	+38(050) 328 50 35 +38(068) 328 50 35
-------------------	---------------	--

Підгрупа збуту м. Житомир

Керівник підгрупи	Андрій Гебрич	+38(066) 250 17 53
-------------------	---------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Луцьк, м. Рівне, м. Львів

Керівник підгрупи	Ольга Ткачук	+38(067) 334 74 30
-------------------	--------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Хмельницький

Керівник підгрупи	Єгор Топалян	+38(050) 448 48 36
-------------------	--------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Тернопіль, м. Чернівці, м. Івано-Франківськ

Керівник підгрупи	Анатолій Енгельберг	+38(063) 740 00 73
-------------------	---------------------	--------------------

ЦЕНТРАЛЬНО-ПІВДЕННИЙ РЕГІОН

Керівник регіонального структурного підрозділу	Анатолій Кулінічев	+38(050) 527 99 99
--	--------------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Київ і Київська обл.

Керівник підгрупи	Геннадій Сорокуров	+38(050) 523 87 53
-------------------	--------------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Чернігів

Керівник підгрупи	Ігор Кальченко	+38(050) 424 60 29
-------------------	----------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Суми

Керівник підгрупи	Анатолій Кулінічев	+38(050) 527 99 99
-------------------	--------------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Кропивницький

Керівник підгрупи	Павло Копиця	+38 (050) 442 34 29
-------------------	--------------	---------------------

Підгрупа збуту м. Первомайськ

Керівник підгрупи	Павло Копиця	+38 (050) 442 34 29
-------------------	--------------	---------------------

Підгрупа збуту м. Одеса

Керівник підгрупи	Сергій Крихтін	+38(095) 288 58 68
-------------------	----------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Кривий Ріг

Керівник підгрупи	Андрій Золін	+38(067) 569 83 13
-------------------	--------------	--------------------

СХІДНИЙ РЕГІОН

Керівник регіонального структурного підрозділу	Олександр Бутенко	+38(050) 448 53 80
--	-------------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Дніпро

Керівник підгрупи	Олег Кімліченко	+38(095) 288 58 77
-------------------	-----------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Покровськ (Донецької області)

Керівник підгрупи	Олександр Бутенко	+38(050) 448 53 80
-------------------	-------------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Полтава

Керівник підгрупи	Олександр Бутенко	+38(050) 448 53 80
-------------------	-------------------	--------------------

Підгрупа збуту м. Харків

Керівник підгрупи	Олександр Зуєв	+38(095) 282 87 80
-------------------	----------------	--------------------

Контакти LNZ Group

Центральне регіональне представництво (Черкаська)	Вадим Пшенишний	+38 (067) 473 30 40
Київське регіональне представництво (Чернігівська, Київська)	Микола Щербина	+38 (067) 474 21 93
Тернопільське регіональне представництво (Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська)	Микола Юськів Ігор Руденький	+38 (097) 921 69 07 +38 (098) 351 17 84
Львівське регіональне представництво (Львівська, Волинська, Рівненська)	Петро Кривішин	+38 (067) 670 16 18
Хмельницьке регіональне представництво (Хмельницька)	Микола Юськів	+38 (097) 921 69 07
Уманське регіональне представництво	Олег Гриценко	+38 (097) 392 20 31
Кіровоградське регіональне представництво (Кіровоградська)	Олександр Міщенко	+38 (068) 370 36 65
Сумське регіональне представництво (Сумська)	Олександр Кащенко	+38 (097) 689 62 23 +38 (067) 470 11 07
Житомирське регіональне представництво (Житомирська)	Ярослав Юдін	+38 (067) 47 344 76
Харківське регіональне представництво (Харківська)	Юрій Задорожний	+38 (067) 790 44 12
Миколаївське регіональне представництво (Миколаївська)	В'ячеслав Баранюк	+38 (067) 511 32 07
Полтавське регіональне представництво (Полтавська)	Дмитро Сипко	+38 (066) 997 53 15 +38 (096) 268 57 22
Херсонське регіональне представництво (Херсонська, Запорізька)	Андрій Ветчанін	+38 (067) 521 78 50
Одеське регіональне представництво (Одеська)	Юрій Красіков	+38 (067) 470 54 29
Дніпропетровське регіональне представництво (Дніпропетровська, Донецька, Луганська)	Андрій Ветчанін	+38 (067) 521 78 50
Вінницьке регіональне представництво (Вінницька)	Олександр Келіп	+38 (096) 636 84 15

Агродепартамент LNZ Group


Директор Агродепартаменту LNZ Group	Олександр Хмелюк	+38 067 553 39 30
Західний регіон (Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська)	Юрій Нестерук	+38 067 233 52 47
Північно-Центральний регіон (Київська, Чернігівська)	Юрій Баранчук	+38 097 649 18 20
Центральний регіон (Кіровоградська, Черкаська)	Валентин Видибура	+38 098 515 99 02
Східний регіон (Полтавська)	Віталій Брашован	+38 067 339 50 08
Східний регіон (Харківська)	Сергій Уваров	+38 097 935 57 35
Південно-Східний регіон (Дніпропетровська, Луганська, Донецька)	Сергій Корнюшенко	+38 067 233 52 51
Південний регіон (Одеська, Миколаївська)	Олександр Котигора	+38 067 515 65 77
Менеджер з агротехнологій	Сергій Вовк	+38 067 547 04 54

Агродепартамент бренду DEFENDA

Керівник Агродепартаменту бренду DEFENDA	Валерій Волошин	+38 095 282 95 54
Менеджер з агротехнологій по засобам захисту рослин	Юрій Жеребко	+38 050 334 92 61
Менеджер з агротехнологій по засобам захисту рослин	Віктор Сонець	+38 050 329 28 07
Менеджер з агротехнологій по засобам захисту рослин	Євген Галенко	+38 050-424-99-70



<https://defenda.com.ua/>



DEFENDA

ГЕНЕРУЄМО НОВИЙ ЗАХИСТ