

ЕКСКЛЮЗИВНІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ






Шановні друзі, колеги, партнери!

Соняшник залишається однією з найприбутковіших культур для українських аграріїв. Для того, щоб запропонувати вам здорові, високоврожайні сорти насіння відмінної якості, компанія LNZ Group співпрацює з німецькою компанією Strube і є офіційним дистриб'ютором соняшнику Strube в Україні.

Strube — це іспанська генетика з німецькою якістю. Тобто селекція відбувається в Іспанії, виробляється по світу, а контроль якості проводиться в Німеччині, де серйозна науково-дослідницька база і контроль якості. Гібриди з лінійки соняшнику Strube пройшли ретельний відбір в умовах Іспанії. Було обрано найкращі за посухостійкістю, стійкістю до хвороб та з високим потенціалом. Надалі гібриди пройшли ґрунтовні випробування вже на теренах України.

Основний акцент в адаптації соняшників для українського ринку зроблено на посухо-, жаростійкості та стійкості до хвороб. Крім того, до цієї лінійки входять гібриди класичні, сульфо та пристосовані для вирощування за технологіями Clearfield і Clearfield Plus.

Лінійка соняшнику селекції компанії Strube представлена, гібридами. Цього сезону портфоліо поповнилося новими гібридами, з характеристиками яких можете ознайомитись у каталозі.



Floarea Soarelui
Подсолнечник
Слънчоглед
Соняшник
Napraforgó
Sunflowers
Ауціґеґі
Girasol



strube



Sunflower

سمنش لدا داسج • Слънчоглед
Girasol • Tournesol
Napraforgó • Floarea Soarelui
Подсолнечник • Ауціґеґі
Соняшник



strube



The Seed. Est. 1877

ЗМІСТ

Характеристика гібридів Штрубе	6
Районування гібридів соняшника	8
Класичні гібриди	
БАСКО ШТ	12
ОРФЕО ШТ	13
КІМЕРА СТ	14
СЕРЕЛІЯ	15
Гібриди для технології Сульфо	
ЦЕЛСО ШТ	16
ФАУСТО ШТ	17
МЕРО ШТ	18
Гібриди для технології Євролайтнінг та Євролайтнінг Плюс	
ФАБУЛО КЛП	17
КОНКВЕСТ	18
Високо-олеїновий гібрид для технології Євролайтнінг Плюс	
СОРЕС ШТ	20
МАРІСАН	22

ХАРАКТЕРИСТИКА

ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА

Технологія		КЛАСИЧНА			
Гібрид		БАСКО ШТ	ОРФЕО ШТ NEW	КІМЕРА СТ NEW	СЕРЕЛІЯ
Тип гібриду		Простий	Простий	Простий	Простий
Тип масла		Лінолевий	Лінолевий	Лінолевий	Лінолевий
Група стиглості		Ранньо-стиглий	Середньо-ранній	Середньо-ранній	Середньо-ранній
Стиглість (бал)		2	5	4	5
Сума активних температур (>10°C)		1680	1760	1740	1740
Вегетаційний період, днів		102-110	108 - 118	108 - 118	108 - 118
Цвітіння		Раннє	Середнє	Середньо-раннє	Середньо-раннє
Днів до цвітіння (50%)		63 - 68	67 - 72	67 - 72	67 - 72
Висота рослин, см		145 - 165	150 - 170	160 - 180	160 - 180
Кошик	Розмір, см	19 - 23	19 - 23	19 - 23	20 - 25
	Нахил 	3	2	2	4
Толерантність до хвороб та стресових факторів (бал)	Нахил	Напів-похилий	Напів-стоячий	Напів-стоячий	Похилий
	Гербіциду	- // -	- // -	- // -	- // -
	Посухо- жаростійкість	9	8	8	8
	Вилягання	9	9	8	8
	Обсипання	9	9	9	9
	Вовчок (Orobanchе)	F	F	G	G
	Несправжня борошниста роса (Pononospora)	9	8	9	9
	Гниль біла (Sclerotinia)	8	7	8	8
	Гниль сіра (Botrytis)	9	8	8	8
	Їржа (Pucinia)	7	8	8	7
Олійність, %	Фомоз (Phoma)	8	9	9	9
	Фомопсис (Phomopsys)	8	9	9	9
	Олійність, %	49 - 50	49 - 52	49 - 50	49 - 50
Вміст олеїнових кислот, %					
Натура, гр		370 - 400	380 - 430	420 - 450	420 - 450
Потенціал врожайності (бал)		9	8	8	8
Рекомендована густота рослин до збирання, тис.шт/Га	Недостатнє зволоження	50 - 55	45 - 50	50 - 55	50 - 55
	Оптимальне зволоження	55 - 60	50 - 55	55 - 60	55 - 60
	Достатнє зволоження та зрошення	60 - 65	55 - 60	60 - 65	60 - 65

Наведені дані можуть варіювати в залежності від зони та умов вирощування

СУЛЬФО			ЄВРОЛАЙТІНГ ПЛЮС (CLP)		ВИСОКО-ОЛЕЇНОВИЙ		
ЕЛСО ШТ	ФАУСТО ШТ	МЕРО ШТ	ФАБУЛО КЛП	NEW КОНКВЕСТ	NEW СОРЕС ШТ	NEW МАРІСАН	NEW САНФАЕР СЛ
Простий	Простий	Простий	Простий	Простий	Простий	Простий	Простий
Лінолевий	Лінолевий	Лінолевий	Лінолевий	Лінолевий	Олеїновий	Олеїновий	Олеїновий
Середньо-ранній	Середньо-ранній	Середньо-стиглий	Середньо-ранній	Середньо-ранній	Середньо-пізній	Середньо-ранній	Середньо-пізній
4	4	5	5	5	7	5	7
1740	1760	1820	1760	1760	1840	1760	1840
108 - 118	108 - 118	110 - 122	108 - 118	108 - 118	112 - 126	108 - 118	112 - 126
Середньо-раннє	Середнє	Середньо-раннє	Середнє	Середнє	Середнє	Середнє	Середнє
65 - 70	67 - 72	65 - 70	67 - 72	67 - 72	67 - 72	67 - 72	67 - 72
150 - 175	155 - 175	160 - 170	155 - 180	160 - 180	180 - 190	155 - 175	180 - 190
18 - 23	20 - 25	19 - 23	19 - 24	19 - 25	19 - 24	19 - 24	19 - 24
4	2	4	2	2	4	3	4
Похилий	Напів-стоячий	Похилий	Напів-стоячий	Напів-стоячий	Похилий	Напів-похилий	Похилий
SU	SU	SU	IMI+	IMI+	IMI+	-// -	IMI
8	8	8	7	8	7	8	7
7	9	9	8	8	7	8	7
9	9	9	9	9	8	9	8
F	E	F	E	E	E	G	E
8	8	9	8	9	9	9	7
7	7	7	8	8	9	8	9
7	9	9	9	9	8	9	8
8	8	8	8	9	9	9	9
8	8	8	7	8	8	8	8
8	8	8	7	8	8	8	8
48 - 51	50 - 53	49 - 53	48-52	48 - 54	47 - 49	49 - 50	47-50
					86 - 88	88	86-88
390 - 440	400 - 430	400 - 450	430 - 450	420 - 440	400 - 430	430 - 450	400-420
8	9	9	9	9	8	9	8
45 - 50	45 - 50	45 - 50	50 - 55	50 - 55	50 - 55	50 - 55	50 - 55
50 - 55	50 - 55	50 - 55	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60
55 - 60	55 - 60	55 - 60	60 - 65	60 - 65	60 - 65	60 - 65	60 - 65



РАЙОНУВАННЯ

ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА

Тип	Гібрид	Основні параметри				Стиглість	Сума активних температур (>10°C)	Зона районування		
		Стійкість до гербіциду	Тип масла	Стійкість до рас Вовчка	Стійкість до RM			Зона 1	Зона 2	Зона 3
Класичний	БАСКО ШТ	Hi	ЛО	A-F	RM2	2	1680			
	ОРФЕО ШТ	Hi	ЛО	A-F	RM2	5	1760			
	 КИМЕРА СТ	Hi	ЛО	A-G	RM9	4	1740			
	 СЕРЕЛІЯ	Hi	ЛО	A-G	RM9	5	1740			
Сульфо	ЦЕЛСО ШТ	SU	ЛО	A-F	RM2	4	1760			
	ФАУСТО ШТ	SU	ЛО	A-E	RM2	4	1760			
	МЕРО ШТ	SU	ЛО	A-F	RM2	5	1820			
Євролайтінг Плюс (CLP) ВО	ФАБУЛО КЛП	CLP	ЛО	A-E	RM9	5	1760			
	 КОНКВЕСТ	CLP	ЛО	A-E	RM9	5	1760			
	 МАРІСАН	Hi	простий ВО/НО	A-G	RM9	5	1760			
	СОРЕС ШТ	CLP	ВО	A-E	RM9	7	1840			
	 САНФАЕР СЛ	CLP	ВО	A-E	RM9	7	1840			

ЛО	Гібрид з вмістом лінолевої кислоти
ВО	Гібрид з високим вмістом олеїнової кислоти
RM9	Стійкість до Несправжньої борошнистої роси
SU	Стійкість до трибенурон - метилу
CL	Стійкість до імідазолінової групи (імазамокс 33 г/л + імазапір 15 г/л)
CLP	Стійкість до імідазолінової групи (імазамокс 16,5 г/л + імазапір 7,5 г/л)
Оцінка 1 - 9	9 - бальна система оцінки (1 - дуже рання, 9 - дуже пізня)



Кращі показники з вирощування по Зоні




Середні показники з вирощування по Зоні



Можливе вирощування, але з щільним супроводом

ПРІОРИТЕТНІСТЬ

СЕЛЕКЦІЇ В РАЙОНУВАННІ СОНЯШНИКА



ЗОНА 1 - Північна частина

- 1 Стабільність врожаю
- 2 Ранньостиглість (90 - 110 днів)
- 3 Стійкість до стресу, особливо холодостійкість
- 4 Вміст олій (олійність)
- 5 Тolerантність до Фомозу/Фомопсису, НБР
- 6 Стійкість до Вовчку (біля границь Зони 2)

ЗОНА 2 - Центральна частина

- 1 Високий потенціал та стабільність врожаю
- 2 Ранньостиглість (100 - 115 днів)
- 3 Вміст олій (олійність)
- 4 Адаптація під насичення соняшником в 2-3-річній сівозмінні
- 5 Тolerантність до Фомозу/Фомопсису, НБР, Склеротинії
- 6 Стійкість до Вовчку (раси F, G, H, інші)

ЗОНА 3 - Південна частина

- 1 Стабільність врожаю та Потенціал
- 2 Вміст олій (олійність)
- 3 Стійкість до посухи та Жаростійкість
- 4 Стійкість до Вовчку (раси A до H, інші)
- 5 Можливість вирощування на бідних та проблемних ґрунтах
- 6 Адаптація під насичення соняшником в 2-3-річній сівозмінні
- 7 Можливість використання No-Till, Min-Till
- 8 Тolerантність до Фомозу/Фомопсису, НБР, Склеротинії

БАСКО ШТ

КЛАСИЧНИЙ / ЛІНОЛЕВИЙ



- ✱ Найкращий ранньостиглий гібрид для жарких та посушливих умов
- ✱ Високий та стабільний врожай з високим вмістом олії
- ✱ Низькорослий з потужною енергією на початкових етапах

ВМІСТ ОЛІЇ



49-50%

РОЗМІР КОШИКА



19-23 см

145-165 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-F



РАСА ВОВЧКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ*


Група стиглості	Ранньо-стиглий
Період вегетації	102-110 днів
Сума активних температур (>10°C)	1680 °C
Цвітіння	Раннє
Період до цвітіння (50%)	63-68 днів
Нахил кошика	Напівпохилий
Виповненість	Добра
Натура	370-400 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	9
Вилягання	9
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	7
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



- Зона степу (недостатнє зволоження)
- Зона лісостепу (оптимальне зволоження)
- Зона достатнього зволоження і зрошування
- Гірські райони

ОРФЕО ШТ

КЛАСИЧНИЙ / ЛІНОЛЕВИЙ

strube



Die Saat. Seit 1877

- ✱ Стабільний гарантований врожай насіння та олії
- ✱ Середньорослий з відмінною стійкістю до вилягання
- ✱ Швидкий стартовий ріст на початкових етапах



ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньо-ранній
Період вегетації	108-118 днів
Сума активних температур (>10°C)	1760 °C
Цвітіння	Середнє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Напівстоячий
Виповненість	Добра
Натура	380-430 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



49-52%

РОЗМІР КОШИКА



19-23 см

150-170 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-F



РАСА ВОВЧКА

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	9
Обсипання	9
Толерантність до НБР	8
Толерантність до Гнилі білої	7
Толерантність до Гнилі сірої	8
Толерантність до Іржі	8
Толерантність до Фомозу	9
Толерантність до Фомопсису	9



- ✳ Середньо-ранній гібрид з відмінним комплексом стійкості до хвороб
- ✳ Високий та стабільний врожай
- ✳ Відмінна сила росту на початкових етапах
- ✳ Пластичний до умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



РОЗМІР КОШИКА



160-180 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-G



РАСА ВОВЧКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ*


Група стиглості	Середньо-ранній
Період вегетації	108-118 днів
Сума активних температур (>10°C)	1740 °C
Цвітіння	Середньо-раннє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Напівстоячий
Виповненість	Добра
Натура	420-450 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	8
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	8
Толерантність до Іржі	8
Толерантність до Фомозу	9
Толерантність до Фомопсису	9

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



- Зона степу (недостатнє зволоження)
- Зона лісостепу (оптимальне зволоження)
- Зона достатнього зволоження і зрошування
- Гірські райони

NEW

СЕРЕЛІЯ

КЛАСИЧНИЙ / ЛІНОЛЕВИЙ

strube



Die Saat. Seit 1877

- ✱ Середньо-ранній гібрид з відмінним комплексом стійкості до хвороб
- ✱ Високий та стабільний врожай
- ✱ Відмінна сила росту на початкових етапах



ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньо-рання
Період вегетації	108-118 днів
Сума активних температур (>10°C)	1740 °C
Цвітіння	Середньо-раннє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Похилий
Виповненість	Добра
Натура	420-450 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



49-50%

РОЗМІР КОШИКА



20-25 см

160-180 см




ВИСОТА РОСЛИНИ

A-G



РАСА ВОВЧКА

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



- Зона степу (недостатнє зволоження)
- Зона лісостепу (оптимальне зволоження)
- Зона достатнього зволоження і зрошування
- Гірські райони

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	8
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	8
Толерантність до Іржі	7
Толерантність до Фомозу	9
Толерантність до Фомопсису	9

ЦЕЛСО ШТ

СУЛЬФО / ЛІНОЛЕВИЙ



- ★ Один з найкращих гібридів який поєднує високу толерантність до нових рас Вовчка і сульфo-технологію
- ★ Високий потенціал врожаю насіння та олії
- ★ Гібрид помірно-інтенсивного типу

ВМІСТ ОЛІЇ



РОЗМІР КОШИКА



150-175 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-F



РАСА ВОВЧКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ*


Група стиглості	Середньо-ранній
Період вегетації	108-118 днів
Сума активних температур (>10°C)	1740 °C
Цвітіння	Середньо-раннє
Період до цвітіння (50%)	65-70 днів
Нахил кошика	Похилий
Виповненість	Добра
Натура	390-440 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	7
Обсипання	9
Толерантність до НБР	8
Толерантність до Гнилі білої	7
Толерантність до Гнилі сірої	7
Толерантність до Іржі	8
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



- Зона степу (недостатнє зволоження)
- Зона лісостепу (оптимальне зволоження)
- Зона достатнього зволоження і зрошування
- Гірські райони

ФАУСТО ШТ

СУЛЬФО / ЛІНОЛЕВИЙ

strube



Die Saat. Seit 1877

- ✱ Один з найкращих високопродуктивних гібридів в сульфо-технології
- ✱ Великий розр кошика з високим вмістом олії
- ✱ Ранній та швидкий стартовий ріст



ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньо-ранній
Період вегетації	108-118 днів
Сума активних температур (>10°C)	1760 °C
Цвітіння	Середнє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Напівстоячий
Виповненість	Добра
Натура	400-430 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



РОЗМІР КОШИКА



155-175 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-E



РАСА ВОВЧКА

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	9
Обсипання	9
Толерантність до НБР	8
Толерантність до Гнилі білої	7
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	8
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8




МЕРО ШТ

СУЛЬФО / ЛІНОЛЕВИЙ

- ✱ Добре поєднує толерантність до нових рас Вовчка в сульфо-технології
- ✱ Високий потенціал врожаю та вмісту олії
- ✱ Добрий комплекс стійкості до більшості хвороб

ВМІСТ ОЛІЇ



РОЗМІР КОШИКА



160-170 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-F



РАСА ВОВЧКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ*


Група стиглості	Середньо-стиглий
Період вегетації	110-122 днів
Сума активних температур (>10°C)	1820 °C
Цвітіння	Середньо-раннє
Період до цвітіння (50%)	65-70 днів
Нахил кошика	Похилий
Виповненість	Добра
Натура	400-450 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	9
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	7
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	8
Толерантність до Фомозу	9
Толерантність до Фомопсису	9

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



- Зона степу (недостатнє зволоження)
- Зона лісостепу (оптимальне зволоження)
- Зона достатнього зволоження і зрошування
- Гірські райони

ФАБУЛО КЛП

CLEARFIELD PLUS (CLP) / ЛІНОЛЕВИЙ

- ✱ Середньоранній гібрид з високим потенціалом врожайності
- ✱ Еталон вирівняності в генетиці
- ✱ Висока врожайність та вихід масла в новітній технології

strube



Die Saat. Seit 1877



ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньо-ранній
Період вегетації	108-118 днів
Сума активних температур (>10°C)	1760 °C
Цвітіння	Середнє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Напівстоячий
Виповненість	Добра
Натура	430-450 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



РОЗМІР КОШИКА



155-180 см




ВИСОТА РОСЛИНИ

A-E



РАСА ВОВЧКА

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



- Зона степу (недостатнє зволоження)
- Зона лісостепу (оптимальне зволоження)
- Зона достатнього зволоження і зрошування
- Гірські райони

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	7
Вилягання	8
Обсипання	9
Толерантність до НБР	8
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	8
Толерантність до Фомозу	7
Толерантність до Фомопсису	7



- ✳ Найкращий врожай в технології Євролайтнінг Плюс
- ✳ Відмінна сила росту на початкових етапах
- ✳ Відмінна стійкість до комплексу хвороб
- ✳ Придатний до різних технологій вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ

48-54%

РОЗМІР КОШИКА

19-25 см

160-180 см

ВИСОТА РОСЛИНИ

A-E

РАСА ВОВЧКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ*


Група стиглості	Середньо-ранній
Період вегетації	108-118 днів
Сума активних температур (>10°C)	1760 °C
Цвітіння	Середнє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Напівстоячий
Виповненість	Добра
Натура	420-440 гр

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	8
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	9
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



- Зона степу (недостатнє зволоження)
- Зона лісостепу (оптимальне зволоження)
- Зона достатнього зволоження і зрошування
- Гірські райони

СОРЕС ШТ

CLEARFIELD PLUS (CLP) / ВИСОКО-ОЛЕЇНОВИЙ

strube



Die Saat. Seit 1877

- ✱ Відмінне поєднання новітньої технології в високо-олеїновому сегменті
- ✱ Стійкий до нових рас несправжньої борошністості роси
- ✱ Рекомендований для лісостепу та степу



ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньо-пізний
Період вегетації	112-126 днів
Сума активних температур (>10°C)	1840 °C
Цвітіння	Середнє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Похилий
Виповненість	Добра
Натура	400-430 гр
Вміст олеїнової кислоти	86-88%

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



РОЗМІР КОШИКА



180-190 см




ВИСОТА РОСЛИНИ

A-E



РАСА ВОВЧКА

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



- Зона степу (недостатнє зволоження)
- Зона лісостепу (оптимальне зволоження)
- Зона достатнього зволоження і зрошування
- Гірські райони

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	7
Вилягання	7
Обсипання	8
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	9
Толерантність до Гнилі сірої	8
Толерантність до Іржі	9
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8



- ✱ Високий вміст та якість олії
- ✱ Стабільний та високоврожайний гібрид
- ✱ Стійкий до комплексу хвороб особливо Вовчка та НБР

ВМІСТ ОЛІЇ

49-50%

РОЗМІР КОШИКА

19-24 см

155-175 см

A-G

ВИСОТА РОСЛИНИ

РАСА ВОВЧКА

Група стиглості	Середньо-ранній
Період вегетації	108-118 днів
Сума активних температур (>10°C)	1760 °C
Цвітіння	Середнє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Напівпохилий
Виповненість	Добра
Натура	430-450 гр
Вміст олеїнової кислоти	88%

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	8
Вилягання	8
Обсипання	9
Толерантність до НБР	9
Толерантність до Гнилі білої	8
Толерантність до Гнилі сірої	9
Толерантність до Іржі	9
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



NEW

САНФАЕР СЛ

ВИСОКО-ОЛЕЇНОВИЙ

strube



Die Saat. Seit 1877

- ✱ Відмінно реагує на технологію вирощування
- ✱ Добрий розвиток на початкових етапах
- ✱ Високотолерантний до основних хвороб



ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Група стиглості	Середньо-пізній
Період вегетації	112-126 днів
Сума активних температур (>10°C)	1840 °C
Цвітіння	Середнє
Період до цвітіння (50%)	67-72 днів
Нахил кошика	Похилий
Виповненість	Добра
Натура	400-420 гр
Вміст олеїнової кислоти	86-88%

*Дані наведені в залежності від умов вирощування

ВМІСТ ОЛІЇ



РОЗМІР КОШИКА



180-190 см



ВИСОТА РОСЛИНИ

A-E



РАСА ВОВЧКА

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

Посухо- та жаростійкість	7
Вилягання	7
Обсипання	8
Толерантність до НБР	7
Толерантність до Гнилі білої	9
Толерантність до Гнилі сірої	8
Толерантність до Іржі	9
Толерантність до Фомозу	8
Толерантність до Фомопсису	8

ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ 2021

ДОНЕЦЬКА

Район	Гібрид	Урожайність зерна за базової вологості 7 %, т
Мангушський р-н, с. Приазовське	Баско ШТ	3,02

* Середня врожайність по області **2,22 т**

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Район	Гібрид	Урожайність зерна за базової вологості 7 %, т
Юр'ївський р-н с. Новоіванівське	Баско ШТ	3,44
Юр'ївський р-н с. Новоіванівське	Орфео ШТ	3,17
Юр'ївський р-н с. Новоіванівське	Целсо ШТ	3,13
Юр'ївський р-н с. Новоіванівське	Фаусто ШТ	3,17

* Середня врожайність по області **2,20 т**

ОДЕСЬКА

Район	Гібрид	Урожайність зерна за базової вологості 7 %, т
Кілійський р-н, м. Кілія	Целсо ШТ	3,03
Роздільнянський р-н, с. Єреміївка	Целсо ШТ	3,13
Кілійський р-н, м. Кілія	Фаусто ШТ	3,11
Роздільнянський р-н, с. Єреміївка	Фаусто ШТ	3,45
с. Йосипівка, Овідіо- польський р-н	Фаусто ШТ	3,12
Роздільнянський р-н, с. Єреміївка	Меро ШТ	3,72
Роздільнянський р-н, с. Єреміївка	Фабуло КЛП	3,11

* Середня врожайність по області **2,31 т**

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Район	Гібрид	Урожайність зерна за базової вологості 7 %, т
Заліщицький район, 22 овсте	Фабуло КЛП	3,09

* Середня врожайність по області **3,06 т**

ПОЛТАВСЬКА

Район	Гібрид	Урожайність зерна за базової вологості 7 %, т
Лубенський р-н, с. Войниха	Баско ШТ	3,23
Козельщинський р-н, смт. Козельщина	Баско ШТ	3,51
с. Войниха, Лубенсь- кий р-н	Орфео ШТ	3,18
Лубенський р-н, с. Войниха	Фаусто ШТ	3,21
Лубенський р-н, с. Войниха	Меро ШТ	3,43
Лубенський р-н, с. Войниха	Сорес ШТ	3,24
Лубенський р-н, с. Войниха	Фабуло КЛП	3,53

* Середня врожайність по області **2,55 т**

ЧЕРКАСЬКА

Район	Гібрид	Урожайність зерна за базової вологості 7 %, т
Шполянський р-н	Фабуло КЛП	4,29
Шполянський р-н	Сорес ШТ	4,11
Шполянський р-н	Меро ШТ	3,58
Шполянський р-н	Фаусто ШТ	3,75
Шполянський р-н	Целсо ШТ	3,40
Шполянський р-н	Орфео ШТ	3,93
Шполянський р-н	Баско ШТ	3,75

* Середня врожайність по області **2,90 т**

ХАРКІВСЬКА

Район	Гібрид	Урожайність зерна за базової вологості 7 %, т
Красноградський р-н, с. Зоряне	Баско ШТ	4,16
Красноградський р-н, с. Зоряне	Целсо ШТ	4,06
Красноградський р-н, с. Зоряне	Меро ШТ	4,19

* Середня врожайність по області **2,21 т**



LNZ Group — український вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг, що спеціалізується на торгівлі посівним матеріалом та засобами захисту рослин, вирощуванні зернових та технічних культур, тваринництві й зернотрейдерській діяльності. Утворений на базі Лебединського насінневого заводу.

Компанія розвиває агровиробництво, насінництво та дистриб'юцію. Обробляє понад 83 тис. га землі та має більш як 3 тис. працівників у сезон. До складу LNZ Group входять 47 агрофірми, а також спеціалізований завод по виробництву кукурудзи, багатофункціональний завод по виробництву насіння пшениці, ячменю, гороху, сої, соняшнику, льону, спельти, 2 елеватори в Черкаській та Сумській областях, 5 логістичних центрів та власний митний склад.



LNZ-AGRO — один із найефективніших національних агрохолдингів, що входить у ТОП-25 найбільших латифундистів України.

Земельний банк LNZ Group налічує понад 83 тис. гектарів оброблюваної землі, що розподілені на 3 виробничо-територіальні кластери.


Диверсифіковане розміщення земельного банку, чітка структура управління, розвинена логістична інфраструктура та високий професіоналізм працівників дозволяють компанії бути серед лідерів аграрного ринку за показниками економічної ефективності EBITDA. Компанія є визнаним лідером аграрного ринку України з виробництва насіння зернових і технічних культур. Компанія має найбільші в Україні площі із вирощування гібридної кукурудзи та соняшнику, включно з площами під поливом. Понад п'ять років співпрацює з провідними мультинаціональними компаніями-виробниками насіння, що є свідченням професійного та відповідального ставлення нашого агрохолдингу до своїх партнерських зобов'язань.



LNZ-MARKET — компанія національного масштабу, що входить у TOP-5 дистриб'юторів насіння та засобів захисту рослин в Україні.


Діяльність компанії поширюється майже на всю територію України із пропозицією комплексної технології (насіння+ЗЗР) та охоплює 10 логістичних центрів, 20 регіональних представництв (офісів) та 150 менеджерів з продажу. Компанія налічує більше, ніж 4 тисячі активних клієнтів з усієї України.

LNZ-MARKET — компанія, що найбільш динамічно зростає за обсягом продажу протягом останніх 5-ти років.



LNZ-PRODUCT — виробничий напрям бізнесу LNZ Group, історично «ядро» всієї компанії LNZ Group. Це два сучасні насінневі заводи. Наш основний принцип роботи — чітке дотримання технології та стандартів якості замовника. Понад 80 років досвіду виробництва насіння та сучасне технологічне обладнання є запорукою виробництва насіння найвищої якості.

Ми входимо в ТОП-10 українських насінних заводів з виробництва кукурудзи та вважаємо себе лідером з якості виробленого нами насіння.



DEFENDA

ГЕНЕРУЄМО НОВИЙ ЗАХИСТ

У 2017-му році до складу LNZ Group увійшла українська компанія УкрАгроПротект, компанія-дистриб'ютор генеричних засобів захисту рослин, що відповідає всім вимогам сучасного аграрія. Сьогодні під брендом DEFENDA випускається нове покоління генеричних засобів рослин.

Місія бренду **DEFENDA** — забезпечити українського виробника якісними та доступними засобами захисту рослин, необхідною технологічною та фінансовою підтримкою, сприяти фінансовому успіху агровиробника.

Мультинаціональні компанії зробили величезний внесок у розвиток аграрної науки сфери засобів захисту рослин. Наша мета — зробити якісні генеричні препарати доступними для кожного аграрія.



Близькість

Компанія знаходиться поруч із клієнтами в регіонах



Відкритість

Компанія готова демонструвати свій досвід і ділитися ним із ринком



Прогнозованість


Компанія має довгострокову стратегію розвитку



Якість

Співпраця з кращими китайськими заводами та контроль якості продукції





DEFENDA

ГЕНЕРУЄМО НОВИЙ ЗАХИСТ

Сучасна лінійка спеціальних добрив DEFENDA розроблена для забезпечення рослин поживними речовинами (мікро- та макроелементами, в тому числі збагачено органічними компонентами, такими як амінокислоти, екстракти водоростей та інші) для листового живлення та обробки насіння.



- Добрива DEFENDA створювались для швидкого і ефективного подолання та профілактики дефіциту елементів живлення, а також забезпечення широкої антистресової дії на рослину. Кожен продукт з лінійки виробляється з використанням високоякісних сировинних компонентів для безпечного та ефективного використання в рослинництві.



- Композиції для обробки насіння спеціально розроблено, щоб забезпечити рівномірне покриття насіння поживними та біологічно активними речовинами для стимулювання раннього росту коренів, швидкого та енергійного розвитку рослин. Як результат, коріння та проростки стають здоровішими та менш вразливими до холоду, морозу чи пошкодження внаслідок інших абіотичних стресів.



- Препарати для листового живлення представлено як комплексними марками для збалансованого живлення рослин, так і монопрепаратами для швидкої корекції нестачі окремих мікроелементів (зокрема, бору та цинку), а також добривами-біостимуляторами на основі амінокислот, екстрактів морських водоростей та інших органічних компонентів, що мають антистресову дію.

Застосування добрив DEFENDA є незамінним елементом сучасної технології вирощування с/г культур та дає агровиробникам надійну опору для досягнення стабільних показників врожаю найвищої якості.



UNIVERSEED об'єднує найкращий світовий досвід з місцевими знаннями. Ми вибираємо кращу генетику з Канади та США і досліджуємо її через суворий процес перевірки та відбору на місцях в Україні. Ця унікальна програма дозволяє розповсюджувати всесвітньо відому генетику на українських землях.

Раді представити вам високопродуктивні зернові гібриди та вперше на українському ринку силосні гібриди Leafy та Leafy-Floury типу. Ці гібриди пройшли перевірку на відповідність суворим вимогам відносно агротехнологічних характеристик для молочного та м'ясного тваринництва. Зараз такі гібриди вважаються окремим типом кукурудзи. Серед їхніх переваг – бездоганний баланс між ефективною клітковиною та засвоюваною масою, якісний крохмаль, що краще розщеплюється в рубці, й унікальні агрономічні властивості, що високо цінуються в молочній промисловості, як-от висока загальна врожайність і тривалі періоди жнив.

LNZ Group надійний, ексклюзивний партнер UNIVERSEED в Україні. Ми переконані, що ексклюзивні гібриди UNIVERSEEDS – новий крок в розвитку насінневої галузі в Україні




ГЕНЕТИКА ТА ДОСВІД

Генетика та досвід
канадських фермерів від
American North Plant Genetic



БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ

Налагоджена логістика
та злагоджена взаємодія.
Власний насіневий завод



СИНЕРГІЯ БІЗНЕСІВ

Синергія бізнесів двох
країн стала запорукою
створення нового бренду



universeed.pro



LNZweb

LNZ web — перший в Україні офіційний аграрний інтернет-магазин з продажу посівного матеріалу, добрив та засобів захисту рослин, створений агрохолдингом LNZ Group.

Це інноваційна онлайн-платформа, де можна придбати посівний матеріал, засоби захисту рослин і добрива.

Ресурс простий у користуванні й дуже зручний, адже до кожної позиції додана детальна характеристика і надані поради щодо використання препаратів. Крім того, вся продукція сертифікована, а посівні матеріали вже перевірені на полях LNZ Group.


Однією з переваг LNZ WEB є можливість обрати спосіб оплати та доставки: у відділенні «Нової пошти», адресну доставку «Новою Поштою» або самовивіз зі складів LNZ Group. Замовлення ви отримаєте протягом 1-2 днів.

На **LNZ web** доступні додаткові функції. Ви можете скористатися детальним агрономічним прогнозом погоди на 7 днів із рекомендаціями щодо часу посіву та обробки рослин. Також є можливість дізнатися актуальні ціни на елеваторах та курс валют.

Місія **LNZ web** — надати можливість середнім і малим фермерам отримати продукцію міжнародно визнаних брендів за такою ж ціною, як і для великих агропідприємств без посередників, а також стати надійним прогресивним помічником сучасних аграріїв.



Товари для фермерів та аграріїв від офіційного дистриб'ютора LNZ Market за справедливими цінами без посередників.



Можливість швидко замовити необхідний продукт онлайн



Швидка доставка



Перевірена агропродукція найкращих світових брендів

НАПРЯМОК LNZ TRADE



Напрямок LNZ Trade на постійній основі проводить закупівлю: зернових, олійних та бобових культур. За роки успішної роботи наша компанія зарекомендувала себе як відповідального і сумлінного партнера для сільгоспвиробників та компаній посередників. Наразі компанія займається експортом зернових в країни Близького Сходу, Європейського союзу, Туреччини, Китаю. Нашими клієнтами є найбільші світові аграрні корпорації, лідери у своїх галузях бізнесу.

Компанія володіє трьома елеваторними комплексами в Черкаській та Сумських областях, а також має власний парк залізничних вагонів, що дає можливість вчасно виконувати контрактні зобов'язання.

Ми прагнемо задовольняти запити наших клієнтів високоякісним, високопрофесійним консультативним супроводом та побудувати з кожним взаємовигідні партнерські відносини.



УМОВИ LNZ ТРЕЙД



I. КУЛЬТУРА

кукурудза
пшениця
ячмінь



II. ЗАКУПІВЛЯ НА УМОВАХ

EXW (лінійні елеватори)
CPT (порти Миколаєва, Одеси)
FCA (завантажено на вагон)



III. КІЛЬКІСТЬ

EXW - від 300 т
CPT - від 500 т
FCA - від 280 т



IV. ВАЛЮТА

ГРН
ДОЛ



V. ТЕРМІН ПОСТАВКИ

договірний



VI. ОПЛАТА

EXW – по складській квитанції
CPT – по реєстрам відвантаження
FCA – по реєстрам відвантаження



VII. ЦІНОВІ ІНДИКАЦІЇ

на підставі розсилок
Telegram - <https://t.me/LNZgroup>
Viber-<https://invite.viber.com>
<https://tripoli.land/companies/lnz-group>

Контакти LNZ Group

Центральне регіональне представництво (Черкаська)	Пшенишний Вадим Ілліч	+38 (067) 473 30 40
Київське регіональне представництво (Чернігів, Київ)	Щербина Микола Сергійович	+38 (067) 474 21 93
Тернопільське регіональне представництво (Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська)	Юськів Микола Йосипович Руденький Ігор Олександрович	+38 (097) 921 69 07 +38 (098) 351 17 84
Хмельницьке регіональне представництво (Хмельницька)	Топоровський Юрій Анатолійович	+38 (067) 384 06 19
Уманське регіональне представництво	Гриценко Олег Леонтійович	+38 (097) 392 20 31
Кіровоградське регіональне представництво (Кіровоградська)	Гончаренко Євгеній Валерійович	+380 (67) 524 38 00
Сумське регіональне представництво (Сумська)	Кащенко Олександр Вячеславович	+38 (097) 689 62 23 +38 (067) 470 11 07
Житомирське регіональне представництво (Житомирська, Вінницька)	Юдін Ярослав Олександрович	+38 (067) 47 344 76
Харківське регіональне представництво (Харківська)	Задорожний Юрій Васильович	+38 (067) 790 44 12
Миколаївське регіональне представництво (Миколаїв, Одеса, Херсон, Кіровоградська)	Баранюк В`ячеслав Вікторович	+38 (067) 511 32 07
Полтавське регіональне представництво (Полтава)	Сипко Дмитро Михайлович	+38 (066) 997 53 15 +38 (096) 268 57 22
Херсонське регіональне представництво (Херсонська, Запорізька)	Ветчанін Андрій Олександрович	+38 (067) 521 78 50
Львівське регіональне представництво (Львів, Івано-Франківськ)	Воронін Олег Вікторович	+380 (050) 431 24 78
Одеське регіональне представництво	Красіков Юрій Євгенович	+38 (0 67) 470 54 29
Дніпропетровське регіональне представництво (Дніпропетровська, Донецька, Луганська)	Ветчанін Андрій Олександрович	+38 (067) 521 78 50
Вінницьке регіональне представництво	Келип Олександр Сергійович	+38 (096) 636 84 15



Контакти DEFENDA

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН		
Керівник регіонального структурного підрозділу	Лимарь Андрій Володимирович	+38(050) 328 50 35 +38(068) 328 50 35
Підгрупа збуту м. Вінниця		
Керівник підгрупи	Лимарь Андрій Володимирович	+38(050) 328 50 35 +38(068) 328 50 35
Підгрупа збуту м. Житомир		
Керівник підгрупи	Гебрич Андрій Іванович	+38(066) 250 17 53
Підгрупа збуту м. Луцьк		
Керівник підгрупи	Ткачук Ольга Миколаївна	+38(067) 334 74 30
Підгрупа збуту м. Хмельницький		
Керівник підгрупи	Топалян Єгор Михайлович	+38(050) 448 48 36
ЦЕНТРАЛЬНО-ПІВДЕННИЙ РЕГІОН		
Керівник регіонального структурного підрозділу	Кулінічев Анатолій Володимирович	+38(050) 527 99 99
Підгрупа збуту м. Київ і Київська обл.		
Керівник підгрупи	Дук Владислав Леонідович	+38(095) 272 77 82
Підгрупа збуту м. Богуслав		
Керівник підгрупи	Ганенко Сергій Васильович	+38(067) 537 35 51
Підгрупа збуту м. Чернігів		
Керівник підгрупи	Кальченко Ігор Володимирович	+38(050) 424 60 29
Підгрупа збуту м. Кропивницький		
Керівник підгрупи	Геник Ярослав Степанович	+38 (095) 288 49 48
Підгрупа збуту м. Первомайськ		
Керівник підгрупи	Миронець Ольга Миколаївна	+38(050) 444 20 36 +38(068) 391 68 02
Підгрупа збуту м. Одеса		
Керівник підгрупи	Крихтін Сергій Леонідович	+38(095) 288 58 68
Підгрупа збуту м. Каховка		
Керівник підгрупи	Кравець Володимир Сильвестрович	+38(050) 551 64 19
Підгрупа збуту м. Кривий Ріг		
Керівник підгрупи	Золін Андрій Олександрович	+38(067) 569 83 13
СХІДНИЙ РЕГІОН		
Керівник регіонального структурного підрозділу	Бутенко Олександр Миколайович	+38(050) 448 53 80
Підгрупа збуту м. Дніпро		
Керівник підгрупи	Кімліченко Олег Володимирович	+38(095) 288 58 77
Підгрупа збуту м. Донецьк		
Керівник підгрупи	Бутенко Олександр Миколайович	+38(050) 448 53 80
Підгрупа збуту м. Мелітополь		
Керівник підгрупи	Гамаюнов Сергій Сергійович	+38 (050)-941-20-09 +38 (067)-568-36-84
Підгрупа збуту м. Полтава		
Керівник підгрупи	Сак Орест Романович	+38(050) 346 07 77
Підгрупа збуту м. Харків		
Керівник підгрупи	Зуєв Олександр Георгійович	+38(095) 282 87 80
Підгрупа збуту м. Сватове		
Керівник підгрупи	Дук Владислав Леонідович	+38(095) 272 77 82



Агродепартамент LNZ Group

Директор Агродепартаменту LNZ Group	Олександр Хмелюк	+38 067 553 39 30
Західний регіон (Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська)	Юрій Нестерук	+38 067 233 52 47
Західний регіон (Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька)	Віталій Лапчинський	+38 067 233 52 56
Північно-Центральний регіон (Київська, Чернігівська)	Юрій Баранчук	+38 097 649 18 20
Центральний регіон (Вінницька, Житомирська)	Леонід Чорний	+38 067 233 52 58
Центральний регіон (Кіровоградська, Черкаська)	Валентин Видибура	+38 098 515 99 02
Східний регіон (Полтавська)	Віталій Брашован	+38 067 339 50 08
Східний регіон (Харківська)	Сергій Уваров	+38 067 935 57 35
Південно-Східний регіон (Дніпропетровська, Луганська, Донецька)	Сергій Корнюшенко	+38 067 233 52 51
Південний регіон (Одеська, Миколаївська)	Олександр Котигора	+38 067 515 65 77
Менеджер платформи LNZ HUB	Сергій Вовк	+38 067 547 04 54
Менеджер по роботі з ключовими клієнтами	В'ячеслав Черкащенко	+38 067 547 04 55

Агродепартамент бренду DEFENDA

Керівник Агродепартаменту бренду ДЕФЕНДА	Валерій Волошин	+38 095 282 95 54
Менеджер з агротехнологій по засобам захисту рослин	Юрій Жеребко	+38 050 334 92 61
Менеджер з агротехнологій по засобам захисту рослин	Віктор Сонець	+38 050 329 28 07
Менеджер з агротехнологій по засобам захисту рослин	Володимир Байда	+38 050 472 06 80



